

Carrier

Concentré Emulsifiable

À utiliser avec divers herbicides

COMMERCIAL

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

AVERTISSEMENT : IRRITANT POUR LA PEAU ET LES YEUX

No D'HOMOLOGATION. 30639 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

PRINCIPE ACTIF :

Huile minérale... 50%

Mélange tensioactif... 40%

(1 Litre – En Vrac Litres)

Nufarm Agriculture Inc.
5101, 333 - 96th Ave NE
Calgary, Alberta T3K 0S3
1-800-868-5444

Numéro d'urgence 24 heures par jour 1-800-424-9300

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Tenir à l'écart du feu, des flammes nues, des ampoules électriques allumées et des autres sources de chaleur. Éviter que de l'eau ne pénètre dans ce contenant ou se mélange au produit. Irrite les yeux et la peau. Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Porter des gants résistant aux produits chimiques en manipulant ce produit.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Si l'ingestion s'est produite moins de 2 heures plus tôt, procéder prudemment au lavage de l'estomac. Administrer un traitement symptomatique.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE :

Pour les déversements ou les accidents de transport, Chemtrec, 1-800-424-9300.

Pour les situations urgentes sur la santé ou l'environnement, ProPharma Group, 1-877-325-1840.

Pour des informations sur les produits et leur utilisation, Nufarm Agriculture Inc., 1-800-868-5444.

ENTREPOSAGE :

Conserver dans le contenant original hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec, et bien aéré. Éviter que de l'eau ne pénètre dans ce contenant ou se mélange au produit. Ne pas expédier ou entreposer près des aliments pour les humains ou les animaux, des semences et des engrais toutes les sources de chaleur.

ÉLIMINATION :

CONTENANTS RECYCLABLES :

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'informer auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché.

Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans la cuve.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Contenants Réutilisables :

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant vide peut être retourné au point de vente (distributeur ou détaillant).

Contenants Réutilisables – Rechargeables : En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas réutiliser ce contenant à d'autres fins.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

MODE D'EMPLOI :

Carrier est un produit à base d'huile émulsifiable qui peut être mélange en réservoir avec :

- Herbicide Liquide Achieve^{MD}
- Herbicide Achieve 40SC
- Herbicide CRESTIVO^{MC}
- Herbicide Baseline^{MC} Mélangé en Réservoir
- Bison^{MC} 400 L
- Herbicide Challenger^{MC}

- Herbicide Liquide Achieve SC
- Herbicide Marengo^{MD}
- Nufarm Tralkoxydime Herbicide
- Nufarm Tralkoxydime Liquide
- Herbicide Signal^{MD}
- Herbicide Statue^{MC}
- Herbicide Valtera^{MC}

Consulter les étiquettes des herbicides pour en savoir davantage sur les doses d'emploi et les directives de mélange.

DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Nettoyer la cuve du pulvérisateur et la remplir à moitié d'eau. Mettre l'agitateur ou le système de dérivation en marche.
2. Ajouter la quantité appropriée d'un des herbicides énumérés ci-dessus et agiter pendant 2 ou 3 minutes.
3. Ajouter un herbicide contre les mauvaises herbes à feuilles larges, insecticide ou fongicide qui doit être utilisé que dans le mélange en réservoir.
4. Agiter pendant 2 ou 3 minutes.
5. Ajouter la quantité appropriée de Carrier.
6. Agiter pendant 1 ou 2 minutes avant d'ajouter le reste de l'eau, puis maintenir une agitation constante.

DOSES D'EMPLOI :

Herbicide (à la dose recommandée)	Dose de Carrier	Le Volume de Carrier par 1000 L de bouillie de pulvérisation
Herbicide Liquide Achieve	0,5% v/v	5 L
Herbicide Achieve 40SC		
Herbicide CRESTIVO		
Herbicide Baseline Mélangé en Réservoir		
Bison 400 L		
Herbicide Challenger		
Herbicide Liquide Achieve SC		
Herbicide Marengo		
Nufarm Tralkoxydime Herbicide		
Nufarm Tralkoxydime Liquide		
Herbicide Statue		
Herbicide Valtera		
Herbicide Signal		

† Utiliser à un taux de 0,25% v/v lorsque Herbicide Signal est appliqué à une dose de 230mL/ha et utiliser à un taux de 0,32% v/v lorsque Herbicide Signal est appliqué à une dose de 290mL/ha.

^{MD, MC} Les produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectives.

19-1384