

**Nufarm  
Enhance<sup>MD</sup>**

CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE

AGRICOLE

Adjuvant non ionique pour bouillie dérivé de l'huile de soya

Pour usage avec les produits antiparasitaires figurant sur la présente étiquette.

PRINCIPE ACTIF : Éthoxylate de triglycéride 10 POE . . . 80 %

Avertissement, contient l'allergène soya

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

N° D'HOMOLOGATION 29952 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

ATTENTION – IRRITANT POUR LA PEAU

CONTENU NET : 1,4,5,10, 20,110,1000 Litres – vrac

Nufarm Agriculture Inc.

5101, 333 - 96th Ave NE

Calgary, Alberta T3K 0S3 1-800-868-5444

**Numéro d'urgence 24 heures par jour 1-800-424-9300**

## AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

## PREMIERS SOINS

**EN CAS D'INGESTION** : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS** : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS D'INHALATION** : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

## RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

## NUMÉROS DE TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE

Pour les déversements ou les accidents de transport, Chemtrec, 1-800-424-9300.

Pour les situations urgentes sur la santé ou l'environnement, ProPharma Group, 1-877-325-1840.

Pour des informations sur les produits et leur utilisation, Nufarm Agriculture Inc, 1-800-868-5444.

## MISES EN GARDE

### TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

### MANIPULATION DU PRODUIT

Durant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage des déversements et du pulvérisateur, l'entretien et les réparations, porter une chemise à manches longues, un pantalon long et des gants résistant aux produits chimiques. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Conserver à l'écart de la nourriture humaine ou animale. Ne pas contaminer l'approvisionnement en eau, les zones humides et toute autre étendue d'eau par application directe du produit, dérive de pulvérisation et lors du nettoyage ou du rinçage de l'équipement de pulvérisation ou des contenants.

### DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS LE TRAITEMENT

Les travailleurs ne doivent pas retourner dans les champs traités avant la fin du délai de sécurité indiqué sur l'étiquette du pesticide appliqué en association avec NUFARM ENHANCE.

### ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré. Conserver dans le contenant d'origine fermé hermétiquement dans un lieu sûr entre chaque utilisation. Conserver à l'écart des boissons et des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

## NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS

Récupérer le déversement à l'aide d'une matière absorbante (litière pour chat, argile granulée, terre) et jeter dans un contenant à déchets. Laver la zone de déversement avec de l'eau après avoir ramassé la matière, puis jeter avec les déchets. Voir la section ÉLIMINATION ci-dessous.

## DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

## ÉLIMINATION DU CONTENANT

### ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE :

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

### CONTENANTS RÉUTILISABLES :

En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Pour les contenants à usage unique, se reporter à la section ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : 24 heures par jour, CHEMTREC 1-800-424-9300

## MODE D'EMPLOI

Les doses de NUFARM ENHANCE indiquées ci-dessous se rapportent aux bouillies de pulvérisation préparées avec un produit antiparasitaire ou à d'autres usages. Les bouillies de pulvérisation à base de produit antiparasitaire, leur préparation et leurs usages doivent être dérivées des étiquettes de produits antiparasitaires individuelles.

Bouillie de pulvérisation à base de produit antiparasitaire	Quantité de NUFARM ENHANCE par litre de bouillie de pulvérisation	Remarques
ACTIVOL®	250 mL/1 000 L	Pour usage sur les cerises douces et aigres
FALGRO®	250 mL/1 000 L	Pour usage sur les cerises aigres
FOLICUR 432 F FONGICIDE FOLIAIRE	1,25 L/1000L	Consulter l'étiquette de FOLICUR 432 pour le mode d'emploi.
FONGICIDE FOLIAIRE PROLINE 480 SC	1,25 L/1000L	Proline 480 SC doit être dispersé à fond avant d'ajouter NUFARM ENHANCE
HERBICIDE VALTERA	1,25 – 2,5 L/1000L	Emploi comme aide à la récolte pour l'haricot sec ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.). Utiliser la dose la plus élevée lorsque la couverture est dense et/ou la pression exercée par les mauvaises herbes est plus élevée. Consulter l'étiquette d'Herbicide Valtera pour connaître le mode d'emploi.
AMBUSH® 500EC, POUNCE 384 Insecticide®	300 mL/1 000 L	Pour usage sur les choux.
EVEREST 70 Herbicide granulé dispersable dans l'eau	2,5 L/1 000 L	Pour usage sur le blé de printemps et le blé dur
EVEREST SOLUPAK 70 DF	2,5 L/1 000 L	Pour usage sur le blé de printemps et le blé dur
AXIAL 100 EC Herbicide	2,5 L/1 000 L	Pour usage sur l'orge de printemps, le blé de printemps

Bouillie de pulvérisation à base de produit antiparasitaire	Quantité de NUFARM ENHANCE par litre de bouillie de pulvérisation	Remarques
DÉFANANT REGLONE, Dessicash, Stage, Bolster Desiccant, Diquat 240, MasterLine Diquat, Craven, Défanant DriFast, Armory 240 Herbicide, Guardsman Diquat, Desica	1 L/1 000 L	Ne pas utiliser NUFARM ENHANCE avec REGLONE, Dessicash, Stage, Bolster Desiccant, Diquat 240, MasterLine Diquat, Craven, Défanant DriFast, Armory 240 Herbicide, Guardsman Diquat, Desica pour supprimer la spargoute des champs. Ne pas utiliser NUFARM ENHANCE avec RELGONE, Dessicash, Stage, Bolster Desiccant, Diquat 240, MasterLine Diquat, Craven, Défanant DriFast, Armory 240 Herbicide, Guardsman Diquat, Desica pour défaner les pommes de terre, sauf pour l'usage recommandé dans les provinces des Prairies, à raison de 1,25 L/ha de REGLONE, Dessicash, Stage, Bolster Desiccant, Diquat 240, MasterLine Diquat, Craven, Défanant DriFast, Armory 240 Herbicide, Guardsman Diquat, Desica
PINNACLE TOSS-N-GO Herbicide, PINNACLE SG Herbicide, REFLEX® HERBICIDE, TELAR® HERBICIDE	1 L/1 000 L	Ajouter NUFARM ENHANCE en dernier. L'usage de l'antimousse FLAT-OUT peut s'avérer nécessaire. Consulter l'étiquette de chaque produit pour le mode d'emploi.
ACCENT®, ALLY®, REFINE EXTRA 75 DF Herbicide, REFINE EXTRA 75 TOSS-N-GO Herbicide, ELIM EP HERBICIDE 25% Pâte granulée, ELIM EP 25 DF Herbicide, MUSTER®, PEAK 75WG Herbicide, CLASSIC®, RELIANCE™ STS Toss-N-Go, ESCORT®, COMPAS 480 EC EMULSIFIABLE SELECTIVE WEEDKILLER, BEACON®, SUMMIT WG®, CURTAIL™M®, LONTREL® 360, PARDNER®, ULTIM 75 DF Herbicide, NUFARM KORIL 235 HERBICIDE LIQUIDE, CLEARVIEW HERBICIDE	2 L/1 000 L	Ajouter NUFARM ENHANCE en dernier. L'usage de l'antimousse FLAT-OUT peut s'avérer nécessaire. Consulter l'étiquette de chaque produit pour le mode d'emploi.
PURSUIT 240, PURSUIT Herbicide pour fèves de soya (agricole), PURSUIT Herbicide, PURSUIT 70 DG Herbicide, FIELDSTAR WDG Herbicide, FIELDSTAR WDG WSP Herbicide, DISTINCT Herbicide, DISTINCT WDG Herbicide, REFLEX + PURSUIT®, UPBEET®, UNITY® 280 EC, ACC 299263 70 WDG, SIGNAL HERBICIDE, AIM EC HERBICIDE, NUFARM CLODINAFOP Herbicide, MANA LADDER 240 EC, MPOWER AURORA CLODINAFOP Herbicide, SLAM'R CLODINAFOP Herbicide, GROW CLODINAFOP Herbicide. SIMPLICITY Herbicide, OVERDRIVE Herbicide, BULLWHIP 240 EC HERBICIDE	2,5 L/1 000 L	Ajouter NUFARM ENHANCE en dernier. Consulter l'étiquette de chaque produit pour le mode d'emploi. Pour la dose supérieure de SIGNAL HERBICIDE, NUFARM CLODINAFOP Herbicide, MANA LADDER 240 EC Herbicide, MPOWER AURORA CLODINAFOP Herbicide, SLAM'R CLODINAFOP Herbicide, GROW CLODINAFOP Herbicide et BULLWHIP 240 EC Herbicide 290 mL/ha, utiliser avec NUFARM ENHANCE à 0,32 % vol/vol (3,2 L/1000 L)
ELEVATE® 50 WDG	200 mL/1 000 L	Pour usage sur le raisin

