

Mextrol^{MD}

Herbicide à céréale standard.

Cultures homologuées

- Avoine
- Blé d'hiver
- Blé de printemps
- Graminées fourragères
- Lin
- Maïs
- Orge
- Seigle

Mauvaises herbes contrôlées

- Abutilon****
- Amarante à racine rouge
- Bardanette épineuse
- Bourse-à-pasteur
- Chardon des champs
- Chénopode blanc
- Colza spontané (incluant le canola)
- Laiteron des champs (partie aérienne)
- Lampourde glouteron
- Matricaire inodore***
- Morelle d'Amérique
- Moutarde sauvage
- Neslie paniculée
- Petite herbe à poux
- Renouée liseron
- Renouée persicaire
- Renouée persicaire pâle
- Renouée scabre
- Sagesse-des-chirurgiens
- Saponaire des vaches*
- Sarrasin
- Sarrasin de tartarie
- Sénéçon vulgaire
- Silène noctiflore
- Soude roulante**
- Tabouret des champs
- Tournesol spontané
- Vélar fausse giroflée

Avantages

- Herbicide liquide de Groupe 4 et 6
- **MEILLEURE PERFORMANCE** dans les conditions défavorables
- **Permet l'ensemencement de trèfle comme couverture de sol**
- L'application doit être effectuée avant que la culture ne recouvre les mauvaises herbes
- Appliquer lorsque le trèfle rouge est entre le stade de la première et troisième feuille trifoliée
- Contrôle efficace des feuilles larges au cours de la saison
- Contrôle plusieurs mauvaises herbes résistantes au groupe 2, 5 et 9
- Se mélange en réservoir avec Boost^{MD}, la plupart des fongicides et engrais foliaires
- Aucun surfactant requis

Partenaires de mélange en réservoir

- Boost
- MCPA ester
- La plupart des herbicides pour graminées (consulter l'étiquette du produit)

* Dans des conditions normales, la saponaire des vaches peut être supprimée jusqu'au stade de 4 feuilles. Les plantules dont le stade foliaire est plus avancé risquent de ne pas être supprimées.

** Pulvériser avant que les mauvaises herbes ne mesurent plus de 5 cm de hauteur.

*** Annuelles du printemps seulement.

**** Pulvériser avant que les mauvaises herbes ne mesurent plus de 8 cm de hauteur.

MATIÈRES ACTIVES

- > Groupe 4 (MCPA)
- > Groupe 6 (bromoxynil)

DÉLAI AVANT LA PLUIE

- > 1 heure

SUPERFICIE TRAITÉE

- > Un contenant de 10 L traite 20 acres
- > 1,25 L/ha (500 mL/acre)

STAGE DE CROISSANCE

- > 2 feuilles à la feuille étendard

PCP

- > 26999

1.800.868.5444 | Nufarm.ca |  NufarmCA

Toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette du produit.
Boost^{MD}, Mextrol^{MD} sont des marques de commerce enregistrées de Nufarm Agriculture Inc.
Tous les autres produits sont des marques de commerce de leurs entreprises respectives.
77479-0421

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow