

Valtera^{MC} EZ

Herbicide résiduel en présemis contre les mauvaises herbes à feuilles larges dans le soya, le blé et le maïs, maintenant disponible en formule liquide.

Cultures homologuées

- Blé (printemps, hiver)
- Maïs de grande culture
- Soya

Mauvaises herbes contrôlées

- Acnide tuberculée (incluant les biotypes résistants au glyphosate et les Groupes 2 et 5)
- Amarante
- Amarante de Palmer
- Canola spontané (suppression incluant tous les biotypes résistants)
- Chénopode
- Gaillet gratteron (suppression)
- Kochia
- Laiteron potager
- Morelle noire
- Petite herbe à poux
- Pissenlit (germination)
- Sarrasin sauvage (suppression)
- Sétaire verte (suppression)
- Stellaire
- Vergerette du Canada

Avantages

- **CONTRÔLE TÔT EN SAISON.** Élimine la pression des mauvaises herbes à feuilles larges
- **CONTRÔLE RÉSIDUEL PROLONGÉ** jusqu'à 8 semaines
- **OUTIL DE GESTION DE LA RÉSISTANCE** pour contrôler les mauvaises herbes résistantes au glyphosate
- Application au printemps ou à l'automne selon les spécifications de l'étiquette
- Le contrôle élargis des mauvaises herbes tôt en saison offre une flexibilité supplémentaire sur l'application d'herbicides postlevée, en ciblant des plants plus petits
- Augmentation des rendements en éliminant tôt la compétition
- Grande flexibilité dans la rotation des cultures
- Plusieurs options de mélange en réservoir avec la plupart des herbicides de brûlage et de présemis (ex : glyphosate et BlackHawk[®])

Conseils

1. **Mauvaises herbes émergées** – utiliser un brûlage avec le glyphosate et le BlackHawk
2. Action résiduelle pour prévenir la germination tardive
3. **Flexibilité d'application** – Valtera EZ peut être utilisé jusqu'à 3 jours après le semis, mais avant l'émergence du soya
4. Consultez l'étiquette pour connaître les dosages et les modes d'utilisation
5. **NE PAS** incorporer le produit après l'application ou avant le semis
6. Ne pas incorporer lors de l'application en présemis
7. Laisser une zone non traitée pour vérifier la performance

1.800.868.5444 | Nufarm.ca |  NufarmCA

Toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette du produit.

Valtera^{MC} est une marque de commerce de Valent U.S.A. LLC.
BlackHawk[®] est une marque de commerce enregistrée de Nufarm Agriculture Inc.
Nufarm Agriculture Inc. est le distributeur canadien des produits Valent de Valent Canada Inc.
75911-0421 

MATIÈRE ACTIVE

- > Groupe 14 (flumioxazine)

SUPERFICIE TRAITÉE

- > Un 4,8 L traite 80-105 acres avec un dosage de 60-90 mL/acre

APPLICATION

- > Mélange en réservoir avec le glyphosate et/ou BlackHawk pour optimiser le contrôle des mauvaises herbes émergées

PÉRIODE D'APPLICATION

- > Prélevée dans le soya
- > Minimum de 7 jours avant les semis de blé et de maïs
- > Valtera EZ jusqu'à 3 jours après le semis de soya

ORDRE DU MÉLANGE

- > Valtera EZ
- > BlackHawk (si utilisé)
- > Glyphosate

NOTES

- > Ne pas incorporer
- > Valtera EZ est activé par l'humidité du sol et la pluie

PCP

- > 33523