

Le fongicide Presidio^{MD}, fait partie d'une famille chimique unique (Groupe 43), qui fournit une faible dose d'utilisation et un outil de gestion de la résistance pour lutter contre les maladies tenaces tels que la pourriture rose et le mildiou.

Presidio^{MD}

Avantages

- Excellent effet préventif
- Effet systémique et translaminaire à l'intérieur du plant
- Excellente compatibilité de mélange en réservoir
- Délai de sécurité et de pré-récolte minimal
- Large fenêtre d'application

Cultures homologuées

- Basilique
- Crucifères (têtes, tiges, racines)
- Cucurbitacées
- Haricots à gousses comestibles
- Légumes-fruits
- Ginseng
- Houblon
- Légumes feuilles

Renseignements généraux

- Pour une bonne gestion de la résistance, mélanger Presidio en réservoir avec un autre fongicide homologué contre le même pathogène. Toujours respecter le mode d'emploi le plus stricte de l'étiquette du produit.
- Appliquer lorsque les conditions sont favorables à la maladie mais avant son développement
- Maximum 2 applications consécutives
- Maximum 4 applications par saison (2 pour les cucurbitacées)
- Consultez l'étiquette du produit sur la rotation des cultures après l'utilisation de Presidio



Informations techniques

FONGICIDE

> Groupe 43

MATIÈRE ACTIVE

> fluopicolide 39,5%

FORMAT

> Caisse de 12 x 946 mL

DÉLAI AVANT LA PLUIE

> Éviter l'application lorsque de fortes pluies sont prévues

HOMOLOGATION

> 30051

Informations d'utilisation particulière

MALADIES CONTRÔLÉES DOSE IAR INFORMATION SUR L'APPLICATION

BASILIQUE (de champs et de serre)

Mildiou (<i>Peronospora belbahrii</i>)	292 mL/ha (118 mL/acre) Minimum de volume de pulvérisation de 200 L/ha	1	Application du fongicide Presidio dans un mélange en réservoir avec Revus™ Utiliser le mode d'emploi le plus restrictif de l'étiquette Traitement foliaire avec un intervalle de 7 jours lorsque les conditions de maladie sont favorables, mais avant son apparition. Applications préventives à la dose la plus faible et à des intervalles plus espacés En présence de maladie, appliquer plus fréquemment à des doses plus élevées Maximum 2 applications séquentielles de Presidio Maximum de 880 mL/ha par saison Maximum 3 applications par saison Ne pas appliquer ce produit avec de l'équipement de brumisation (portable ou automatique), ou de nébulisateur/pulvérisateur portable
---	--	---	---

BRASSICA – LÉGUMES (fleurs et pommés)

Mildiou (<i>Peronospora parasitica</i>)	220-292 mL/ha (90-118 mL/acre)	2	Appliquer dans un mélange en réservoir avec le fongicide Bravo™ 500 Traitement avec un intervalle de 7-10 jours
--	-----------------------------------	---	--

BRASSICA – LÉGUMES-RACINES

Mildiou (<i>Peronospora parasitica</i>)	220-292 mL/ha (90-118 mL/acre)	7	Appliquer dans un mélange en réservoir avec le fongicide Bravo™ 500 Traitement avec un intervalle de 7-10 jours
--	-----------------------------------	---	--

CUCURBITACÉES

Mildiou (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	292 mL/ha (118 mL/acre)	2	Appliquer Presidio comme l'un des traitements hâtifs dans le programme de lutte aux maladies Appliquer dans un mélange en réservoir avec Bravo™ 500 Traitement avec un intervalle de 7-10 jours NE PAS faire plus de 2 applications par année NE PAS faire des applications consécutives de Presidio
Pourriture phytophthoréenne/ pourriture du collet (<i>Phytophthora capsici</i>) (suppression)	292 mL/ha (118 mL/acre)	2	Pour un résultat optimal, les traitements devraient débuter dès le semis ou le repiquage Maximum de 2 applications Appliquer dans un mélange en réservoir avec Bravo™ 500

HARICOTS À GOUSSES COMMESTIBLES – HARICOTS (*Phaseolus* spp.), HARICOTS (*Vigna* spp.), POIS-SABRE (*Canavalia ensiformis*), SOYA (semences immatures) (*Glycine max*), HARICOT SABRE (*Canavalia gladiata*)

Suppression of: Mildiou (<i>Phytophthora nicotianae</i> , <i>P. phaseoli</i>) Pourriture des fruits (<i>P. capsici</i>)	292 mL (118 mL/acre) Minimum de volume de pulvérisation de 200 L/ha	0	Applications foliaires lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie, mais avant son apparition Maximum de 2 applications séquentielles de Presidio Appliquer dans un mélange en réservoir avec Revus™. Suivre le mode d'emploi le plus restrictive des étiquettes Maximum 800 mL/ha par saison Maximum 3 applications par saison
--	---	---	--

MALADIES CONTRÔLÉES DOSE IAR INFORMATION SUR L'APPLICATION

HOUBLON

Mildiou (<i>Pseudoperenospora humilii</i>)	292 mL/ha (118 mL/acre) Minimum de volume de pulvérisation de 500 L/ha	24	Traitement foliaire avec un intervalle de 10-14 jours lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie, mais avant l'apparition des symptômes Appliquer dans un mélange en réservoir avec Revus [®] . Suivre le mode d'emploi la plus restrictive des étiquettes Maximum 2 applications séquentielles de Presidio Maximum 800 mL/ha par saison Maximum 3 applications par saison
---	--	----	---

GINSENG

Phytophthora des racines et la pourriture de la feuille (<i>Phytophthora cactorum</i>)	292 mL dans un minimum de 200 L d'eau	7	Pour une gestion de la résistance, le fongicide Presidio DOIT être mélangé en réservoir avec un autre fongicide homologué contre le même pathogène ayant un mode d'action différent Appliquer dans un mélange en réservoir avec Reason [®] , Phostrol [®] , Maestro [®] , Revus [®] , Acrobat [®] , Ridomil Gold [®] ou Aliette [®] Toujours respecter le mode d'emploi le plus stricte Traitement foliaire avec un intervalle de 7 à 10 jours lorsque les conditions sont favorables, mais avant l'apparition de la maladie Maximum de 3 applications foliaires par saison
---	---------------------------------------	---	---

BROCOLI RAAB, CHOU, CHOU CHINOIS, CHOU FRISÉ, MIZUNA, FEUILLES DE MOUTARDE, MOUTARDE ÉPINARD, FEUILLES DE COLZA

Mildiou (<i>Bremia lactucae</i> , <i>Peronospora farinosa</i>)	220 mL/ha (89 mL/acre)	2	Appliquer à un taux de 200 à 1 000 L/ha (80-400 L/acre) Pour une gestion de la résistance, le fongicide Presidio doit être mélangé en réservoir avec un autre fongicide homologué contre le même pathogène ayant un mode d'action différent. Par exemple, appliquer le Presidio en réservoir avec Ranman 400SC pour toutes les productions du groupe 5. Toujours respecter le mode d'emploi de l'étiquette la plus stricte. Applications foliaires à un intervalle de 7 à 10 jours débutant avec la floraison initiale, ou si les conditions sont favorables au développement de la maladie, mais avant l'apparition des symptômes Maximum de 3 applications ou de 660 ml/ha-267 ml/acre par saison
--	---------------------------	---	--

LÉGUMES FEUILLES (sauf ceux du genre *Brassica*)

Mildiou (<i>Bremia lactucae</i> , <i>Peronospora farinosa</i>)	220-292 mL/ha (90-118 mL/acre)	2	Appliquer dans un mélange en réservoir avec Aliette Application aux 7-10 jours d'intervalle
--	-----------------------------------	---	--

POIVRONS, TOMATES

Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) Pourriture phytophthoréenne (<i>Phytophthora capsici</i>) (suppression)	292 mL/ha (118 mL/acre)	2	Application à un intervalle de 7-10 jours Appliquer dans un mélange en réservoir avec Bravo 500 pour le mildiou Appliquer dans un mélange en réservoir avec Revus pour la pourriture phytophthoréenne
---	----------------------------	---	---

MALADIES CONTRÔLÉES DOSE IAR INFORMATION SUR L'APPLICATION

POMMES DE TERRE

MALADIES CONTRÔLÉES	DOSE	IAR	INFORMATION SUR L'APPLICATION
Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>)	292 mL/ha (118 mL/acre)	7	Appliquer dans un mélange en réservoir avec Bravo 500 Traitement avec un intervalle de 7-10 jours
Pourriture rose (<i>Phytophthora erythroseptica</i>)	292 mL/ha (118 mL/acre)	30	Appliquer Presidio en utilisant une bande de pulvérisation de 15-20 cm directement vers les plantons, ou dans le sillon avant la plantation et la fermeture de ceux-ci. Une seconde application en pulvérisation directe au sol, peut être effectuée entre le buttage et la tubérisation. Ne pas combiner des applications de sillons/sols avec des applications foliaires Maximum de 2 applications par saison Pour une gestion de la résistance, le fongicide Presidio peut être mélangé en réservoir avec un autre fongicide homologué contre le même pathogène, ayant un mode d'action différent



1.800.868.5444 | Nufarm.ca | NufarmHortCA

Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette pour plus d'information sur l'application pour contrôler les mauvaises herbes, les insectes et les maladies. Consultez l'étiquette du produit pour en apprendre davantage sur les homologations futures, nouvelles cultures, insectes et les modalités d'utilisation. Consultez l'étiquette du produit pour connaître les intervalles avant récolte.

Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette du produit.

Presidio[®] est une marque de commerce enregistrée de Valent U.S.A. LLC. Tous les autres produits sont des marques de commerce de leurs entreprises respectives. Nufarm Agriculture Inc. est le distributeur canadien des produits Valent de Valent Canada Inc.