

**Statue<sup>MC</sup> est un herbicide anti-graminée de postlevée dans les productions de fruits et légumes.**

# Statue<sup>MC</sup>

## Avantages

- Contrôle remarquable des graminées annuelles et vivaces
- Niveau élevé de sécurité des cultures et à tous les stades de croissance, de façon à cibler les applications en fonction du développement des mauvaises herbes
- Contrôle exceptionnel des graminées grâce à son action systémique
- Flexibilité du mélange en réservoir avec plusieurs herbicides
- Un contenant traite 40-80 acres selon la culture et le type de mauvaises herbes visées

## Cultures homologuées

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| • Carottes           | • Tournesol  |
| • Bleuets en corymbe | • Betteraves |
| • Oignons            | • Panais     |
| • Pommes de terre    | • Radis      |
| • Épinards           |              |

## Renseignements généraux

- Toujours ajouter le surfactant Carrier avec le Statue à 0.5% v/v (0,5 L/100 L d'eau)
- Une couverture uniforme du feuillage est importante pour obtenir un meilleur contrôle des graminées
- Baisse d'efficacité du produit lorsque les plants sont stressés par des conditions de sécheresse, de surplus d'eau et/ou de températures froides
- Toujours respecter l'intervalle de pré-récolte de chaque production
- Ne pas utiliser en serre



## Informations techniques

### HERBICIDE

> Groupe 1

### MATIÈRE ACTIVE

> cléthodime 240 g/L

### FORMAT

> Statue en 3 L  
> Surfactant Carrier en 8L @ 0,5% v/v

### DÉLAI AVANT LA PLUIE

> 1 heure

### # HOMOLOGATION

> 32885  
> 30639 (surfactant Carrier)

## Directives d'utilisation particulière

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES		STADE DE CROISSANCE	TAUX D'APPLICATION	DOSE D'ADJUVANT
Pied de coq Digitaire Panic d'automne Sétaire (verte et jaune) Ivraie de Perse Millet commun	Chiendent Céréales spontanées Maïs spontané Folle-avoine Panic capillaire	2-6 feuilles	0,19 L/ha (0,08 L/acre)	0,5% v/v de Carrier 0,5 L/100 L d'eau
contrôle du chiendent**		2-6 feuilles	0,38 L/ha (0,15 L/acre)	0,5% v/v de Carrier 0,5 L/100 L d'eau

\*\* Utiliser un volume minimum de 100L/ha de pulvérisation pour contrôler adéquatement le chiendent

## Directives d'utilisation particulière

TAUX D'APPLICATION IAR INFORMATION SUR L'APPLICATION

### BLEUETS (en corymbe)

0,19 L/ha (0,08 L/acre) à 0,38 L/ha (0,15 L/acre) plus 0,5% v/v de Carrier	14	Application terrestre seulement Maximum 1 application par année Pulvériser l'herbicide statue en champ Volume minimum de pulvérisation de 100L/ha
--	----	--

### CANNEBERGES

0,19 L/ha (0,08 L/acre) à 0,38 L/ha (0,15 L/acre) plus 0,5% v/v de Carrier	30	Maximum 1 application par année Puisque la tolérance de toutes les variétés de productions n'a pas été évalué, il serait prudent de vérifier la réaction de vos cultures sur une petite surface avant d'appliquer Statue à grande échelle. De plus, consultez votre détaillant pour plus d'informations sur les variétés de productions tolérantes à l'herbicide Statue. Ne pas appliquer entre le stade crochet et la formation des fruits Volume minimum de pulvérisation de 100L/ha
--	----	---

TAUX D'APPLICATION

IAR INFORMATION SUR L'APPLICATION

### OIGNONS

0,38 L/ha (0,15 L/acre)  
plus 0,5% v/v de Carrier

45

Maximum 1 application par année  
Application en postlevée au stade 1-4 feuilles

### POMMES DE TERRE

0,19 L/ha (0,08 L/acre) à 0,38 L/ha  
(0,15 L/acre) plus 0,5% v/v de Carrier

60

Applications terrestre et aérienne

### ÉPINARDS

0,19 L/ha (0,08 L/acre)  
plus 0,5% v/v de Carrier

14

Maximum 2 applications par année. Intervalle de 14 jours entre les applications.  
Application terrestre en postlevée au stade 2-6 feuilles des graminées

### TOURNESOL

0,38 L/ha (0,15 L/acre)  
plus 0,5% v/v de Carrier

72

Applications terrestre et aérienne

### CAROTTES, PANAIS, RADIS, BETTERAVES POTAGÈRES

0,19 L/ha (0,08 L/acre) à 0,38 L/ha  
(0,15 L/acre) plus 0,5% v/v de Carrier

30

Maximum 2 applications par année. Intervalle de 14 jour entre les applications.  
Maximum 0,38 L/ha (0,15 L/acre) par saison  
Volume de pulvérisation minimum de 100 L/ha



1.800.868.5444 | Nufarm.ca | NufarmHortCA

Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette pour plus d'information sur l'application pour contrôler les mauvaises herbes, les insectes et les maladies.  
Consultez l'étiquette du produit pour en apprendre davantage sur les homologations futures, nouvelles cultures, insectes et les modalités d'utilisation.  
Consultez l'étiquette du produit pour connaître les intervalles avant récolte.

Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette du produit.

Statue<sup>MC</sup> est une marque de commerce de Nufarm Agriculture Inc.

75116-03/21