

Rival^{MD} EC est un herbicide présemis incorporé, qui procure un contrôle fiable et efficace des graminées nuisibles et des espèces à feuilles larges dans les cultures horticoles.

Rival^{MD} EC

Avantages

- Effet résiduel à long terme contre les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées nuisibles tenaces
- Excellent outil de gestion de la résistance lorsqu'il est utilisé en combinaison ou en rotation avec d'autres herbicides
- Homologué pour une large gamme de cultures
- Élimine les désagréments du changement de produits lors de modification de la culture

Cultures homologuées

- Asperges
- Haricots de lima
- Rutabagas
- Haricots
- Pois
- Fraises
- Carottes

SEMIS DIRECT

- Chou
- Chou-fleur

TRANSPLANTÉ

- Brocoli
- Chou
- Poivrons
- Choux de Bruxelles
- Chou-fleur
- Tomates

Renseignements généraux

- Appliquer RIVAL EC uniformément à la surface du sol puis l'incorporer dans les prochains 24 heures
- S'assurer de détruire toutes les mauvaises herbes avant l'application de Rival
- Incorporer à une profondeur de 8-10 cm pour un maximum de contrôle des mauvaises herbes et obtenir une meilleure tolérance des cultures
- Incorporer avec une herse à disques dans un sol couvert de chaume ou de résidus de culture
- Incorporer avec un cultivateur seulement dans le cas de sols en bon état de culture
- Mélanger et enfouir tous ces résidus de culture au sol jusqu'à 10-15 cm de profondeur avec une herse à disque avant l'application
- NOTE: NE PAS LABOURER (CHARRUE À VERSOIR) LE CHAMP AVANT L'APPLICATION DE RIVAL EC



Informations techniques

HERBICIDE

> Groupe 3

MATIÈRE ACTIVE

> trifluraline 500 g/L

FORMAT

> Caisse de 2 x 9 L

HOMOLOGATION

> 18612

Directives d'utilisation particulière

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES

DOSE

INFORMATION SUR L'APPLICATION

ASPERGES

GRAMINÉES ANNUELLES NUISIBLES :

Pâturin Annuel	Sétaire verte
Pied de coq	Sétaire glauque
Brome	Gaillet
Brome des toits	Ivraie de perse
Digitaire	Eragrostide fétide
	Folle avoine

2-4 L/ha
(0,81-1,62 L/acre)

Appliquer seulement sur des asperges établies depuis au moins 3 ans

Consulter l'étiquette pour les directives d'utilisations spécifiques reliées au type de sol et la teneur en matière organique

MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES :

Mollugo-verticillé	Amarante
Stellaire moyenne	Pourpier
Saponaire des vaches	Soude roulante
Renouée	Renouée liseron
Chénopode blanc	

HARICOTS NOIRS, CHOU (semis direct ou transplanté), CHOU-FLEUR (semis direct ou transplanté), CRAMBE, HARICOTS SECS (blanc, kidney), FÉVEROLE, POIS (de grande culture, pour la transformation), CARTHAME, SAINFOIN, TOURNESOL

GRAMINÉES ANNUELLES NUISIBLES :

Pâturin Annuel	Sétaire verte
Pied de coq	Sétaire glauque
Brome	Gaillet
Brome des toits	Ivraie de perse
Digitaire	Eragrostide fétide
	Folle avoine

1,6-2,8 L/ha
(0,65-1,15 L/acre)

Appliquer et incorporer jusqu'à 3 semaines avant le semis

Consulter l'étiquette pour les directives d'utilisations spécifiques reliées au type de sol et la teneur en matière organique

MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES :

Mollugo-verticillé	Amarante
Stellaire moyenne	Pourpier
Saponaire des vaches	Soude roulante
Renouée	Renouée liseron
Chénopode blanc	

BROCOLI (transplanté), CHOUX DE BRUXELLE (transplanté), CAROTTES, POIVRONS, RUTABAGAS, HARICOTS MANGE-TOUT, FRAISES, TRÈFLES, TOMATES

GRAMINÉES ANNUELLES NUISIBLES :

Pâturin Annuel	Sétaire verte
Pied de coq	Sétaire glauque
Brome	Gaillet
Brome des toits	Ivraie de perse
Digitaire	Eragrostide fétide
	Folle avoine

1,6-2,2 L/ha
(0,65-0,90 L/acre)

Consulter l'étiquette pour les directives d'utilisations spécifiques reliées au type de sol et la teneur en matière organique

MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES :

Mollugo-verticillé	Amarante
Stellaire moyenne	Pourpier
Saponaire des vaches	Soude roulante
Renouée	Renouée liseron
Chénopode blanc	



1.800.868.5444 | Nufarm.ca | NufarmHortCA

Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette pour plus d'information sur l'application pour contrôler les mauvaises herbes, les insectes et les maladies. Consultez l'étiquette du produit pour en apprendre davantage sur les homologations futures, nouvelles cultures, insectes et les modalités d'utilisation. Consultez l'étiquette du produit pour connaître les intervalles avant récolte.

Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette du produit.

Rival® est une marque de commerce enregistrée de Nufarm Agriculture Inc.

75116-04/21