

MANCOZEB 75 WG

NUFARM

- Fungicida orgánico a base de Mancozeb 750 gr.i.a/kg.
- Formulado como gránulos dispersables (WG).
- Actúa por contacto.
- Ideal para el control preventivo de tizones en papa y para otras enfermedades fungosas en diversos cultivos.

Clasificación del grupo de familia:

Fungicida perteneciente al grupo de Ditiocarbamatos.

Ingrediente Activo:

Mancozeb.

Modo de acción:

Fungicida con acción multisitio.

Características técnicas:

Mancozeb 75 WG es un fungicida orgánico, preventivo y de contacto. Posee un amplio espectro de acción y está recomendado para el control preventivo de tizones temprano y tardío en papas y para otras enfermedades fungosas en diversos cultivos.



Grow a better tomorrow.

ENFERMEDADES CONTROLADAS / RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de aplicación
Papa	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1,0-2,5 kg/ha	Iniciar los tratamientos con plantas pequeñas y repetir cada 7-10 días mientras prevalezcan las condiciones favorables a la enfermedad.
Arveja	Tizón de la arveja (<i>Mycosphaerella pinoides</i>) Antracnosis (<i>Ascochyta pisi</i>)	2,0 kg/ha	Aplicar en condiciones de temperatura y humedad favorables al desarrollo de la enfermedad. Repetir cada 7-10 días.
Poroto	Antracnosis del poroto (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	200 g/100 l de agua	Aplicación preventiva con plantas chicas. En caso necesario repetir cada 7-10 días.
Tabaco	Moho azul del tabaco (<i>Peronospora tabacina</i>)	100 g/100 l de agua	Pulverizar dos veces por semana desde que las plantas tienen 1,5 cm de altura en almácigos.
Maní	Viruela temprana (<i>Mycosphaerella arachidis</i>) Viruela tardía (<i>Mycosphaerella berkeleyi</i>)	1,25-1,75 kg/ha	Iniciar los tratamientos con los primeros síntomas. Repetir cada 10-12 días o reducir a 7 días si las condiciones de temperatura y humedad son altamente favorables.
Cebada, Trigo	Mancha de la gluma y del nudo (<i>Septoria nodorum</i>). Mancha borrosa de la cebada (<i>Drechslera sativum</i>). Mancha de la hoja de trigo (<i>Septoria tritici</i>). Roya anaranjada del trigo (<i>Puccinia recondita f. sp. tritici</i>). Roya negra del trigo (<i>Puccinia graminis f. sp. tritici</i>). Tizón del nudo del trigo (<i>Drechslera graminis</i>)	2,5 kg/ha	Cuando está por iniciarse la espigazón y continuar cada 8 - 10 días. Se darán no menos de 2 a 3 pulverizaciones por temporada.
Arroz	Bruzzone parasitario (<i>Pyricularia oryzae</i>). Helmintosporiosis del arroz (<i>Drechslera oryzae</i>)	3,5 a 4,0 kg/ha	Al aparecer las panojas y repetir una a dos veces más con intervalo de 7-10 días.

RESTRICCIONES DE USO

Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir: 7 días para acelga, remolacha, arveja, chaucha japonesa, espinaca, papa y tomate; 14 días para: apio, maní; 4 días para: zapallo, melón, pepino; 21 días para: cerezo, ciruelo, damasco, citrus, durazno, manzano, peral, vid; 25 días para tabaco y arroz; 30 días para cebada, trigo. Florales y ornamentales: sin restricciones.

"En caso que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período máximo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".



FUNGICIDAS