

MATRERO 35

- **Insecticida neonicotinoide a base de Imidacloprid 350 gr.i.a/lit.**
- **Formulado como suspensión concentrada (SC).**
- **Gran control de insectos tanto en aplicación foliar como por riego.**
- **Excelente sistemía en la planta.**
- **Es compatible con otros insecticidas y fungicidas neutros.**

Clasificación del grupo de familia:

Insecticida perteneciente al grupo de los Neonicotinoides .

Ingrediente Activo:

Imidacloprid.

Modo de acción:

Agonista del receptor nicotínico de la acetilcolina.

Características técnicas:

Matrero 35 es un insecticida con amplio espectro de acción y prolongado período de protección en diversos cultivos. Posee acción sistémica con movimiento acrópeto en el vegetal, actuando por ingestión y contacto sobre el insecto, mediante la interferencia en la transmisión de estímulos nerviosos, provocando un desorden en el sistema nervioso con la consecuente muerte del insecto.



Grow a better tomorrow.

PLAGAS CONTROLADAS / RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Cultivo	Plaga	Dosis			Momento de aplicación
		Aspersión Foliar (AF)	Riego por Goteo (RG)	Planta por planta (PP)	
Papa	Bicho torito o bicho candado (<i>Diloboderus abderus</i>) Gorgojo del tomate (<i>Phydrenus muriceus</i>) Gusano blanco (<i>Maecolaspis bridarolli</i>) Gusano blanco o escarabajo rubio (<i>Cyclocephala signaticollis</i>) Gusano minador del tallo (<i>Faustinus cubae</i> , <i>F. variegatus</i>) Gusano alambre (<i>Agriotes spp.</i>)		1 l/ha		(*)
	Pulgón de la papa (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Pulgón verde del duraznero, pulgón rojo (<i>Myzus persicae</i>)	250 cm ³ /ha			
	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes spp.</i> , <i>Aleurothrixus spp.</i>) Pulgón verde del duraznero, pulgón rojo (<i>Myzus persicae</i>) Pulgón de la papa (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	30 - 50 cm ³ /hl	1 - 1,5 l/ha	35 - 60 cm ³ /10 litros de agua	
Tabaco	Gusano minador del tallo (<i>Faustinus cubae</i> , <i>f. variegatus</i>) Pulgón rojo (<i>Myzus nicotianae</i>)		500 cm ³ /hl		Por inmersión.

(*) En **Aspersión Foliar (AF)**: aplicar ante la presencia de la plaga; en aplicaciones de **Riego por Goteo (RG)**: hacer una primera aplicación después del trasplante y la segunda 45 a 50 después de la primera; en aplicaciones **Planta por Planta (PP)**: aplicar con mochila gastando 15 cm³ de solución/planta utilizando las dosis menores para altas densidades de plantación utilizando el mismo criterio de momento que para el riego por goteo.

