



MALAGA PAK



**POTRÓJNY CIOS
NA CHWASTY W KUKURYDZY**

HERBICYD



☛ Zestaw herbicydowy przeznaczony do kompleksowego zwalczania chwastów w kukurydzy.

☛ Zestaw zawiera:

 TANDUS® 200 EC  NOTOS® MAX 100 SC  IKANOS® 040 OD


 **nufarm**



MALAGA PAK

Malaga Pak - Działanie na chwasty

Działanie kontaktowe i systemiczne przez liście



Szybki efekt nalistny

**Fluoksypyr, Mezotrion,
Nikosulfuron**

Utrwalenie efektu

Mezotrion

Działanie systemiczne przez korzenie

Chwasty monokultury kukurydzianej:

- Psianka czarna
- Bylica pospolita
- Bodziszek drobny
- Rdest ptasi
- Skrzyp polny
- Ostrożeń polny
- Zaślaz pospolity
- Ambrozja bylicolistna

Malaga Pak - Zalety zestawu





- Fluoksypyr w formie estru meptylowego która lepiej wchłania się do wnętrza roślin.
- Potrójne działanie: 3 substancje aktywne z 3 grup chemicznych o różnym mechanizmie działania znane z wysokiej skuteczności chwastobójczej.
- Kompletne rozwiązanie: Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów zarówno jedno jak i dwuliściennych.
- Szybka i zdecydowana reakcja chwastów: Pierwsze objawy uszkodzeń widoczne na chwastach już po 2 - 3 dniach od zabiegu.
- Dobre zabezpieczenie plantacji przed zachwaszczeniem wtórnym: działanie rezydualne mezotrionu pozwala kontrolować chwasty, które pojawiają się po zabiegu.
- Ekonomiczne rozwiązanie dla kukurydzy.
- Jeden zabieg - pole czyste do zbioru.

Malaga Pak - Zalecenia stosowania

- Zestaw najlepiej działa w temperaturze powyżej 5°C. Pierwsze objawy działania takie jak chlorozy i nekrozy w górnych partiach roślin są widoczne po upływie 2 - 3 dni.
- Całkowite zamieranie chwastów następuje po okresie 3 tygodni, ale w warunkach mniej sprzyjających działaniu środka może trwać do 6-8 tygodni.
- Zestaw zwalcza chwasty w początkowych fazach rozwojowych to jest do fazy 5-6 liści chwastów. Przytulia czepna jest zwalczana do wysokości 20 cm. Maruna bezwonna jest zwalczana do wysokości 8 cm.
- Termin stosowania: Zestaw stosować przed fazą szóstego liścia

Malaga Pak - Spektrum zwalczania chwastów

Skuteczność poszczególnych produktów oceniona na podstawie badań przeprowadzonych w stacji doświadczalnej Nufarm Polska w 2021 r.

Produkt: 1 L/ha	 TANDUS® 200 EC	 NOTOS® MAX 100 SC	 IKANOS® 040 OD	 MALAGA PAK
Bniec biały	Green	Light Green	Light Green	Green
Bodziszek drobny	Orange	Orange	Orange	Orange
Bylica pospolita	Green	Yellow	Yellow	Green
Chaber bławatek	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green
Fiolatek polny	Yellow	Light Green	Light Green	Green
Gorzycza polna	Green	Green	Green	Green
Gwiazdnica pospolita	Green	Green	Yellow	Green
Iglica pospolita	Yellow	Orange	Orange	Light Green
Jasnot różowa	Green	Green	Light Green	Green
Jasnota purpurowa	Green	Green	Green	Green
Komosa biała	Yellow	Green	Light Green	Green
Mak polny	Green	Green	Green	Green
Maruna bezwonna	Green	Green	Green	Green
Mlecz polny	Green	Light Green	Light Green	Green
Niezapominajka polna	Green	Green	Yellow	Green
Ostrożeń polny	Yellow	Light Green	Yellow	Green
Ostróżeczka polna	Green	Light Green	Light Green	Green
Powój polny	Light Green	Light Green	Yellow	Green
Poziewnik Szorstki	Light Green	Green	Green	Green
Przetaczniki	Yellow	Light Green	Yellow	Light Green
Przytulia czepna	Green	Yellow	Yellow	Green
Psianka czarna	Light Green	Yellow	Yellow	Light Green
Rdest plamisty	Light Green	Light Green	Orange	Green
Rdest powojowy	Green	Yellow	Orange	Green
Rdest ptasi	Yellow	Green	Orange	Green
Rumian polny	Green	Green	Yellow	Green
Rzodkiew świrzepa	Green	Green	Yellow	Green
Samosiewy rzepaku	Green	Green	Yellow	Green
Skrzyp polny	Green	Orange	Orange	Light Green
Stulicha psia	Light Green	Green	Yellow	Green
Szarłat szorstki	Light Green	Orange	Green	Green
Tasznik pospolity	Green	Green	Green	Green
Tobetek polny	Green	Green	Green	Green

legenda:



<100%



<85%



<75%



<50%




MALAGA PAK

Malaga Pak - Podstawowe informacje o zestawie

Nazwa	TANDUS 200 EC	NOTOS MAX 100 SC	IKANOS 040 OD
Uprawy	kukurydza, pszenica ozima, jęczmień ozimy	kukurydza	kukurydza
Substancja aktywna	fluroksypyr - 200 g/L	mezotrion - 100 g/L	nikosulfuron - 40 g/L
Typ formulacji	EC	SC	OD
Kod HRAC	fluroksypyr zaliczana jest do grupy O	mezotrion zaliczany jest do grupy F2	nikosulfuron zaliczany jest do grupy B
Czas aplikacji	w kukurydzy 12-16 BBCH	12-18 BBCH	12-17 BBCH
Dawka	0,6-1 L/ha	0,5-1,5 L/ha	1,0 L/ha
Dostępny zestaw na 5 ha	3 L	5 L	5 L

Malaga Pak - Rekomendacja wspólnego stosowania



WARTO PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 26 bud. E, 02-135 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52, www.nufarm.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Szukaj nas na:

- Nufarm Polska - Facebook
- Nufarm Polska - YouTube
- Nufarm Polska - Instagram
- @nufarmpolska - TikTok

