

Фунгіцид МАКАС®

Обов'язковий елемент у вирощуванні соняшника та
зернових колосових

Карбендазим 500г/л

МАКАС®

Загальна інформація

МАКАС®

Позиціонування

Фунгіцид системної дії
для захисту соняшнику та
зернових культур від
основних хвороб



МАКАС®

Профіль препарату

Діюча речовина

карбендазим 500 г/л

Препаративна форма

концентрат суспензії

Упаковка

5 л

Культури

соняшник, оз. та яра пшениця, цукрові буряки

Спектр дії

Біла гниль, сіра гниль, фомоз, несправжня борошниста роса, септоріоз листя, гельмінтоспоріоз, церкоспороз

МАКАС®

Переваги

- Виражена профілактична та лікувальна дія
- Надійний захист всіх частин рослини завдяки високій системності
- Ефективний при низьких температурах, починаючи з +8°C

МАКАС®

Механізм дії карбендазиму

- МАКАС® має системну дію
- Швидко поглинається листками і переміщується знизу догори
- Карбендазим зупиняє процес поділу ядра клітин патогенів, що спричиняє загибель грибів - збудників хвороб



МАКАС®

Спектр дії

Соняшник

- Біла гниль
- Сіра гниль
- Фомоз
- Пероноспороз

Пшениця

- Борошниста роса
- Септоріоз листя
- Бура плямистість

Цукрові буряки

- Церкоспороз

МАКАС®

Період захисної дії

- Становить до 3-х тижнів
з моменту обробки



МАКАС®

Регламент та особливості застосування

МАКАС®


Регламенти застосування

Культура	Цільовий об'єкт	Норма, л/га	Фаза культури
Соняшник	Біла та сіра гнилі, фомоз, несправжня борошниста роса	0,5	Обприскування в період вегетації
Озима пшениця, яра пшениця*	Борошниста роса, септоріоз листя, гельмінтоспоріоз	0,5	Обприскування в період вегетації
Цукрові буряки*	Іржа, бура іржа, гельмінтоспоріоз, фузаріоз	0,3 – 0,4	Обприскування в період вегетації

* — Світовий досвід використання


МАКАС®

Технічне позиціонування на соняшнику



МАКАС®

Технічне позиціонування на озимій пшениці



МАКАС®

Особливості застосування

Найбільш ефективні профілактичні обробки або при появі перших ознак хвороб

На соняшнику та зернових колосових допускається до 2 обробок за вегетацію

Температура повітря не вище 25 °С

Норма робочого розчину 150-250 л/га

Не допускати замерзання препарату при його зберіганні!

МАКАС®

Бакові суміші

МАКАС[®]

Дуже добре поєднується з іншими фунгіцидами

- Для розширення спектру дії рекомендуються бакові суміші з фунгіцидами Компакт Плюс[®], Тейзер[®], Орбіт[®] або Орбіт[®] Про
- Норми використання:
 - 1) Макас[®] + Орбіт[®] 0,5 + 0,5 л/га
 - 2) Макас[®] + Орбіт[®] Про 0,5 + 0,75 л/га
 - 3) Макас[®] + Тейзер[®] 0,5 + 0,5 л/га
 - 4) Макас[®] + Компакт Плюс[®] 0,5 + 0,5 л/га

МАКАС®+КОМПАКТ ПЛЮС®

Додаткові переваги

- Розширення спектру дії, наприклад проти фомопсису
- Зменшення ризику виникнення резистентності
- Підсилена ефективність проти білої гнилі
- Підсилена лікувальна дія

МАКАС®


Результати застосування в Укарїні

Результати застосування МАКАС[®]+КОМПАКТ[®] ПЛЮС



МАКАС[®] + КОМПАКТ ПЛЮС[®] 0,5 + 0,5 л/га
Київська обл. 2018

Фото Нуфарм Україна



Навіть в умовах вологого літа 2018 року,
вдалося зберегти листову поверхню неураженою

Фото Нуфарм Україна

Переваги МАКАС®

- Виражена профілактична та лікувальна дія
- Надійний захист всіх частин рослини завдяки високій системності
- Ефективний при низьких температурах, починаючи з +8 °С

Дякую за увагу!

ПІБ доповідача
name.surname@nufarm.com



Grow a better tomorrow