

U-46[®]

D COMPLET

**se adapta perfectamente
a las dos temporadas**



**sobre
el cultivo**

**en
pre-siembra**

U-46[®]

dos temporadas en un solo producto

D COMPLET



U46[®] D COMPLET es un herbicida sistémico (2,4 D como sal dimetilamina 600 g/L) para el control de las malas hierbas de hoja ancha anuales y vivaces tanto en pre-siembra como con el cultivo establecido.

Al ser un Fenoxiacido, el U46[®] D COMPLET es absorbido por las partes verdes y se transloca a todos los órganos de la planta, provocando la muerte progresiva de la misma en un plazo de entre 15 y 30 días.

Espectro de control de malas hierbas

Eficacia alta

Eficacia media

Adonis

Amarantus

Arabis

Artemisia

Atriplex

Capsella

Cardamina

Cardamine hirsuta

Centaurea

Chenopodium

Chrysanthemum

Cirsium

Convulvulus

Dilpotaxis

Epilobium

Erigeron

Erysium

Euphorbia

Galinsoga

Geranium

Lapsana

Legousia

Lepidium

Lithospermum

Lychnis

Ortiga

Papaver

Ranunculus

Rapistrum

Reseda

Rumex

Senecio

Sinapis

Sisymbrium

Sonchus

Thlaspi

Tussilago

Vicia

Alfalfa (rebrotos)

Trebol (rebrotos)

Colza (rebrotos)

Girasol (rebrotos)

En pre-siembra en terrenos agrícolas y entre cultivos:

U-46[®]D COMPLET está registrado a 1,4 L/ha. Según el estado de las hierbas aplicar:

- entre 1 y 1,4 L/ha si sólo hay hoja ancha.
- entre 0,7 y 1,4 L/ha mezclado con Glifosato si hay hoja ancha y hoja estrecha.

Cereales de invierno (trigo blando y duro, cebada, centeno y triticale):

Aplicar 1,4 L/ha desde final de ahijado hasta el estadio de 2 nudos, si la temperatura está entre 10 y 12 °C. A temperaturas superiores, o si las malas hierbas son de fácil control, reducir la dosis (hasta 0,7 L/ha, como en cereales de primavera).

Cereales de primavera (trigo y cebada de ciclo corto):

Aplicar 0,7 L/ha desde final de ahijado hasta el estadio de 2 nudos.

Céspedes de gramíneas:

Sólo en primavera realizar una única aplicación a la dosis de 1,2 L/ha.

Maíz: Aplicar 2 L/ha cuando el cultivo esté entre los estadios de 2 a 6 hojas. Realizar tratamientos dirigidos.

Sorgo, mijo y panizo: Aplicar 1,2 L/ha cuando el cultivo esté entre los estadios de 2 a 6 hojas. Realizar tratamientos dirigidos.

Melocotón, albaricoque y ciruelo: Aplicar 1,6 L/ha en cultivos establecidos. Sólo se tratará la fila del cultivo, con una superficie máxima de campo tratado del 50%. El herbicida se aplicará en primavera sobre las hierbas, o en otoño después de la cosecha, cuando los brotes estén agostados. Los tratamientos deben ser dirigidos para evitar mojar el árbol. Sólo se aplicará en plantaciones de más de 4 años.

Espárrago. Aplicar en tratamiento dirigido, 1,2 L/ha después de la cosecha.

Lavanda y lavandín:

Aplicar 0,6 L/ha sólo hasta que el cultivo tenga 10 centímetros de altura.

Lirio de los valles (muguete):

Aplicar 1,6 L/ha después de haber realizado la cosecha.

Praderas permanentes:

Aplicar 2,4 L/ha sobre hierba perenne desarrollada.

La aplicación de U-46[®] D COMPLET se realizará utilizando un caldo comprendido entre 200 y 400 litros de agua/hectárea, con tractor de cabina cerrada y dotado de barra hidráulica con boquillas de baja deriva, y en invernadero (sólo lirio del valle) con lanza o pistola de pulverización.

