



JOUST 250 EC®

ÁLTALÁNOS ADATOK

Hatóanyag	250 g/l protikonazol
Hatóanyagcsoport	Triazol típusú gombaölő szerek (FRAC „3”)
Rendeltetés	Gombaölő permetezőszer
Hatáskifejtés	Ergoszterol bioszintézis gátlása
Formuláció	Emulzióképző koncentrátum (EC)
Csomagolás	5 literes műanyag kanna
Forgalmi kategória	I.
Munkaegészségügyi várakozási idő	0 nap (száradásig)
Eltarthatóság	2 év
Figyelmeztetés	Figyelem
Méhveszélyesség	Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség	Nem jelölésköteles
Vízveszélyesség	Kifejezetten veszélyes
Egyéb	–

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Kalászosokban a lisztharmat, a levélfoltosságok és a rozsdák elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges elkezdni. A kezeléseket a fertőzési veszélyhelyzet függvényében 14-21 nap elteltével javasolt megismételni. **Búzában** és **árpában** a kalászfuzáriózis elleni védekezést javasolt a virágzás kezdetére időzíteni. Fertőzésre hajlamosító körülmények között, illetve nagy fertőzési nyomás fennállásakor (kivéve: árpa és zab kultúrában) az engedélyezett nagyobb dózis (0,8 l/ha) kijuttatása szükséges.

Őszi és tavaszi káposztarepce, mustár, olajretek és **magvas gomborka** kultúrában a plenodómuszos betegség elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel a szárbaindulás kezdetén javasolt megkezdni. A készítményt a szklerotíniás betegség (fehérpenész) és az alternáriás betegség ellen szintén előrejelzésre alapozva a virágzás időszakában ajánlott kijuttatni. Fertőzésre hajlamosító körülmények között, illetve nagy fertőzési nyomás fennállásakor az engedélyezett nagyobb dózis (0,7 l/ha) kijuttatása szükséges.

A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében a készítményt ajánlott más hatásmechanizmusú hatóanyagokat tartalmazó fungicidekkel szerrotációban, alternálva kijuttatni.

A permetlé mennyiségét a megadott értékhatárokon belül a kezelendő növényfelület nagyságához, illetve a permetezőgép típusához kell igazítani. A kijuttatáskor törekedni kell a kultúra egyenletes és teljes permetléfedettségére.

A légi kijuttatás nem engedélyezett.

FELHASZNÁLHATÓ

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Dózis (l/ha)	Kezelés ideje
őszi búza, tavaszi búza, durumbúza, tönkölybúza, tönkebúza, alakor	szeptóriás levélfoltosság, szeptóriás pelyvafoltosság, vöröszrozsda (levélrozsdá), sárgarozsda, lisztharmat, pirenofóras betegség, kalászfuzáriózis	2	0,6–0,8	szárba indulástól (BBCH 30) virágzás végéig (BBCH 69)
árpa őszi és tavaszi	törperozsda, lisztharmat, pirenofóras betegség, rinospóriumos levélfoltosság, ramuláriás levélfoltosság, kalászfuzáriózis	2	0,6	szárba indulástól (BBCH 30) virágzás kezdetéig (BBCH 61)
tritikálé	szeptóriás levélfoltosság, szeptóriás pelyvafoltosság, vöröszrozsda (levélrozsdá), lisztharmat, rinospóriumos levélfoltosság, kalászfuzáriózis	2	0,6–0,8	szárba indulástól (BBCH 30) virágzás végéig (BBCH 69)
roz	szeptóriás levélfoltosság, rinospóriumos levélfoltosság, barnarozsda (levélrozsdá), lisztharmat	2	0,6–0,8	szárba indulástól (BBCH 30) virágzás végéig (BBCH 69)
zab	lisztharmat, koronás rozsdá	2	0,6	szárba indulástól (BBCH 30) virágzás kezdetéig (BBCH 61)
káposztarepce őszi és tavaszi	lisztharmat, szklerotíniás betegség, alternáriás betegség, plenodómuszos (fómás) betegség	2*	0,6–0,7	4 leveles állapottól (BBCH 14) virágzás végéig (BBCH 69)

Kiskultúrás felhasználások a 1107/2009/EK rendelet 51. cikke alapján
A felhasználások nincsenek alátámasztva délkeleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ezekben a kultúrákban kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

mustár, olajretek, magvas gomborka	lisztharmat, szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás betegség, plenodómuszos (fómás) betegség	2	0,6–0,7	oldalhajtások kialakulásától (BBCH20) virágzás végéig (BBCH69)
------------------------------------	---	---	---------	--

* A készítménnyel ugyanabban az állományban egy őszi és egy tavaszi vagy két tavaszi kezelés végezhető. A készítmény kijuttatása tavasszal az oldalhajtások kialakulásának kezdetétől (BBCH 20) engedélyezett.



KIJUTTATÁSI TANÁCSOK

Felszívódó gombaölő szer. Több kultúrában felhasználható, széles hatásspektrumú fungicid. A kijuttatását mindig finom porlasztással, 250–400 mikronos átlagos cseppnagysággal, 50–70 csepp/cm² fedettséggel kell biztosítani. A hatóanyag a permetezés helyén felszívódik, majd csúcsi irányban szállítódik. A védendő területet teljes egészében le kell permetezni, különben a töhöz közelebb eső részek védtelenek maradnak. Ha sűrű az állomány (szántóföldön), akár kettős lapos sugarú szórófej is használható. Álló kultúrákban (szőlő) nagy levegőszállítási kapacitású permetezőgéppel kell elvégezni a kijuttatást.

Fúvókaajánlás: Kettős lapos sugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben, de ez utóbbi esetben 4 bar körüli nyomáson üzemeltetve.



folyékony, üledékmentes formuláció



0,6–0,8 l/ha szeptóriás levélfoltosság, szeptóriás pelyvafoltosság, vöröszrozsda, sárgarozsda, lisztharmat, pirenofóras betegség, kalászfuzáriózis ellen



0,6–0,7 l/ha lisztharmat, szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás betegség, plenodómuszos (fómás) betegség ellen



www.facebook.com/nufarmhungaria



www.youtube.com/user/NufarmerHungary




Kérdése van? Szakmai tanácsra van szüksége?
KERESSE KÉPVISELŐINKET!
Telefonja kamerájával beolvasva a QR-kódot megtalálja elérhetőségeinket.



JOUST®
gombaölő szer

Az év terméke

NUFARM INNOVÁCIÓ AMIDE active



Nufarm
Grow a better tomorrow