

U 46[®] PRATI

COMPOSIZIONE

2,4 DB 22,2% (=250 g/l)
Coformulanti q.b. g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 – Nocivo se ingerito. H318 – Provoca gravi lesioni oculari.
H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P301 + P312 – In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro antiveneni o un medico. P330 – Sciacquare la bocca. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

NUFARM ITALIA S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A Milano; via Guelfa, 5 - Bologna.
Tel. +39 051 0394022

Officina di produzione:

Nufarm UK Limited, Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, UK
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Strasse 25, A402, Linz, Austria

Registrazione n 13709 del Ministero della Salute del 17/10/2011

Contenuto netto: 1-5-10-20 Litri

Partita N°:



PERICOLO

CARATTERISTICHE

È una soluzione di sale dell'acido 2,4 DB che trova impiego nella lotta contro le erbe a foglia larga (romice compreso), che infestano i cereali, medicinali, trifogliati nonché prati polifiti. Risulta infatti selettivo per le leguminose foraggere e per le graminacee.

EPOCA D' APPLICAZIONE

Eseguire il trattamento quando la prima foglia è completamente sviluppata e sino alle soglie della fioritura. Per erba medica nata da seme intervenire solo nel periodo compreso tra la 1° e la 4° foglia trilobata.

DOSI D'IMPIEGO

Diserbo prati polifiti: Dose 5-7,2 l/ha. Numero massimo di trattamenti: 1.

U 46[®] PRATI è efficace contro il romice da seme e alcune infestanti a foglia larga: *Rumex spp.* (Romice), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Sinapsis arvensis* (Senape), *Solanum migrum* (Erba cipollina), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Taraxacum officinalis* (Soffione), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Papaver rhoens* (Papavero), *Plantago spp.* (Piantaggine), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaco oleracea* (Erba porcellana), *Sonchus spp.* (Crespino dei campi), *Thalapsi arvense* (Erba storna), *Artemisa vulgaris* (Artemisia), *Centaurea cyanos* (Fiordaliso), *Galcopsis tetrahit* (Canapa selvatica), *Lamium spp.* (Lamio), *Stellaria media* (Stellaria), *Veronica persica* (Veronica).

Interventi primaverili: diserbare con temperature non inferiori a 16-18°C, con leguminose tra la 1° e la 4° foglia trilobata (prati al primo anno) o tra la 1° foglia trilobata e l'inizio della fioritura (prati più vecchi), alla dose di 5-7,2 l/ha.

Interventi estivi: diserbare con temperature non inferiori a 24-25°C (nelle ore più calde della giornata) e con piante di romice vicine all'emissione dello scapo fiorale, alla dose di 5-7,2 l/ha.

Diserbo foraggere leguminose (medicai , trifogliati): trattare tra la 2° e la 4° foglia oppure dopo il primo sfalcio, al ricaccio della coltura e delle infestanti alla dose di 5-7,2 l/ha.

Numero massimo trattamenti: 1

Diserbo cereali semina invernale e primaverile (Frumento, orzo, avena, segale, triticale): intervenire durante la fase di levata, alla dose di 4-5 l/ha.

Numero massimo trattamenti: 1

COMPATIBILITA'

U 46[®] PRATI è compatibile con gli erbicidi a reazione neutra.

Avvertenza: In caso di miscibilità con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può danneggiare colture sensibili, quali vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi ecc. Le attrezzature impiegate per il trattamento con **U 46[®] PRATI** devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

AVVERTENZA: effettuare un saggio preventivo su una pianta piccola superficie per rilevare se esistono eventuali sensibilità delle colture.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER TRIFOGGIO E PRATI POLIFITI; 70 GIORNI PRIMA PER I CEREALI A SEMINA INVERNALE E PRIMAVERILE.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

® Marchio registrato Nufarm

Prescrizioni supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni per il medico:

Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporefflessia, nevriti e neuropatie, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni EC. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione. Gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.