

# NUPRID<sup>®</sup> Supreme SC

INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO  
PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE  
CONCENTRATO SOLUBILE

## COMPOSIZIONE

100 GRAMMI DI PRODOTTO

CONTENGONO:

**Imidacloprid puro ..g 17,8 (200 g/l)**

coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

## INDICAZIONI DI PERICOLO

**EUH208-** Contiene 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one e 2-methyl-2H-isothiazole-3-one, può provocare una reazione allergica.

**H410** – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

**P264** – Lavare accuratamente dopo l'uso. **P273** – Non disperdere nell'ambiente. **P281** – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. **P391** – Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P405** – Conservare sotto chiave. **P501** – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:

**EUH401** – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



Nufarm Italia S.r.l.

Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI)

Sede operativa Via Guelfa, 5 – Bologna Tel. 051 0394022

## Officine di produzione:

**Alchimex SA** – Str. Stirbei Voda nr. 58, 010116 Bucuresti, Sector 1 - Romania

**Nufarm SAS** – Gaillon (France)

**Safapac limited** – Peterborough (UK)

**S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A.** – Cotignola (RA)

**Althaller Italia S.r.l.** – San Colombano (MI)

Registrazione del Ministero della Salute n. 14828 del 25/01/2011

## Contenuto netto:

ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3

Partita n° .....

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta. E' inoltre consigliabile tabellare l'area trattata con opportuni cartelli, ad esempio: **ATTENZIONE CAMPO TRATTATO CON PRODOTTI ANTIPARASSITARI** per evitare che incautamente persone estranee vi accedano. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la con-



**ATTENZIONE**

taminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta di lavoro. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.**

## CARATTERISTICHE

**NUPRID Supreme SC** è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in serre permanenti.

Le piante floreali ed ornamentali trattate, in tutta la fase di coltivazione, non possono essere poste né trapiantate all'esterno durante il ciclo produttivo.

## Orticole:

- **Pomodoro, melanzana:** contro afidi (*Aphis gossypii*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/ 100 l ). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.

- **Zucchini, cetriolo, peperone, cocomero, melone:** contro afidi (*Aphis gossypii*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.

- **Fagiolo e fagiolino:** contro afidi (*Aphis acanthi*, *Aphis craccivora*, *Aphis fabae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto.

- **Fragola:** trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragaefolii*) e aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*): distribuire 0,75 l/ha.

**Le colture trattate in serra non possono essere poste all'esterno fino alla conclusione del raccolto.**

**Floreali ed ornamentali:** contro afidi (es. *Aphis gossypii*, *Macrosiphoniella chrysanthami*, *Macrosiphum rasae*) e *Metcalfa pruinoso*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto; su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione.

Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. **Le piante trattate in serra non possono essere poste all'esterno fino a conclusione della fioritura.**

**MODALITA' DI IMPIEGO:** effettuare al massimo un trattamento l'anno.

Aggiungere il NUPRID Supreme SC direttamente nella botte.

**NOCIVITA':** Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 3 giorni per fagiolo, fagiolino, cetriolo e zucchini; 7 giorni per pomodoro, melanzana, peperone, cocomero, melone; 30 giorni per fragola prima del raccolto.**

## Avvertenze agronomiche:

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali.

**ATTENZIONE – DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO**

ATTENZIONE: Usare occhiali di protezione durante la fase di miscelazione/carico del prodotto

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.  
PER EVITARE RISCHIER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO  
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**

**DA NON VENDERSI SFUSO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
NON OPERARE CONTRO VENTO  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.**

Conservare al riparo dal gelo

# NUPRID<sup>®</sup> Supreme SC

INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE  
CONCENTRATO SOLUBILE



ATTENZIONE

## COMPOSIZIONE

100 GRAMMI DI PRODOTTO CONTENGONO:

**Imidacloprid puro g 17,8 (200 g/l)**

coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

## INDICAZIONI DI PERICOLO

EUH208- Contiene 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one e 2-methyl-2H-isothiazole-3-one, può provocare una reazione allergica. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



**Nufarm Italia S.r.l.**

Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI)

Sede operativa Via Guelfa, 5 – Bologna – Tel. 051 0394022

## Officine di produzione:

**Alchimex SA** – Str. Stirbei Voda nr. 58, 010116 Bucuresti, Sector 1 - Romania

**Nufarm SAS** – Gaillon (France)

**Safapac limited** – Peterborough (UK)

**S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A.** – Cotignola (RA)

**Althaller Italia S.r.l.** – San Colombano (MI)

Registrazione del Ministero della Salute n. 14828. del 25/01/2011

**Contenuto netto:** ml 5, 10, 50, 100

Partita n°.....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE