KESTREL® La formulazione che fa la differenza

Aggiornamento 2025
nuova etichetta adeguamento mrl

SUMITOMO CHEMICAL

Nufarm

Una formulazione unica

KESTREL®

Acetamiprid 200 g/l

Liquido concentrato solubile



La formulazione di KESTREL è stata sviluppata con co-formulanti di ultima generazione che migliorano l'assorbimento del p.a. da parte delle piante e degli insetti, aumentando:

+ **Efficacia**
+ **Durata d'azione**
+ **Resistenza al dilavamento**



Grazie all'attività sistemica e translaminare KESTREL è in grado di controllare fitofagi presenti sulla vegetazione in accrescimento o sulla pagina inferiore

Nufarm

Una formulazione unica

KESTREL®

La formulazione concentrata di KESTREL è perfettamente miscibile con altri agrofarmaci e fertilizzanti e consente di ridurre di 4 volte il volume di formulato utilizzato rispetto ad altri formulati di acetamiprid liquidi o polvere:

- ✓ **Minore prodotto da movimentare**
- ✓ **Ridotto ingombro magazzino**
- ✓ **Meno contenitori da smaltire**

Nufarm

Nuova etichetta dal 19 febbraio 2025
Cosa è cambiato?

KESTREL®

Mele e pere
(mantenuti 2 trattamenti)
- modifica intervallo trattamenti: ogni 60 gg.
- dose massima 0,25 L/ha
- Intervallo pre-raccolta: 21 giorni

Albicocco, pesco e nettarine
- massimo 1 trattamento all'anno
- dose massima 0,2 L/ha
- Intervallo pre-raccolta: 21 giorni

vite (da tavola e da vino)
- dose massima 0,25 L/ha
- Intervallo pre-raccolta: 21 giorni

Olivo da tavola fogliare
(impiego su olivo da olio e con esca non cambia):
- 1 trattamento all'anno
- dose massima 0,40 L/ha
- Intervallo pre-raccolta: 28 giorni

pomodoro (in campo):
- 1 trattamento per ciclo colturale
- dose massima 0,3 L/ha
- Intervallo pre-raccolta: 14 giorni

pomodoro (in serra):
- 1 trattamento per ciclo colturale
- dose massima 0,25 L/ha

Eliminate: lattughe e peperone

Nufarm

VITE Efficacia *Scaphoideus titanus* dopo 1 trattamento

KESTREL®

AGREA

Valpolicella (VR) cv Corvina

Data Trattamento: A 16/06/23

Testimone 13 neanidi su 100 foglie al pre-controllo (16/06)

25 neanidi su 100 foglie al 2° controllo (19/06)



VITE EFFICACIA *Erasmoneura vulnerata*

KESTREL®

Agrea 2020

Monteforte d'Alpone (VR) – VITE cv Garganega

Trattamento 5 giugno 2020



Foto E. Marchesini AGREA

TESTIMONE		
Data		individui/foglia
5/6	0 da A	1,9
8/6	3 da A	2,1
17/6	14 daA	1,2
5/8	60 da A	1,3 (2ª gen)

KESTREL evidenzia un ottimo controllo ed una elevata durata di protezione anche a dosaggi ridotti

Nufarm

VITE Efficacia *Cocciniglia** (*Planococcus ficus*)

KESTREL®

Vite

Media di 5 prove svolte in Italia e Spagna

1 applicazione a migrazione neanidi



Foto E. Marchesini AGREA

*parassita non autorizzato, estensione d'impiego attesa

Nufarm

VITE Efficacia tignoletta (*Lobesia botrana*)

KESTREL®

Media di 2 prove svolte in Italia
Volume 10hl/ha
1 sola applicazione a inizio nascita larve 2a gen

Non trattato danno medio:
INC: 68% grappoli attaccati
SEV: 3,6 acini dann./grappolo



Nufarm

VITE POSIZIONAMENTI

KESTREL®

1 applicazione all'anno
Max 0,25 l/ha

Post fioritura-pre-chiusura
Cicaline e tignoletta
att. Collaterale cocciniglia

Pre-chiusura – invaiatura
Cicaline e tignoletta
att. Collaterale cocciniglia e
Drosopila



* Insetti su cui è in corso estensione, non presenti in etichetta

Nufarm

KESTREL®

VITE DA VINO E DA TAVOLA

Dose	25-45 ml/hl
Dose max	0,25 l/ha
Nr trattamenti	1
Intervallo pre-raccolta	21 gg

Punti di forza

- ✓ **Formulazione ad elevata efficienza**
- ✓ **Efficacia confermata a 0,25 l/ha (50 g/ha)**
- ✓ **21 gg di carenza importante per varietà a raccolta precoce e alcuni parassiti: tignola 2-3° gen cicaline estive** (e *Drosophila*)
- ✓ **Ridotta buffer zone da corpi idrici (10 m)**
- ✓ **Strategia vincente con KAIMO SORBIE e SIMPELL (cialine, tignoletta** e tripidi)
- ✓ **Basse dosi, meno contenitori, stoccare e da movimentare e smaltire**
- ✓ **Ideale per macchine a recupero (dose inf. autorizzata)**
- ✓ **Costo / beneficio conveniente per agricoltore**

Nufarm