

# JOUST® PRO

FUNGICIDA SISTEMICO  
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

|             |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| GRUPPO FRAC | 3, 11 | FUNGICIDA |
|-------------|-------|-----------|

## JOUST® PRO

### Composizione

100 g contengono:

Protioconazolo puro 13,6 g (= 150 g/l)

Azoxystrobina pura 13,6 g (= 150 g/l)

coformulanti quanto basta a 100 g

**Contiene: Protioconazolo; Azoxystrobina; Alcool-etossilato C16-18**



**ATTENZIONE**

### INDICAZIONI DI PERICOLO:

H302 - Nocivo se ingerito. H332 - Nocivo se inalato. H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 - Evitare di respirare nebbie/vapori/spray. P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in un'area ben ventilata. P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 - Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P301+P312 - IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: portare la persona all'aria aperta e mantenerla a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. P330 - Sciacquare la bocca. P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

### Titolare dell'autorizzazione:

Nufarm Italia S.r.l. - Via Guelfa 5 - Bologna. Tel. 051 0394022

### Distribuito da:

Sumitomo Chemical Italia S.r.l. - Via Caldera, 21 - 20153 Milano (MI) Tel. 02 452801

### Officine di produzione:

Nufarm SAS - Gaillon (Francia)

Chemark Zrt. - Peremarton (Ungheria)

Phyteurop - Montreuil-Bellay (Francia)

Autopak-Vetlab Group - St Marys (Australia)

### Officina di ri-etichettatura:

Logikem S.r.l. - via Vittorio Emanuele Orlando 13 - Ravenna

**Registrazione Ministero della Salute n. 18888 del 31/08/2026**

**Contenuto netto: 500 ml; 1 - 5 - 10 - 20 l**

**Partita n.:**

## **PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

L'operatore deve indossare indumenti da lavoro adeguati e guanti protettivi durante le fasi di miscelazione/caricamento e applicazione. È richiesto l'uso di protezione respiratoria durante la miscelazione/caricamento. Non rientrare nelle aree trattate finché i depositi di spray sulle superfici fogliari non siano completamente asciutti. Qualora un lavoratore debba entrare nell'area trattata, è necessario indossare pantaloni lunghi e camicia a maniche lunghe. Si raccomanda l'uso di guanti protettivi.

Per proteggere le persone estranee all'applicazione, mantenersi una distanza di almeno 5 metri dai residenti o astanti.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali per l'uso con una applicazione su cereali invernali e primaverili, e applicazione primaverile su colza.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali per l'uso con due applicazioni su cereali invernali e primaverili, e applicazione autunnale su colza.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

## **INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**Protioconazolo:** Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.

**Consultare un Centro antiveleni.**

## **CARATTERISTICHE**

Fungicida sistemico con azione preventiva e curativa contro un ampio spettro di malattie fungine. Viene assorbito velocemente e va in circolo in tutta la pianta.

## **ISTRUZIONI PER L'USO**

Utilizzare il prodotto con 100-400 l/ha di acqua. Per cereali a paglia effettuare un massimo di 2 trattamenti annui ad un intervallo minimo di 14 giorni. Eseguire un solo trattamento per anno per le altre colture.

**Frumento (duro e tenero), segale, farro, triticale, spelta, tritordeum:** intervenire alla dose di 1,0 – 1,4 litri per ettaro Ruggini (*Puccinia triticina*, *Puccinia recondita*, *Puccinia striiformis*), Septoria (*Zymoseptoria tritici* / *Mycosphaerella graminicola*), Oidio (*Blumeria graminis*), con un trattamento. In caso di elevata pressione della malattia, impiegare la dose di prodotto più elevata a partire dall'inizio della levata (BBCH 30) e ripetere il trattamento entro fine fioritura (BBCH 69).

**Avena:** intervenire alla dose di 1 litro per ettaro contro Ruggine (*Puccinia hordei*) e Elmintosporiosi (*Pyrenophora chaetomioides*) con un trattamento. In caso di elevata pressione della malattia, impiegare la dose di prodotto più elevata a partire dall'inizio della levata (BBCH 30) e ripetere il trattamento entro inizio fioritura (BBCH 61).

**Orzo:** intervenire alla dose di 1 litro per ettaro contro Ramularia (*Ramularia collo-cygni*), Ruggine (*Puccinia hordei*), Oidio (*Blumeria graminis*), Rincosporiosi (*Rhynchosporium secalis*), Elmintosporiosi (*Pyrenophora teres*) con un trattamento. In caso di elevata pressione della malattia, impiegare la dose di prodotto più elevata a partire dall'inizio della levata (BBCH 30) e ripetere il trattamento entro inizio fioritura (BBCH 61).

**Colza:** intervenire alla dose di 1,0 - 1,2 litri per ettaro contro Marciume secco (*Leptosphaeria maculans*), Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*), Oidio (*Erysiphe cruciferarum*), Alternaria (*Alternaria brassicae*), Maculatura anulare (*Pyrenopeziza brassicae*) e Botrite (*Botrytis cinerea*) con una applicazione autunnale allo stadio di 4-8 foglie o, in alternativa, intervenendo in primavera tra l'inizio dello sviluppo dei getti laterali (BBCH 20) e la fine della fioritura (BBCH 69). Non ripetere l'applicazione primaverile se è già stato eseguito il trattamento autunnale.

**Lino** (per la produzione di fibre): intervenire alla dose di 1,0 - 1,2 litri per ettaro contro Oidio (*Golovinomyces orontii*), con una applicazione per anno, tra lo stadio di tre nodi fino alla formazione degli abbozzi fiorali.

## **PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:**

Per evitare sviluppo di fenomeni di resistenza dei patogeni ad alto rischio, si consiglia di alternare l'uso di JOUST PRO a prodotti che abbiano un differente meccanismo di azione ed adottare idonee pratiche agronomiche.

Per una corretta difesa fungicida, si raccomanda sempre di seguire le linee guida FRAC specifiche per colture e patogeni. In caso di sospetti fenomeni di resistenza informare il rivenditore e l'autorità competente (Servizio Fitosanitario di Riferimento).

**COMPATIBILITÀ:** In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Intervallo di sicurezza:****Sospendere i trattamenti**

- **35 giorni prima della raccolta per frumento, orzo, segale, farro, tritcale, spelta, tritordeum e avena.**
- **56 giorni prima della raccolta per colza.**
- **Non previsto per lino per la produzione di fibre.**

**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.