



Pflanzenhilfsmittel zur Anwendung in Raps und Leguminosen zur Verbesserung der Platzfestigkeit von Schoten und Hülsen. Bietet ein flexibles Erntemanagement und schützt vor Ernteverlusten.

Macht Schluss mit vorzeitigem Schoten- und Hülsenplatzen!

Das Produkt ist als Pflanzenhilfsmittel gemäß § 9a DMG 1994 einzelgenehmigt.

Inhaltsstoff: Seealgenextrakt (*Ascophyllum nodosum*), Wasser

Sicherheitshinweise: Für Kinder und Haustiere unerschwingbar aufbewahren!
Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen! Schutzbrille tragen. Handschuhe tragen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufliche Verwender erhältlich.

Charge und Herstellungsdatum produktionsbedingt an anderer Stelle.
Notfall-Tel.: 0043/732 6914 2466 (bitte nur in Notfällen)

Entsorgung:



Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC entleeren.
Zur Problemstoffsammelstelle bringen.
Restentleerte Behälter sind dem Sammel- und Verwertungssystem zuzuführen.

Hersteller/Inverkehrbringer:

Consilia Agri Business Consulting
Donnersbergstraße 4
D 67117 Limburgerhof



BERATUNG:

Nufarm GmbH & Co.KG
St. Peter Str. 25
4021 Linz / Österreich
Tel: 0732-6918 2122

5 L

510011642_122022/AT/Booklet

Nufarm GmbH & Co.KG

St. Peter Str. 25
4021 Linz / Österreich
Tel: 0732-6918 2122
www.nufarm.at

Nufarm
Grow a better tomorrow

ANWENDUNGSGEBIETE:

LANDWIRTSCHAFT

Kultur:	Winter- und Sommergebäck
Zweckbestimmung:	Verbesserung der Platzfestigkeit der Schoten
Anwendungsbereich:	Freiland
Stadium der Kultur:	BBCH 18–55 (8-Blatt-Stadium bis Einzelblüten der Hauptinfloreszenz sichtbar)
Anwendungstechnik:	spritzen
Aufwandmenge:	1 l/ha
Wasseraufwandmenge:	200 - 300 l/ha
Wartezeit:	keine

Kultur:	Leguminosen
Zweckbestimmung:	Verbesserung der Platzfestigkeit der Hülsen
Anwendungsbereich:	Freiland
Stadium der Kultur:	BBCH 18 (8-Blatt-Stadium) – 55 (erste Blütenknospen gestreckt)
Anwendungstechnik:	spritzen
Aufwandmenge:	1 l/ha
Wasseraufwandmenge:	200 - 300 l/ha
Wartezeit:	keine

WIRKUNGSWEISE

Die Wirkung von SEALICIT® basiert auf der Regulierung des Gens INDEHISCENT(IND). Durch diese Herunterregulierung wird während der Abreife der Schoten und Hülsen weniger Lignin in der Naht der Schoten und Hülsen (Dehiscence zone/ Aufplatzzone) eingelagert. Dadurch bleiben Schoten und Hülsen elastischer.

Die Schoten- und Hülsenplatzfestigkeit wird erhöht und ein vorzeitiges Aufplatzen auf Grund von Wind, Hagel, Hitze oder der mechanischen Ernte wird verhindert.

SEALICIT® bietet somit produktionstechnische Vorteile, da zum Einen eine gleichmäßigere Abreife im Bestand gewährleistet werden kann, ohne ein vorzeitiges Aufplatzen der vollreifen Etagen. Zum Anderen wird damit das Erntemanagement flexibilisiert, da Erntetermine hinausgezögert werden können mit verringertem Ernteverlustrisiko.

BESONDERE HINWEISE

Anwendungsempfehlung

Die Anwendung von SEALICIT® in Raps wird zwischen BBCH 30 (Beginn Längenwachstum) – 55 (Einzelblüten der Hauptinfloreszenz sichtbar) empfohlen und kann dort bspw. zu einer zweiten Insektizidmaßnahme gegen Rüssler-Arten hinzugefügt werden. In Sojabohne erfolgt die Anwendung **gemeinsam mit der Gräserbekämpfung** ab dem 8-Blatt-Stadium.

Hinweise zur sachgerechten Anwendung

SEALICIT® reduziert das Aufplatzen der Schoten und Hülsen bei kritischen Witterungsbedingungen (Wind, Hagel, Hitze) und während der mechanischen Ernte.

SEALICIT® soll auch eingesetzt werden, wenn der Erntebeginn optimiert werden soll, um eine volle Abreife des gesamten Schoten- und Hülsenpaketes zu ermöglichen.

SEALICIT® soll nicht eingesetzt werden in Sorten, die bereits eine hohe genetisch fixierte Platzfestigkeit besitzen.

Die besten Wirkungserfolge werden beim Einsatz vom Ende der Blattenentwicklung (BBCH 18) bis Entwicklung der Blütenanlagen (BBCH 55) erzielt.

SEALICIT® kann über einen langen Zeitraum mit hoher Wirksamkeit eingesetzt werden. Dies ermöglicht eine Anwendung bei günstigen Witterungsbedingungen für eine optimale Wirkung. Der Einsatz von SEALICIT® bei trockenem Bestand, guten Lichtverhältnissen, bei aufgelockerter Bewölkung, wüchsigen Bedingungen (Temperatur, Nährstoff- und Wasserversorgung) führt zu den besten Ergebnissen.

Keine Anwendung von SEALICIT® unmittelbar vor oder nach Nachtfrost und bei sehr hohen Tagestemperaturen und hohen Tag-Nacht Schwankungen.

Aufwandmenge

Die empfohlene Aufwandmenge beträgt 1,0 l/ha bei einer Wasseraufwandmenge von 200–300 l/ha. Bei darüber hinaus gehenden Wassermengen ist auch eine höhere Produktaufwandmenge zu wählen. Das Produkt soll nicht unverdünnt angewendet werden.

Mischbarkeit

Bei Ausbringung von Tankmischungen sind die festgesetzten und genehmigten Anwendungsgebiete und Anwendungsbestimmungen für den Mischpartner einzuhalten.

SEALICIT® ist mit gebräuchlichen Fungiziden wie MYSTIC® 250 EW sowie mit Insektiziden wie KAISO SORBIE® mischbar. Auch Mischungen mit Wachstumsreglern sind möglich. Von Mischungen mit kupferhaltigen Fungiziden und Blattdüngern, Ölen/Netzmitteln raten wir ab. Die Mischung mit unchelatierten Kalzium-Blattdüngern ist nicht möglich. Ein Absinken des pH-Wertes unter 4 ist zu vermeiden (keine Zugabe von schwefelsaurem Ammoniak).

Bei Ausbringungen mit AHL ist ein AHL-Wasser-Verhältnis von 1 zu 4 einzuhalten, d. h. 1 Teil AHL auf min. 4 Teile Wasser. Bei N-haltigen Mischungen keine weiteren Mischpartner hinzugeben.

Tankmischungen umgehend ausbringen.

Für eventuelle negative Auswirkungen von Mischungen, die von uns nicht empfohlen werden, haften wir nicht.

Ansetzen der Spritzbrühe

Vor Gebrauch gut schütteln.

Herstellung der Spritzbrühe & Restmengenverwertung:

Nur so viel Spritzbrühe ansetzen, wie tatsächlich benötigt wird und die erforderliche Menge so genau wie möglich berechnen. Insbesondere bei größeren Spritzbehältern bietet sich die Verwendung eines Durchflussmengenmessgerätes bei der Spritztankbefüllung an. Beim Ansetzen der Spritzbrühe geeignete Schutzkleidung und Schutzausrüstung verwenden!

1. Tank zu 1/3 - 1/2 mit der benötigten Wassermenge füllen.
2. Rührwerk einschalten.
3. Produkt vor dem Einfüllen kräftig schütteln.
4. Produkt über das Einspülsieb oder die Einspülschleuse in den Tank geben.
5. Entleerte Behälter des Produktes sorgfältig ausspülen und Spülwasser der Spritzbrühe beigegeben.
6. Tank mit Wasser auffüllen.
7. Spritzbrühe sofort nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk möglichst vollständig ausbringen.

HINWEISE ZUM SCHUTZ DES ANWENDERS

Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen: Unter normalen Nutzungsbedingungen werden keine besonderen Anforderungen erwartet. Symptomatisch behandeln.

Nach Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen. Bei schweren oder anhaltenden Symptomen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Waschen Sie die Haut mit Wasser. Wenn Reizung nach dem Waschen anhält, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Vorsichtig einige Minuten mit Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

HINWEISE FÜR TRANSPORT UND LAGERUNG

Transport

kein Gefahrgut

Lagerung

Vor Licht und Frost geschützt an einem kühlen Ort zwischen +5 °C bis +20 °C lagern.

Das Produkt ist im original verschlossenen Behälter 24 Monate lagerfähig.

HAFTUNG

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Präparat und die Anwendungsmöglichkeiten informieren. Bei Einhaltung der Gebrauchsanleitung ist das Präparat für die empfohlenen Zwecke geeignet. Wir gewährleisten, dass die Zusammensetzung des Produktes in den verschlossenen Originalpackungen den auf den Etiketten gemachten Angaben entspricht. Da Lagerhaltung und Anwendung eines Pflanzenschutzmittels außerhalb unseres Einflusses liegen, haften wir nicht für direkte oder indirekte Folgen aus unsachgemäßer oder vorschriftswidriger Anwendung des Produktes. Eine Vielzahl von Faktoren sowohl örtlicher wie auch regionaler Natur, wie z.B. Witterungs- und Bodenverhältnisse, Pflanzensorten, Anwendungstermin, Applikationstechnik, Resistenzen, Mischungen mit anderen Produkten etc. können Einfluss auf die Wirkung des Produktes haben. Dieses kann unter ungünstigen Bedingungen zur Folge haben, dass eine Veränderung in der Wirksamkeit des Produktes oder eine Schädigung der Kulturpflanzen nicht ausgeschlossen werden kann. Für derartige Folgen können der Vertreter oder Hersteller nicht haften. Etwaige Schutzrechte, bestehende Gesetze und Bestimmungen sowie die Festsetzungen der Genehmigung des Produktes und die Produktinformation sind vom Anwender unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern.

Registrierte Marke

SEALICIT® = reg. Marke der Brandon Products Ltd.

Produktion:

Brandon Products Ltd.
Centrepoint, Tralee, Co.Kerry
Ireland

Beratung:

Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter-Str. 25
4021 Linz



Pflanzenhilfsmittel zur Anwendung in Raps und Leguminosen zur Verbesserung der Platzfestigkeit von Schoten und Hülsen. Bietet ein flexibles Erntemanagement und schützt vor Ernteverlusten.

Macht Schluss mit vorzeitigem Schoten- und Hülsenplatzen!

Das Produkt ist als Pflanzenhilfsmittel gemäß § 9a DMG 1994 einzelgenehmigt.

Inhaltsstoff: Seealgenextrakt (*Ascophyllum nodosum*), Wasser

Sicherheitshinweise: Für Kinder und Haustiere unerschwingbar aufbewahren!
Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen! Schutzbrille tragen. Handschuhe tragen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufliche Verwender erhältlich.

Charge und Herstellungsdatum produktionsbedingt an anderer Stelle.
Notfall-Tel.: 0043/732 6914 2466 (bitte nur in Notfällen)

Entsorgung:



Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC entleeren.
Zur Problemstoffsammelstelle bringen.
Restentleerte Behälter sind dem Sammel- und Verwertungssystem zuzuführen.

Hersteller/Inverkehrbringer:

Consilia Agri Business Consulting
Donnersbergstraße 4
D 67117 Limburgerhof



BERATUNG:

Nufarm GmbH & Co.KG
St. Peter Str. 25
4021 Linz / Österreich
Tel: 0732-6918 2122

5 L

510011642_122022/AT/Booklet

Nufarm GmbH & Co.KG

St. Peter Str. 25
4021 Linz / Österreich
Tel: 0732-6918 2122
www.nufarm.at

Nufarm
Grow a better tomorrow