

# Kleine toepassingen

**NeemAzal®-T/s**

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	3 L/ha	3	7	3
Medicinale kruidgewassen	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	3 L/ha	4	7	14
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie (onbedekte teelt)	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	2,5 L/ha	4 (2 blokken van 2 opeenvolgende bespuitingen)	7 dagen binnen een blok; interval tussen blokken 2,5 maand	-
Bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt)	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	3,75 L/ha	18 (6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen)	7 dagen binnen een blok; interval tussen blokken 1,5 maand	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	2,5 L/ha	4 (2 blokken van 2 opeenvolgende bespuitingen)	7 dagen binnen een blok; interval tussen blokken 2,5 maand	-
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	3,75 L/ha	18 (6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen)	7 dagen binnen een blok; interval tussen blokken 1,5 maand	-
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	3,75 L/ha	18 (6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen)	7 dagen binnen een blok; interval tussen blokken 1,5 maand	-
Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, mais, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	2,5 L/ha	4 (2 blokken van 2 opeenvolgende bespuitingen)	7 dagen binnen een blok; interval tussen blokken 2,5 maand	-

