



FUSILADE MAX®



Fusilade Max® is een systemisch herbicide ter bestrijding van grasachtige onkruiden, inclusief graanopslag.

HRAC 1 HERBICIDE

FUSILADE MAX UFI: ECRX-56KK-DEA2-6Q8T

Toelatingsnummer: 12519 N

Aard van het preparaat: emulgeerbaar concentraat (EC)

Werkzame stof: fluazifop-P-butyl

Gehalte: 125 g/l

Lotnummer: zie verpakking

Waarschuwing

W.5

Gevarenaanduidingen

- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H361d Wordt ervan verdacht het ongebooren kind te schaden.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt

Aanvullende etiketelementen

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



*: Geregistreerd handelsmerk Nufarm

5L e

510001390_092025

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Tel.: 010-3037725
www.nufarm.com/nl



Legt, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.



0 87 20364 28054 3

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	90
Bielen	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	56
Peulvruchten	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	90
Blauwmaanzaad	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	90
Vlas	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	90
Koolzaad	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	90
Huttentut	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	90
Cichorei	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	56
Witlof (pennenteelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	56
Bladgroenten m.u.v. waterkers (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 1,5 L/ha**	1	42
Erwt met peul (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	28
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	90
Wortel- en knolgewassen m.u.v. zoete aardappel en yam (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	49
Uien (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	28
Sjalotten (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	28
Knoflook (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	28
Asperge (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 1,5 L/ha**	1	42
Bleekselderij (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 1,5 L/ha**	1	49
Kardoen (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 1,5 L/ha**	1	49
Rabarber (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 1,5 L/ha**	1	49
Knolvenkel (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 1,5 L/ha**	1	49
Artisjok (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 1,5 L/ha**	1	42

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 1,5 L/ha**	1	42
Aromatische wortelgewassen (onbedekte teelt)	Grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha**	1	42

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Dosering is afhankelijk van onkruidruk en groeistadium van de onkruiden.

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 100-400 liter water per ha.

Fusilade Max uitsluitend toepassen met een machinaal voortgetrokken veldspuit.

In de teelt van aardappelen het middel voor de knolvorming (BBCH 40) toepassen.

In de teelt van blauwmaanzaad, vlas, koolzaad en huttentut het middel voor de bloei (BBCH 60) toepassen.

Om zoogdieren te beschermen is toepassing in peulvruchten, cichorei, witlof, bladgroenten (m.u.v. waterkers), erwt met en zonder peul, asperge, bleekselderij, rabarber, aromatische kruidgewassen en aromatische wortelgewassen uitsluitend toegestaan totdat het bladerdek gesloten is (90% van de planten raakt elkaar in de rij).

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing in de teelt van aardappel, bieten, peulvruchten, blauwmaanzaad, vlas, koolzaad, huttentut, cichorei, witlof, erwt met en zonder peul, wortel- en knolgewassen (m.u.v. zoete aardappel en yam), uien, sjalotten, knoflook, en aromatische wortelgewassen uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DBRT95.

Resistentiemanagement.

Dit middel bevat de werkzame stof fluaizifop-p-butyl. Fluaizifop-p-butyl behoort tot de ACCase remmers. De Hrac code is 1. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen

Fusilade Max bestrijdt éénjarige grassen, inclusief graanopslag en overblijvende grassen (kweekgras). De werking tegen straatgras is onvoldoende.

Fusilade Max is een systemisch herbicide dat door het blad wordt opgenomen. De te bestrijden onkruidgrassen moeten daarom boven de grond staan. Vanuit het blad wordt het middel naar de groeipunten en de wortels getransporteerd. De groei van het onkruidgras stopt binnen 1 à 2 dagen na de bespuiting. De eerste afstervingsymptomen zijn na ongeveer een week zichtbaar, het eerst bij de groeipunten. Na 3-5 weken is de afsterving in het algemeen compleet.

Het is aan te bevelen om Fusilade Max toe te passen als zoveel mogelijk onkruid aanwezig is, echter het gewas mag het onkruid niet afschermen. Toepassen op een droog gewas en onkruid en met enige uren droog weer in het vooruitzicht. Toepassing op onkruid dat goed aan de groei is, geeft over het algemeen een beter resultaat.

Bij toepassing voldoende water gebruiken omdat goede bevochtiging van het onkruid van belang is voor een goed resultaat. Na toepassing minstens 1 week wachten met een eventuele grondbewerking om het middel voldoende te laten inwerken.

Het is raadzaam om tussen een bespuiting met Fusilade Max en een bespuiting ter bestrijding van tweezaadlobbige onkruiden zeven dagen tussenruimte aan te houden.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Bereiding van de spuitoplossing

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder al mengende met water aanvullen.

Voorzorgsmaatregelen

Vermijd spuitdift op naburige vegetatie en gronden en op wateroppervlakten en waterlopen.

Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen. Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

Waarborg

Wij garanderen dat de samenstelling van de producten in gesloten, originele verpakkingen gelijk staat aan de indicaties aangegeven op de etiketten. Aangezien de opslag en het gebruik buiten onze invloed liggen, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte gevolgen n.a.v. foutief gebruik van de producten of gebruik in strijd met de voorschriften. Meerdere factoren, zoals weer, bodem, plantensoort, toepassingstechnieken, toepassingstermijn, resistentie, menging met andere producten, enz. kunnen invloed op de werking van het product hebben. Dit kan, onder ongunstige omstandigheden, een verandering van de effectiviteit van het product tot gevolg hebben of aanleiding zijn voor schade aan het gewas. Voor deze resultaten kunnen de distributeurs en de producenten geen verantwoording nemen.



FUSILADE MAX®

Fusilade Max® is een systemisch herbicide ter bestrijding van grasachtige onkruiden, inclusief graanopslag.

HRAC 1 HERBICIDE

FUSILADE MAX UFI: ECRX-56KK-DEA2-6Q8T

Toelatingsnummer: 12519 N

Aard van het preparaat: emulgeerbaar concentraat (EC)

Werkzame stof: fluazifop-P-butyl

Gehalte: 125 g/l

Lotnummer: zie verpakking

Waarschuwing

W.5

Gevarenaanduidingen

- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H361d Wordt ervan verdacht het ongebooren kind te schaden.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt

Aanvullende etiketelementen

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



*: Geregistreerd handelsmerk Nufarm

5L^e

510001390_092025

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Tel.: 010-3037725
www.nufarm.com/nl



Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.



0 87 20364 28054 3