



# FUSILADE MAX®

**Fusilade Max® is een systemisch herbicide ter bestrijding van grasachtige onkruiden, inclusief graanopslag.**

Toelatingsnummer: 12519 N  
Aard van het preparaat: emulgeerbaar concentraat (EC)  
Werkzame stof: fluazifop-P-butyl  
Gehalte: 125 g/l  
Lotnummer: zie verpakking

#### Gevarenaanduidingen

**H361d** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.  
**H410** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Voorzorgsmaatregelen

**P102** Buiten het bereik van kinderen houden.  
**P201** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.  
**P280C** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.  
**P308 +**  
**P313** Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.  
**P391** Gelekte/gemorste stof opruimen.  
**SP1** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt

#### Aanvullende etiketelementen

**EUH401** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Waarschuwing



Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden. Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.

®: Geregistreerd handelsmerk Nufarm



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

12519-5-3-0918



# 5L

510001390

**Nufarm B.V.**  
Rivium Quadrant 75-7  
2909 LC Capelle aan den IJssel  
Tel.: 010-3037725  
[www.nufarm.com/nl](http://www.nufarm.com/nl)

 **Nufarm**  
Grow a better tomorrow

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teelt-cyclus of per 12 maanden	Veiligheidsstermijn in dagen
Aardappel	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha	1 per teeltcyclus	75
Bieten	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Peulvruchten	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	90
Roodzwenkgras	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	49
Hardzwenkgras	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	49
Blauwmaanzaad	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Karwij	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Koolzaad	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Veldbonen (voor ensilage)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	90
Cichorei	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Witlof (pennenteelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Appel	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Peer	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Kers (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Pruim (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Aardbei (onbedekte teelt)	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	42
Aalbes (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	90
Kruisbes	Tussen het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	90
Braam- en fram-boosachtigen ( <i>Rubus spp.</i> ) (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	45
Boon met peul (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Erwt zonder peul	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Wortelen	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha	1 per teeltcyclus	56

Koolraap	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Rode biet	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Knolselderij (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Schorseneer	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Uien	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	28
Sjalotten	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	28
Asperge (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulpen (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Boomkwekerij-gewassen (onbedekte teelt)	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Houtige beplanting	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Akkerranden	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-

Het middel dient te worden toegepast in 400-500 liter water per hectare

#### **Toepassingsvoorwaarden**

Toepassing is slechts toegestaan in de periode van 1 april tot en met 30 september.

Voor de teelt van aardbei (onbedekte teelt), aalbes (onbedekte teelt), kruisbes, braam- en framboosachtigen (*Rubus* spp.) (onbedekte teelt), geldt dat de toepassing alleen is toegestaan vóór de bloei en/of na de oogst. Voor de teelt van boon met peul (onbedekte teelt), en erwt zonder peul geldt dat de toepassing alleen is toegestaan vóór de bloei.

Voor asperge (onbedekte teelt) geldt dat de toepassing uitsluitend is toegestaan na de oogst.

Het middel is gevaarlijk voor roofmijten. Vermijd onnodige blootstelling.

#### **Aanbevelingen**

Fusilade Max bestrijdt éénjarige grassen, inclusief graanopslag en overblijvende grassen (kweekgras). De werking tegen straatgras is onvoldoende.

Fusilade Max is een systemisch herbicide dat door het blad wordt opgenomen. De te bestrijden onkruidgrassen moeten daarom boven de grond staan. Vanuit het blad wordt het middel naar de groeipunten en de wortels getransporteerd. De groei van het onkruidgras stopt binnen 1 á 2 dagen na de bespuiting. De eerste afstervingsymptomen zijn na ongeveer een week zichtbaar, het eerst bij de groeipunten. Na 3-5 weken is de afsterving in het algemeen compleet.

Het is aan te bevelen om Fusilade Max toe te passen als zoveel mogelijk onkruid aanwezig is, echter het gewas mag het onkruid niet afschermen. Toepassen op een droog gewas en onkruid en met enige uren

droog weer in het vooruitzicht. Toepassing op onkruid dat goed aan de groei is, geeft over het algemeen een beter resultaat.

Bij toepassing voldoende water (400-500 l/ha) gebruiken omdat goede bevochtiging van het onkruid van belang is voor een goed resultaat. Na toepassing minstens 1 week wachten met een eventuele grondbe-  
werking om het middel voldoende te laten inwerken.

Het is raadzaam om tussen een bespuiting met Fusilade Max en een bespuiting ter bestrijding van twee-  
zaadlobbige onkruiden zeven dagen tussenruimte aan te houden.

#### **Toepassingstijdstip en doseringen**

Onderstaande dosering worden aanbevolen voor de in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift  
vermelde gewassen en toepassingen:

Te bestrijde	Dosering (l/ha)	Groeistadium onkruid	Opmerking
hanenpoot	1	Vanaf 3 bladstadium tot einde uitstoeling	
duist en windhalm	1,25 – 1,5	Vanaf 3 bladstadium tot einde uitstoeling	de hoogste dosering op uitgestoelde planten
wilde haver, graanopslag, als stuif- dek ingezaaide gerst of rogge, opslag ruw- en veld- beemdgras en groene naalदार	1,5	Vanaf 3 bladstadium tot einde uitstoeling	
opslag van raaigras	2	In het 2 tot 4 bladsta- dium	
kweekgras	2,5 – 3	Vanaf 20 cm lengte.	de hoogste dosering toe- passen in openblijvende gewassen en als er sprake is van een lang gevestigd en/of zware begroeiing van kweekgras.

Het sierteelt assortiment is zeer breed en voortdurend aan verandering onderhevig.

Bij de ontwikkeling van een middel kan het slechts in een beperkt aantal gewassen/rassen worden getest.  
Indien nog geen ervaring is opgedaan in een specifiek gewas of ras, wordt aangeraden om eerst op kleine  
schaal een proefbespuiting uit te voeren om de verdraagzaamheid te testen. Blijf het gewas gedurende ten-  
minste 10 dagen nauwlettend volgen op mogelijke ongewenste gewasreacties. Wees voorzichtig met het  
mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen, bladmeststoffen, uitvloeiers of hechters indien daarmee  
nog geen ervaring is opgedaan. In dat geval wordt aangeraden de betreffende middelencombinatie eerst  
op kleine schaal te testen op gewasveiligheid

#### **Boomkwekerijgewassen en plantsoenbeplantingen**

In de volgende gewassen heeft Fusilade Max in proeven gewasreacties veroorzaakt:

Abies nordmanniana, Amelanchier lamarckii, Acer pseudoplatanus (eenjarige zaailing), Acer campestre,  
Deutzia sp., Euonymus fortunei 'Vegetus', Gingko, Juniperus horizontalis 'Bar Harbor', Juniperus media  
'Pfitzeriana' en Sequoiadendron giganteum.

### **Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding**

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

### **Bereiding van de spuitoplossing**

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder al mengende met water aanvullen. Hoeveelheid water: 400-500 liter/ha

### **Voorzorgsmaatregelen**

Vermijd spuitdrift op naburige vegetatie en gronden en op wateroppervlakten en waterlopen.

Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen. Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

### **Waarborg**

Wij garanderen dat de samenstelling van de producten in gesloten, originele verpakkingen gelijk staat aan de indicaties aangegeven op de etiketten. Aangezien de opslag en het gebruik buiten onze invloed liggen, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte gevolgen n.a.v. foutief gebruik van de producten of gebruik in strijd met de voorschriften. Meerdere factoren, zoals weer, bodem, plantensoort, toepassingstechnieken, toepassingstermijn, resistentie, menging met andere producten, enz. kunnen invloed op de werking van het product hebben. Dit kan, onder ongunstige omstandigheden, een verandering van de effectiviteit van het product tot gevolg hebben of aanleiding zijn voor schade aan het gewas. Voor deze resultaten kunnen de distributeurs en de producenten geen verantwoording nemen.



# FUSILADE MAX®

**Fusilade Max® is een systemisch herbicide ter bestrijding van grasachtige onkruiden, inclusief graanopslag.**

Toelatingsnummer: 12519 N  
Aard van het preparaat: emulgeerbaar concentraat (EC)  
Werkzame stof: fluazifop-P-butyl  
Gehalte: 125 g/l  
Lotnummer: zie verpakking

#### Gevarenaanduidingen

**H361d** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.  
**H410** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Voorzorgsmaatregelen

**P102** Buiten het bereik van kinderen houden.  
**P201** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.  
**P280C** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.  
**P308 +**  
**P313** Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.  
**P391** Gelekte/gemorste stof opruimen.  
**SP1** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt

#### Aanvullende etiketelementen

**EUH401** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

#### Waarschuwing



Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden. Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket

®: Geregistreerd handelsmerk Nufarm



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven

12519-5-3-0918



# 5L

510001390

**Nufarm B.V.**  
Rivium Quadrant 75-7  
2909 LC Capelle aan den IJssel  
Tel.: 010-3037725  
[www.nufarm.com/nl](http://www.nufarm.com/nl)

 **Nufarm**  
Grow a better tomorrow