

ORANGE  
MAGENTA  
BLACK  
YELLOW  
GREEN

# Rizolex® vloeibaar

## FUNGICIDE

**Fungicide ter bestrijding van zwartrot (*Rhizoctonia solani*) in de bedekte teelt van bloembol-bloemknolgewassen, snijbloemen, potplanten en in de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, vaste plantenteelt en bloemzaadteelt.**

**Toelatingsnummer: 11098 N**  
**Aard van het preparaat: suspensie concentraat (SC)**  
**Werkzame stof: tolclofos-methyl**  
**Gehalte: 500 g/l**

# 10 L e

FRAC 14 FUNGICIDE



## SUMITOMO CHEMICAL

### Nufarm B.V.

Rivium Quadrant 75-7 - 2909 LC Capelle aan den IJssel  
Tel.: 010-3037725  
www.nufarm.com/nl

### Toelatingshouder

### SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.

10A Rue de la Voie Lactée  
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR - FRANKRIJK / FRANCE  
Tel. 0033 4 78 64 32 60

@: Geregistreerd handelsmerk Sumitomo Chemical Co., Ltd.  
F130001063A-0925 510009962\_092025



Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.



08720364280901

**DEZE VERPAKKING MAG NIET OPNIEUW GEBRUIKT WORDEN**  
**LEES ALTIJD VOOR HET GEBRUIK HET GEHELE ETIKET**

***Dit product in een originele gesloten verpakking en boven 0°C bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.***

Toelatingsnummer: 11098 N

Aard van het preparaat: suspensie concentraat (SC)

Werkzame stof: tolclofos-methyl

Gehalte: 500 g/l

FRAC

14

FUNGICIDE

W.8

### Gevarenaanduidingen

- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### Voorzorgsmaatregelen

- P273 Voorkom lozing in het milieu.  
 P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding en oogbescherming of gelaatsbescherming dragen.  
 P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.  
 P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.  
 SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### Aanvullende etiketelementen

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden**

**Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket**

***Dit product in een originele gesloten verpakking en boven 0°C bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.***

**WAARSCHUWING**



UF1: WH00-S0S5-600K-4E4K



08720364280901

F1300010630-0925 510009961\_092025

**Nufarm**  
 Grow a better tomorrow

## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 (Tgb juni 2015)) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

## TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Veiligheidsstermijn in dagen
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt)	Potgrondbehandeling	Bodemschimmels <sup>1</sup> Kwade grond <sup>2</sup>	100 ml middel per m <sup>2</sup> potgrond	1	50 L/ha	-
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Bodemschimmels <sup>1</sup>	2 ml per m <sup>2</sup>	1	20 L/ha	-
Snijbloemen (bedekte teelt)	Grondbehandeling voor planten	Bodemschimmels <sup>1</sup>	3,2 ml middel per m <sup>2</sup>	1	32 L/ha	
	Aangietbehandeling voor planten					
Potplanten (bedekte teelt)	Potgrondbehandeling	Bodemschimmels <sup>1</sup>	250 ml middel per 10 L water per m <sup>2</sup> potgrond	1	-	-
	Aangietbehandeling		0,1% (100 ml middel per 100 L water)	1	-	-

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

1 Zwartrot, zwartpoten, bodemschimmels (*Rhizoctonia solani*/ *Thanatephorus cucumeris*).

2 Kwade grond (*Rhizoctonia tuliparum*).

Het gebruik in de onbedekte teelt van bloemsterrijgewassen, vaste planten en bloemenzaadteelt is op basis van een “derdenutbreiding” en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenutbreiding” is aangevraagd door Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aanmerkelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Veiligheidsstermijn in dagen
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Bodemschimmels <sup>1</sup>	2 ml per m <sup>2</sup>	1	20 L/ha	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Bodemschimmels <sup>1</sup>	2 ml per m <sup>2</sup>	1	20 L/ha	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Bodemschimmels <sup>1</sup>	2 ml per m <sup>2</sup>	1	20 L/ha	-

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

<sup>1</sup> Zwartrot, bodemschimmels (*Rhizoctonia solani*/ *Thanatephorus cucumeris*).

### OVERIGE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Om in het water levende organismen te beschermen is - in de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, vaste planten en bloemenzaadteelt - bespuiting op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een beddenfrees in combinatie met minimaal 90% drift reducerende spuitdoppen.

Bij de grondbehandeling in de onbedekte teelten het middel volvelds spuiten en tenminste 10 cm diep inwerken met behulp van een frees.

### Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is).

Wanneer **Rizolex vloeibaar** wordt gebruikt in de voor bloemisterijgewassen benodigde dosering (3,2 ml middel per m<sup>2</sup>) dan kunnen, in verband met de kans op smaakafwijkingen, geen groentegewassen als tussen- of vervangewas worden verbouwd.

### Gevoeligheid gewassen

Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltomstandigheden van in het wettelijk gebruiksvoorschrift genoemde gewassen is het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken. De toepasser van dit product zal, indien met een cultivar/variëteit in een groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring is opgedaan, zelf een proefbespuiting/toepassing op kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen teeltomstandigheden om verantwoordelijkheid voor de gewasveiligheid te kunnen nemen.

Niet toepassen bij Anthurium en Poinsetta.

Bij Begonia, Cyclamen en Fuchsia is kans op enige schade niet uitgesloten.

## GEBRUIKSAANWIJZING

**Bedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen**, ter bestrijding van *Rhizoctonia solani* en *Rhizoctonia tuliparum* bij tulpen, irissen en diverse andere bolgewassen.

De potgrond die als dekgrond wordt gebruikt kan behandeld worden door het middel voor het gebruik gelijkmatig door de grond te mengen.

**Dosering:** 100 ml middel per m<sup>3</sup> potgrond.

Onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, ter bestrijding van *Rhizoctonia solani* bij tulpen, irissen en diverse andere bolgewassen.  
Het middel volvelds verspuiten en tenminste 10 cm diep inwerken met behulp van een frees.

**Dosering:** 2 ml per m<sup>2</sup>.

Bedekte teelt van snijbloemen, grondbehandeling vóór het planten, ter bestrijding van *Rhizoctonia solani*.

In de bedekte teelt vóór het planten middels een aangietbehandeling.

**Dosering:** 3,2 ml middel per m<sup>2</sup>.

**N.B.:** Wanneer **Rizolex vloeibaar** wordt gebruikt in de voor bloemisterijgewassen benodigde dosering (3,2 ml middel per m<sup>2</sup>) dan kunnen, in verband met de kans op smaakafwijkingen, geen groentegewassen als tussen- of vervanggewas worden verbouwd.

Bedekte teelt van potplanten, ter bestrijding van *Rhizoctonia solani*.

#### **Potgrondbehandeling**

Het middel over de te behandelen potgrond spuiten en zo gelijkmatig mogelijk door de grond mengen.

**Dosering:** 250 ml middel in 10 liter water per m<sup>2</sup> potgrond.

#### **Aangietbehandeling**

Voor of tijdens de teelt per pot een aangietbehandeling uitvoeren.

**Dosering:** 0,1% (100 ml middel per 100 liter water).

Hiervan 100 ml per pot van ca. 10 cm diameter geven.

**N.B.:** Het verdient aanbeveling om proefsgewijs vast te stellen of een plantensoort of variëteit het middel verdraagt. Niet toepassen bij Anthurium en Poinsetta.

Bij Begonia, Cyclamen en Fuchsia is kans op enige schade niet uitgesloten.

**Onbedekte teelt van bloembol-bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, vaste planten en bloemenzaadteelt,** ter bestrijding van *Rhizoctonia solani*.

Het middel volvelds verspuiten en tenminste 10 cm diep inwerken met behulp van een frees.

**Dosering:** 2 ml per m<sup>2</sup>.

#### **GEVOELIGHEID GEWASSEN**

Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltomstandigheden van in het wettelijk gebruiksvoorschrift genoemde gewassen is het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken.

De toepasser van dit product zal, indien met een cultivar/variëteit in een groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring is opgedaan, zelf een proefbespuiting/toepassing op kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen teeltomstandigheden om verantwoordelijkheid voor de gewasveiligheid te kunnen nemen.

## **EIGENSCHAPPEN EN WERKINGWIJZE**

**Rizolex vloeibaar** bevat tolclofos-methyl. Tolclofos-methyl is een niet systemisch contact fungicide met een preventieve werking. Tolclofos-methyl remt de fosfolipide biosynthese wat leidt tot versterking van de vorming van membranen in de cellen van de schimmel. Kieming van de sporen en myceliumgroei wordt vertraagd en de besmetting van de planten via de wortels en de basis van de stengel wordt verhindert.

## **BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING**

Het product in de voor 1/2 gevulde spuitank gieten. Meng en verder al mengende met water aanvullen.

## VOORZORGSMAATREGELEN

Vermijd spuitdrift op naburige vegetatie en gronden en op wateroppervlakten en waterlopen.

Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen. Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

## WAARBORG

Wij garanderen dat de samenstelling van de producten in gesloten, originele verpakkingen gelijk staat aan de indicaties aangegeven op de etiketten.

Aangezien de opslag en het gebruik buiten onze invloed liggen, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte gevolgen n.a.v. foutief gebruik van de producten of gebruik in strijd met de voorschriften. Meerdere factoren, zoals weer, bodem, plantensoort, toepassingstechnieken, toepassingstermijn, resistentie, menging met andere producten, enz. kunnen invloed op de werking van het product hebben. Dit kan, onder ongunstige omstandigheden, een verandering van de effectiviteit van het product tot gevolg hebben of aanleiding zijn voor schade aan het gewas. Voor deze resultaten kunnen de distributeurs en de producenten geen verantwoording nemen.

Toelatingsnummer: 11098 N  
 Aard van het preparaat: suspensie concentraat (SC)  
 Werkzame stof: tolclofos-methyl  
 Gehalte: 500 g/l

FRAC

14

FUNGICIDE

W.8

#### Gevenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Voorzorgsmaatregelen

P273 Voorkom lozing in het milieu.  
 P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding en oogbescherming of gelaatsbescherming dragen.  
 P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.  
 P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.  
 SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

#### Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden**

**Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket**

***Dit product in een originele gesloten verpakking en boven 0°C bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.***

**WAARSCHUWING**



UFI: WH00-S0S5-600K-4E4K



08720364280901

F130001063C-0925 510009961\_092025

**Nufarm**  
 Grow a better tomorrow