

Advies onkruidbestrijding voor elk type grasland

Hieronder leest u onze adviezen voor zowel bestaand grasland, eerstejaarsgrasland en klavergrasland.

Bestaand grasland

2 l/ha Cirran® + 1,25 l/ha Tapir® (of 1,5 l/ha Primstar®)

- Krachtige mix op de meest voorkomende onkruiden
- Brede onkruidwerking

Bestaand grasland met veel ridderzuring

1,5 l/ha Jepolinex® Pro + 1,5 l/ha Tapir® (of 1,9 l/ha Primstar®)

- Toepassen als ridderzuring voldoende blad heeft
- Eventueel in het najaar bestrijden in verband met neerwaartse sapstroom van de ridderzuring.

Eerstejaars grasland

1,5 l/ha Jepolinex® Pro + 1,25 l/ha Tapir® (of 1,0 l/ha Primstar®)

- Behandel tijdig op jonge onkruiden
- Extra werking op o.a. veelknopigen en melde
- Toepassen vanaf 3e bladstadium van het gras

Klavergrasland

Voor de onkruidbestrijding in klavergrasland zijn minder middelen beschikbaar.

Ons advies is een bespuiting met **4,0 tot 4,5 l/ha Buttress®*** eventueel in combinatie met een lage dosering Cirran®. Adviezen worden in klavergrasland in 2020 nog aangepast. Vraag daarom altijd advies bij uw gewasbeschermingsmiddelenleverancier.

* Let op! Buttress heeft een opgebruiktermijn t/m 31-08-2020.

Cirran®, Jepolinex® Pro en Buttress® zijn gedeponeerde handelsmerken van Nufarm.
Primstar® en Tapir® zijn geregistreerde handelsmerken van Dow AgroSciences.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Meer informatie over onkruidbestrijding in grasland?

Voor technische informatie en adviezen kunt u contact opnemen met uw gewasbeschermingsmiddelenleverancier. Kijk ook op onze website nufarm.com/nl.

 @NufarmNederland

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel

010 303 77 00
info.nl@nufarm.com
nufarm.com/nl

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow



Makkelijk scoren

met onkruidbestrijding
in grasland

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow



Makkelijk scoren met onkruidbestrijding in grasland

Als loonwerker bent u een belangrijke gesprekspartner voor melkveehouders. Uw advies is vaak zelfs doorslaggevend. Dat geldt zeker bij de onkruidbestrijding in grasland. Een onkruidbestrijding verdient zich snel terug. Daarom is op tijd een onkruidbestrijding uitvoeren echt makkelijk scoren.

Twee ton extra ruwvoer door onkruidbestrijding

De afgelopen twee jaar hadden graspercelen te lijden onder de droogte

(en lokaal gevolgd door overvloedige regen). Ideaal voor onkruiden. En dat is vrijwel overal zichtbaar. Eén- en tweejarige breedbladige onkruiden en wortelonkruiden hebben een negatief effect op zowel VEM- als DVE-opbrengst en, eveneens belangrijk, op de structuurwaarde van het ruwvoer. Onderstaande berekening is gemaakt door BLGG op basis van de meest gangbare onkruiden in grasland, onder andere paardenbloem, muur, ridderzuring en distel.

	Onkruid	Vers gras	Verschil
VEM	775	962	+ 24%
DVE	63	90	+ 43%
Structuurwaarde	1.2	1.9	+ 58%
Droge stof	101	133	+ 31%

€460,- extra opbrengst per hectare

Voerkosten vormen een grote kostenpost. Daarom is meer ruwvoer van het eigen bedrijf zo belangrijk. Het levert direct voordeel op in de vorm van een lagere kostprijs.

Niet alleen in het eerste jaar van toepassing. Een onkruidbestrijding levert ook in het jaar na toepassing voordeel op door een lagere onkruiddruk.


	Opbrengst (ds / ha)	Voederwaarde-prijs* / ha
Goed grasland	12.000 kg	€ 2.760,-
Gemiddeld grasland	10.000 kg	€ 2.300,-

Gemiddelde voederwaardeprijs (goed gras): 950 VEM, 18% eiwit, 48% ruwe celstof, inclusief 5 cent voor structuurwaarde (bron: WUR)

Proeven


Onze middelen komen ieder jaar opnieuw sterk uit te proeven.

Bestaand grasland




Eerstejaars grasland

Onkruiden: melde, varkensgras, zuring, klein kruiskruid, grote brandnetel, melkdistel, muur, herderstasje, akkerdistel, perzikkruid.



Bestaand grasland met veel ridderzuring

Jepolinex Pro 1,5 l/ha + Tapir 1,5 l/ha
Referentie



Zorg dat u er klaar voor bent

Ga tijdig in gesprek met de melkveehouders en wijs hen op de voordelen van een onkruidbestrijding.

Met een onkruidbestrijding kan onder de juiste omstandigheden (voldoende temperatuur en groeizaam weer), al vroeg in het voorjaar worden gestart.

