




# CLORTOSINT®

## Le Chlortoluron solo Nufarm



**Une matière active  
indispensable pour gérer de  
manière durable les  
problématiques graminées**

- ✓ **Mode d'action unique** : dernière urée du marché (HRAC 5 ou C2)
- ✓ **Efficace contre vulpin et ray grass résistants** en programmes désherbages automne
- ✓ **Souple d'utilisation** :
  - applicable à la fois en pré et post levée
  - Utilisable jusqu'à fin février

 **Nufarm**


Grow a better tomorrow

**R-EVOLUTION**

Nufarm s'engage avec vous  
pour maintenir la durabilité  
du désherbage !

# Sur blés et orges, en pré ou post levée précoce, Clortosint® 1 à 3,6 L/ha +/- partenaire.\*

Une solution flexible à l'automne,  
utilisable jusqu'à fin février



<b>COMPOSITION</b>	chlorotoluron 500 g/L
<b>FORMULATION</b>	SC (Suspension concentrée)
<b>USAGES ET DOSES</b>	Blé, orge, à 3,6 L/ha
<b>MODE D'ACTION</b>	C2
<b>STADE D'APPLICATION</b>	BBCH 00 (prélevée) et BBCH 29 (postlevée)
<b>IFBM</b>	Autorisé sur orge de brasserie d'hiver
<b>ZNT AQUA</b>	5 mètres
<b>ZNT ZNCA</b>	5 mètres
<b>DRE</b>	48 h
<b>CONDITIONNEMENT</b>	10 litres

ADVENTICES	Clortosint® 3,6	Clortosint 2l + Ref D 3l	Clortosint 3l + Ref F 0,5
<b>Graminées</b>			
Agrostis jouet du vent			
Bromes			
Folle-avoine	Levées d'automne		Levées d'automne
Paturin annuel			
Paturin commun			
Ray grass			
Vulpie			
Vulpin			
<b>Joncacées</b>			
Jonc des crapauds			
<b>Dicots</b>			
Alchémille			
Arabette			
Bleuet			Pré-levée bleuet
Capselle			
Carotte			
Céraiste			
Coquelicot			
Fumeterre			
Gaillet		Levées d'automne	
Géranium			
Matricaire			
Mouron des champs			
Myosotis			
Pensée			
Ravenelle			
Rep colza			
Sanve			
Séneçon			
Stellaire			
Véronique FDL			
Véronique de Perse			

● MS : Moyennement Sensible ● S : Sensible ● TS : Très sensible



## ATTENTION

H351 : Susceptible de provoquer le cancer.

H361d : Susceptible de nuire au fœtus.



H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut déclencher une réaction allergique.

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

P391 Recueillir le produit répandu.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu et le récipient via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale.

### Délai de réentrée : 48 heures

SPe2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sol artificiellement drainés.

SPe7 Pour protéger les oiseaux, ne pas appliquer pendant la période de reproduction des oiseaux (mars à août).

Clortosint® - N°AMM 8700002 - Marque déposée et détenteur de l'AMM Nufarm SAS - Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels. Numéro d'agrément IF00008 Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto> - Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi se référer à l'étiquette du produit et / ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com), le et remplace toutes versions précédentes. Juillet 2021.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**