



Herbicide céréales

Le Chlortoluron solo Nufarm





UNE MATIÈRE ACTIVE INDISPENSABLE POUR GÉRER DE MANIÈRE DURABLE LES PROBLÉMATIQUES GRAMINÉES

Clortosint®, herbicide de pré-levée ou post levée précoce des céréales. Il agit par absorption racinaire et foliaire contre la plupart des adventices graminées et dicotylédones. Sa longue persistance d'action lui permet de contrôler les adventices et repousses durant plusieurs mois.

CARACTÉRISTIQUES

AMM	8700002
MATIÈRE ACTIVE	500 g/L (ou 44,1% p/p) de chlorotoluron
FORMULATION	Suspension Concentrée (SC)
CULTURES & DOSES STADE D'APPLICATION	Blé et orge à 3,6L/ha en prélevée (BBCH 00) jusqu'au stade fin tallage (BBCH29) - Utilisable sur céréales d'hiver et de printemps - Utilisation de début septembre jusqu'à fin février
STADE D'APPLICATION	Jusqu'au stade BBCH29
NOMBRE D'APPLICATION	1 seule application par culture
DRE	48 heures
ZNT	Aquatique et plantes non-cibles : 5 mètres
CLASSEMENT	Attention - EUH208 - H351 - H361d - H410 - EUH401



DESCRIPTIF ET BÉNÉFICES

- Le pivot (CTU 500g/L NUFARM) de tous les programmes désherbage de pré-levée ou post-levée précoce à l'automne sur céréales.
- Outil indispensable dans la gestion des résistances ray grass et vulpin.
- Utilisable jusque fin février pour contrôler les levées de printemps.
- CTU, la seule matière active efficace sur Vulpie.



USAGES HOMOLOGUÉS	CULTURES COUVERTE	CIBLES	DOSE MAX. D'EMPLOI	STADE D'APPLI	NOMBRE MAX. D'APPLI	DÉLAI AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT PLANTES NON-CIBLES
Blé désherbage	Blé tendre*, blé dur*	Graminées Dicotylédones	3,6 L/ha	Jusqu'au stade BBCH29	1 seule application par culture	F (BBCH29 max)	5 mètres	5 mètres
	Épeautre**							
	Triticale**							
	Tritordeum, et autres hybrides du blé							
Orge désherbage	Orge ³							


Limites maximales de résidus : se reporter aux LMR définies au niveau de l'Union Européenne, consultables à l'adresse : <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database>

* Sauf la variété Artimon

** Il appartient à l'agriculteur de vérifier la tolérance de sa variété au chlorotoluron. Sur blé tendre d'hiver, consulter la dernière édition en cours de la liste des variétés tolérantes au chlorotoluron publiée par Arvalis – Institut du végétal.

NUFARM SAS n e préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées ci-dessus, et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant son utilisation aux autres usages prévus par le catalogue des usages en vigueur.

UNE SOLUTION FLEXIBLE À L'AUTOMNE,
UTILISABLE JUSQU'À FIN FÉVRIER



UN FORT INTÉRÊT TECHNIQUE

Sur jeunes adventices	Clortosint®, 1500g de chlortoluron
Folle avoine	Levées d'automne
Vulpin	
Ray grass	
Paturin annuel	

Sur jeunes adventices	Clortosint®, 1500g de chlortoluron
Paturin commun	
Agrostis	
Vulpie	
Bromes	

- >95% d'efficacité
- 85 à 95% d'efficacité
- 70 à 85% d'efficacité
- <70% d'efficacité

