

LE CONCENTRÉ POUR DES COMBINAISONS FACILES

Mystic® Extra est un fongicide à base de tébuconazole (famille des triazoles). Grâce à ses propriétés systémiques, il agit de manière préventive ou curative et est efficace sur un très grand nombre de maladies des céréales et du colza.

CARACTÉRISTIQUES

AMM	2110167
MATIÈRE ACTIVE	430 g/L (39,81% p/p) de tébuconazole
FORMULATION	Suspension Concentrée (SC)
USAGES ET DOSES	Avoine d'hiver et printemps, blé dur d'hiver et printemps, blé tendre d'hiver et printemps, triticales, orge d'hiver et printemps, seigle d'hiver et printemps, colza d'hiver et printemps, lin oléagineux, lin fibre, moutarde, caméline, bourrache : 0,6L/ha
NOMBRE D'APPLICATION	- Avoine d'hiver et printemps, blé dur d'hiver et printemps, blé tendre d'hiver et de printemps, triticales, orge d'hiver et de printemps, seigle d'hiver et printemps : 1 application max/an - Colza d'hiver et printemps, lin oléagineux, lin fibre, moutarde, caméline, bourrache : 2 applications max/an
DRE	48 heures
ZNT	Aquatique : 5 mètres
DSPPR	5 mètres selon arrêté
CLASSEMENT	Attention - H361d H411 EUH401



DESCRIPTIF ET BÉNÉFICES

- Formulation la plus concentrée.
- Homologation céréales et colza.
- Large spectre d'efficacité.
- Multicultures.
- Séquençage possible avec d'autres tébuconazoles
- Gain de place au stockage.



CULTURES	CIBLES	DOSES MAXIMALES D'EMPLOI	NOMBRE MAX. D'APPLICATION / AN	DÉLAI AVANT RÉCOLTE	ZONE NON TRAITÉE AQUATIQUE
Avoine d'hiver, Avoine de printemps	Rouille couronnée	0,6 L/ha	1	35 jours	5 mètres
Blé dur d'hiver, blé dur de printemps, blé tendre d'hiver, blé tendre de printemps, triticale	Oïdium, rouille brune, rouille jaune, septoriose(s), fusarioses sur épis	0,6 L/ha	1	35 jours	5 mètres
Orge d'hiver, Orge de printemps	Oïdium et ramulariose, helminthosporiose (D.Teres), rhynchosporiose, rouille jaune, rouille naine	0,6 L/ha	1	35 jours	5 mètres
Seigle d'hiver, Seigle de printemps	Rouille brune, rhynchosporiose	0,6 L/ha	1	35 jours	5 mètres
Colza de printemps, colza d'hiver, lin oléagineux, lin fibre, moutarde, navette, cameline et bourrache	Sclerotiniose, alternariose, cyclindrosporiose, pseudocercosporiellose, Mycosphaerella brassicicola	0,6 L/ha	2	63 jours	5 mètres
Colza de printemps, colza d'hiver, lin oléagineux, lin fibre, moutarde, cameline et bourrache	Limitation de la croissance des organes aériens	0,6 L/ha	2	63 jours	5 mètres

INTÉRÊT TECHNIQUE

MA	PIÉTIN VERSE	OÏDIUM	SEPTO.	ROUILLE BRUNE	ROUILLE JAUNE	FUSARIOSE ÉPIS	
						F. graminearum	Microdochium spp
Mystic® Extra 0,3 l/ha, 130g + Prothio 75g	+	Faible	++	++	+	++	++

● 90% d'efficacité
 ● 80% d'efficacité
 ● 70% d'efficacité
 ● 50% d'efficacité

