



Cultures spécialisées

La solution désherbage en toute sécurité





LA SOLUTION DÉSHERBAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Minsk® est un herbicide en pré et post levée (associé), vigne, agrumes et oliviers. Pour lutter contre les adventices type graminées et dicotylédones annuelles et bisannuelles.

CARACTÉRISTIQUES


AMM	2171073
MATIÈRE ACTIVE	250 g/kg (25% p/p) de flazasulfuron (ISO)
FORMULATION	Granulés dispersables (WG)
USAGES ET DOSES	Vigne, Agrumes, Olivier – Cultures installées : 0,2 kg/ha
DÉLAI AVANT RÉCOLTE	Vigne : 75 jours Agrumes, Olivier : 45 jours
NOMBRE D'APPLICATION	1 application maximum par an
DRE	6 heures
ZNT AQUATIQUE DONT DVP	Vigne ; Olivier : 20 mètres Agrumes : 5 mètres
ZNT PLANTES NON CIBLES	5 mètres
CLASSEMENT	Attention - H410 EUH401



DESCRIPTIF ET BÉNÉFICES

- La notoriété d'une molécule efficace
- Une formulation de haute qualité
- La sécurité de l'utilisateur grâce à la technologie Protect Dosage

POSITIONNEMENT TECHNIQUE



- **Application sous le rang** : ne pas appliquer sur plus de la moitié de la surface de la parcelle.
- Application en pré-levée et **post-levée précoce des adventices**.
- **1 application par an**.

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

Usages sur vignes de 4 ans et plus.

Protéger impérativement les complants et le sol jusqu'à 1 an, puis le plant jusqu'à 4 ans.

En sortie hiver : juste avant le débourrement de la vigne, période d'action optimale.

Dès le débourrement : éviter de toucher les parties vertes de la vigne, y compris plaies de taille.

Utilisable sur toutes variétés et tout type de conduite.

Ne pas traiter les vignes présentant: une asphyxie racinaire, un mauvais état sanitaire (maladies du bois), un mauvais enracinement.

Eviter les sols : gorgés d'eau, soufflés ou travaillés, présentant un taux de calcaire actif élevé, et peu profonds.

Afin d'éviter toute phytotoxicité par contact, épamprer et relever la vigne avant application.

Traiter en l'absence de vent pour éviter la dérive.

Nettoyer le pulvérisateur après application.

SPECTRE D'EFFICACITÉ DU FLAZASULFURON

DICOTS ANNUELLES				LILIACÉES		GRAMINÉES ANNUELLES	
Amaranthe réfléchie		Lamier ampexicaule		Ail des vignes		Avoine sp.	
Amaranthus couchée		Lamium pourpre		Muscari à grappes		Bardanette rameuse	
Arroche hastée		Lampourde commune		Muscari à toupet		Digitaire sanguine	
Capselle boursée-à-pasteur		Lampourde épineuse				Eragrostis sp.	
Carotte sauvage		Matricaire sp.				Panic pied-de-coq	
Céraiste sp		Mercuriale annuelle				Paturin annuel	
Chénopode blanc		Morelle noire				Ray-grass sp.	
Chénopode hybride		Mouron sp.				Sétaire glauque	
Coquelicot		Ortie				Sétaire verte	
Crépis à feuilles de pissenlit		Picride fausse-vipérine				Sétaire verticillée	
Crépis de Nîmes		Plaintain majeur					
Crépis fétide		Plantain lancéolé					
Diploaxis fausse-roquette		Pourpier maraîcher					
Epilobe à quatre angles		Ravenelle					
Epilobe hirsute		Renouée des oiseaux					
Erigéron blanc*		Renouée faux liseron					
Erigéron du Canada*		Renouée persicaire					
Erodium à feuilles de cigüe		Sanve					
Erodium bec-de-cigogne		Séneçon commun*					
Euphorbe à feuilles en scie		Souchet sp.					
Euphorbe réveil-matin		Souci des champs					
Fumeterre officinale		Soude épineuse					
Gaillet sp.		Stellaire intermédiaire					
Geranium à feuilles rondes		Torilis des champs					
Geranium disséqué		Tribulus terrestris					
Jonc des crapauds		Véronique à feuille de lierre					
Laiteron maraîcher		Véronique de Perse					
Laiteron rude		Vesce sauvage					
Laitue scariote		*Hors situation de résistances					

DICOTS VIVACES		GRAMINÉES VIVACES	
Aristolochie sp		Brome stérile	
Chardon des champs		Chiendent commun	
Chardon sp.		Chiendent pied-de-poule	
Condrille effilée		Paturin commun	
Liseron des champs		Sorgho d'Alep	
Liseron des haies			
Mauve commune			
Mauve sylvestre			
Millepertuis officinal			
Panais			
Pissenlit commun			
Prêle des champs			
Prêle rameuse			
Renoncule âcre			
Renouée amphibie			
Rumex à feuilles obtuses			
Rumex crépu			

● 90% d'efficacité
● 80% d'efficacité
● 70% d'efficacité
● 50% d'efficacité

Points forts
Points faibles

