



Bestrijding van Spintmijten in Appel en Peer

Algemene gegevens

Borneo® is erkend als acaride in appels en peren.
Samenstelling: 110 g/L etoxazool.
Formulering: SC (Suspensie Concentraat).
Behoort tot unieke groep (oxazolinonen - klasse 10B).

Belangrijkste kenmerken

- **Borneo**® werkt via contact en na voeden.
- **Borneo**® werkt op alle larvaire stadia (verveling niet mogelijk) en op de eieren (verhindering ontwikkeling embryo).
- **Borneo**® heeft ook een (tijdelijk) steriliserend effect op de volwassen vrouwtjes.
- **Borneo**® werkt translaminair.
- **Borneo**® heeft lange werkingsduur.
- **Borneo**® is zeer regenvast (na 1 uur).
- **Borneo**® spaart de nuttige insecten inclusief bijen.

Spectrum: Spintmijten



Fruitspintmijt
(*Panonychus ulmi*)



Bonespintmijt
(*Tetranychus urticae*)



Citruspintmijt
(*Panonychus citri*)



Gele appelspintmijt
(*Eotetranychus pruni*)

Dosering en aanbevelingen

- Erkende dosis:
 - **0,375 l/ha** boomgaardoppervlakte of
 - 0.25 l/ha haagoppervlakte
- Toepassingstijdstip:
 - **vanaf volle bloei** (50% bloemen uit en eerste bloemblaadjes vallen; BBCH 65) **tot aan tweede vruchtval** (BBCH 73).
 - Ideaal spuitingsmoment: **80% van de wintereieren ontloken**
- **1 toepassing** per 12 maanden
- PHI = 42 dagen

Samenstelling: 110 g/l etoxazool
Erkenningsnr: 9962/B
Verpakking: 1 L
Aandachtig het etiket lezen vóór gebruik
Borneo® is een geregistreerd merk van Sumitomo Chemical Agro