

3-15/16"

3-7/8"

3-13/16"

**Eigenschappen en Werkingswijze**

**Regulex® 10SG** is een groeiregulator die werkt tegen ruw-schiligheid bij appel en verbetert de vruchtzetting bij peer.

**Gebruiksaanwijzing****A) Appels :**

De inzet van **Regulex® 10SG** om de vruchtverruwing te verminderen moet volgens de weersomstandigheden tussen de volle bloei (BBCH 65) en einde bloei (BBCH 69) beginnen. Bij koud en nat weer kan een behandeling in de volle bloei reeds nodig zijn, terwijl men onder goede weersomstandigheden de behandelingen op het einde van de bloei bij het vallen van de kroonblaadjes wordt aanbevolen. Er worden 3 - 4 behandelingen uitgevoerd met een interval van 7 - 12 dagen tussen de behandelingen (ten laatste BBCH 73). Bij sterk verzuivingsgevaar (vb. Bij een langdurige vochtigheid of bij een ongunstige ligging van het perceel) is een kortere tijdsinterval tussen de behandelingen aangewezen. Voor een optimale opneembaarheid van **Regulex® 10SG** is een hoge luchtvochtigheid en een voldoende water hoeveelheid bij de toepassing noodzakelijk.

**Dosering :**

5 - 10 g per 100 liter spuitvloeistof (33 - 100 g/ha fruitboomhaag) bij voorkeur toegepast met een water hoeveelheid van 1000 l/ha. De hoogste dosering toepassen op percelen en/of rassen waar in het algemeen sterke verzuivings optreedt. **Regulex® 10SG** bij voorkeur afzonderlijk spuiten.

Het product kan in een hogere dosering dan aanbevolen een ongunstige invloed hebben op de vorming van de bloemknoppen.

**B) Peren :**

Om de vruchtzetting bij peer te verbeteren, wordt een behandeling aanbevolen wanneer 20 - 30 % van de bloemen open zijn (BBCH 62 - 63). De bloemen spuiten met veel water.

Bij de inzet na nachtvorst is het van belang **Regulex® 10SG** binnen een periode van 1 - 2 dagen na de nachtvorst toe te passen om een maximale werking op vruchtzetting te bekomen (tussen BBCH 57 - 67).

**Dosering :**

15 g per 100 liter spuitvloeistof (50 - 150 g/ha fruitboomhaag).

**Bijzondere toepassingsvoorwaarden**

- SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPo : Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- De toepassing van **Regulex® 10SG** kan de vorming van bloemknoppen negatief beïnvloeden.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van

het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

- De variëteiten die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

**Bereiding van de spuitoplossing**

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder al mengende met water aanvullen.

Aanbevolen hoeveelheid water : 1000 L/ha.

**Behandelen van de lege verpakkingen en de spuitoverschotten**

De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden.

De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvoorschriften.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking.

De verpakking mag in geen enkel geval herbruikt worden voor andere doeleinden.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

**Algemene voorschriften**

- Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.
- **Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.**
- Niet in de nabijheid van zaaigoed bewaren.

**Aanwijzingen betreffende de eerste hulp****Inademen :**

Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

**Huid :**

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

**Ogen :**

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

**Inslikken :**

Spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Opmerkingen voor de arts.

**Prehospitaal :** symptomatische behandeling.

**Waarborg**

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product.

De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

**Propriétés et mode d'action**

**Regulex® 10SG** est un produit pour réduire la rugosité de la pelure des pommes et pour favoriser la mise à fruit en culture des poires.

**Mode d'emploi****A) Pommes :**

L'emploi du **Regulex® 10SG** pour diminuer la rugosité en pommier doit être positionné entre le stade phénologique de pleine floraison (BBCH 65) et le stade de fin floraison (BBCH 69). Un traitement en pleine floraison peut être indiqué en période froide et humide; sous bonnes conditions climatologiques il est préférable de commencer les traitements vers la fin de la floraison. Le nombre de traitements est de 3 à 4 avec un intervalle de ca. 7 à 12 jours (au plus tard BBCH 73). Sous des conditions de rugosité forte (période d'humidité prolongée ou parcelle à risque de rugosité) un intervalle plus court est indiqué. Pour une absorption optimale du **Regulex® 10SG** une humidité relative élevée et une quantité suffisante d'eau sont indispensables.

**Doses :** 5 - 10 g/100 l d'eau (33 - 100 g/ha de haie fruitière). Appliquer la dose la plus élevée sur parcelles et/ou variétés où l'on s'attend généralement à une forte rugosité.

De préférence pulvériser le **Regulex® 10SG** séparément.

1220-100-80-L4-1015-01

A B C D E F G H I J K

Valent BioSciences

Prepared by  
INDEPENDENT  
PRINTING COMPANYLIST  
NO. 05610-25-02COMM.  
NO. 04-8807/R3LABEL  
EDITOR J Samuel

DATE 10-12-15

COLOR SEPARATIONS  
BLACK

2-1/8"

3-13/16"

3-7/8"

3-15/16"

L'application de **Regulex® 10SG** peut influencer défavorablement le retour à fleur en cas d'utilisation au-dessus des doses recommandées.

#### B) Poires :

Pour améliorer la mise à fruits en poirier un traitement est indiqué au stade 20 à 30% de fleurs ouvertes (BBCH 62-63). Traiter les fleurs avec un volume élevé d'eau.

En cas de gel tardif, le traitement **Regulex® 10SG** doit être appliqué dans un délai de 1 à 2 jours pour obtenir une efficacité maximale pour la mise à fruits (entre BBCH 57 à 67).

**Doses :** 15 g/100 l d'eau (50 - 150 g/ha de haie fruitière).

#### Conditions particulières d'application

- SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SPo : Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
- L'application de **Regulex® 10SG** peut influencer défavorablement la formation de boutons floraux.
- Les variétés susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.
- La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, en fonction de l'étendue des effets

recherchés ou de la sensibilité variétale. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

#### Préparation de la bouillie

Remplir la cuve à moitié d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter, en mélangeant, la cuve avec la quantité d'eau nécessaire.

Quantité d'eau recommandée : 1000 L/ha.

#### Traitement des emballages vides et les surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau manuellement (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de rinçage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

#### Mesures de précaution

- Il est recommandé de rincer correctement le pulvérisateur avec de l'eau.
- **Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.**
- Tenir **Regulex® 10SG** à l'écart des semences.

#### Indications concernant les premiers secours

##### Inhalation

Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

##### Contact avec la peau

Rincer abondamment la peau à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes.

Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés.

En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

##### Projection dans les yeux

Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint.

Porteurs de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. En cas de symptômes consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

#### Ingestion

Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

#### Remarques pour le médecin

**Prise en charge :** traitement symptomatique.

#### Garantie

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous déclinons par conséquent toute responsabilité quand aux résultats insuffisants et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur assume seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

## Regulex® 10SG

RÉGULATEUR DE CROISSANCE

SG (GRANULÉS SOLUBLES DANS L'EAU)

Waarschuwingzinnen	Mentions d'avertissement	Gefahrenhinweis
<b>Veiligheidsaanbevelingen</b> P261 Inademing van stof vermijden. P285 Bij ontoreikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving.	<b>Conseils de prudence</b> Éviter de respirer les poussières. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale.	<b>Sicherheitshinweise</b> Einatmen von Staub vermeiden. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Inhalt / Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen zuführen.
<b>Andere etiketelementen</b> EUH 410 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	<b>Autres mentions</b> Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.	<b>Andere Kennzeichnungen</b> Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Lees aandachtig het etiket voor gebruik / Lire attentivement l'étiquette avant usage / Lesen Sie das Etikett sorgfältig vor Gebrauch.

**VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**

870 Technology Way  
 Libertyville, IL 60048 U.S.A.  
 Phone: 1-847-968-4790

**100G**

Geregistreerd handelsmerk van / marque enregistrée de  
 Valent BioSciences Corporation, U.S.A.

Verdeeld door: / Distribué par :

Nufarm B.V.  
 Rivium Quadrant 75-7  
 2909 LC Capelle aan den IJssel  
 Nederland  
 Tel.: 0031 10-3037725

**Erkenningshouder/Détenteur d'agrément**

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS  
 Parc d'Affaires de Crécy,  
 2, rue Claude Chappe  
 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, France / Frankrijk  
 Tel.: +33478643257

Erkenningsnummer / Numéro d'agrément / Zulassungsnummer: 10220P/B

Werkzame stof / Ingrédient active / Wirkstoff: 10 % GIBBERELLINE A4+7

Aard van het preparaat / Type de formulation / Formulierung :  
 Wateroplosbaar granulaat / Granulés solubles dans l'eau / Wasserlösliche Granulate (SG)

Lotnummer / N° de lot / Chargennummer : zie verpakking / voir emballage / Siehe Verpackung

Voor Professioneel gebruik / Pour usage professionnel / Für den professionellen Gebrauch



A B C D E F G H I J K

**Valent BioSciences**

Prepared by  
**INDEPENDENT  
 PRINTING COMPANY**

LIST NO. 05610-25-02

COMM. NO. 04-8807/R3

LABEL EDITOR J Samuel

DATE 10-12-15

#### COLOR SEPARATIONS

PANTONE 109

PANTONE 144

PANTONE 348

PANTONE 424

BLACK

**Nufarm** Grow a better tomorrow.

10220-100-BA-L4-1015-01  
 List No. 05610-25-02  
 04-8807/R3

2-1/8"

5"

**Regulex® 10SG**

RÉGULATEUR DE CROISSANCE

SG (GRANULÉS SOLUBLES DANS L'EAU)

Erkenningsnummer / Numéro d'agrément / Zulassungsnummer: 10220P/B

Werkzame stof / Ingrédient active / Wirkstoff: 10% GIBBERELLINE A4+7

Aard van het preparaat / Type de formulation / Formulierung:

Wateroplosbaar granulaat / Granulés solubles dans l'eau / Wasserlösliche Granulate (SG)

Lotnummer / N° de lot / Chargennummer: zie verpakking / voir emballage / Siehe Verpackung

Voor Professioneel gebruik / Pour usage professionnel / Für den professionellen Gebrauch


 ←  
 OPEN HEIR  
 OUVRIICI

	Waarschuwingzinnen	Mentions d'avertissement	Gefahrenhinweis
P261 P285	<b>Veiligheidsaanbevelingen</b> Inademing van stof vermijden. Bij ontoreikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.	<b>Conseils de prudence</b> Éviter de respirer les poussières. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.	<b>Sicherheitshinweise</b> Einatmen von Staub vermeiden. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
P501	Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving.	Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale.	Inhalt / Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen zuführen.
	<b>Andere etiketelementen</b>	<b>Autres mentions</b>	<b>Andere Kennzeichnungen</b>
EUH 410	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Lees aandachtig het etiket voor gebruik / Lire attentivement l'étiquette avant usage / Lesen Sie das Etikett sorgfältig vor Gebrauch.

**VALENT BIOSCIENCES**  
CORPORATION  
870 Technology Way  
Libertyville, IL 60048 U.S.A.  
Phone: 1-847-968-4790

Verdeeld door: / Distribué par :  
Nufarm B.V.  
Rivium Quadrant 75-7  
2909 LC Capelle aan den IJssel  
Nederland  
Tel.: 0031 10-3037725

**Erkenningshouder/Détenteur d'agrément**  
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS  
Parc d'Affaires de Crécy,  
2, rue Claude Chappe  
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, France / Frankrijk  
Tel.: +33478643257

10220-100-BA-L4-1015-01  
List No. 05610-25-02  
04-8807/R3

**100G** ® Geregistreerd handelsmerk van / marque enregistrée de  
Valent BioSciences Corporation, U.S.A.



Nufarm Grow a better tomorrow.

 Lotnummer /  
 N° de lot:

A B C D E F G H I J K

**Valent BioSciences**

Prepared by

**INDEPENDENT  
PRINTING COMPANY**

 LIST  
 NO. 05610-25-02

 COMM.  
 NO. 04-8807/R3

 LABEL  
 EDITOR J Samuel

DATE 10-12-15

**COLOR SEPARATIONS****BLACK****VARNISH**