

Culture	Localisation	Pour lutter contre	Dose (kg/ha)	Nombre d'applications	Intervalle min entre 2 applications (jours)	Mesures de réduction du risque (par rapport aux eaux de surface avec technique classique)
Betterave rouge et jaune	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Carottes	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Patatis	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Céleri-raves	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Radis	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Radis noir, Radis rave	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Scorsonère	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Chou-navet, rutabaga	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Navet	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Railfort*	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Topinambour	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Ail	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Oignons de printemps	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Oignons (récolté sec)	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Echalote	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Chou brocoli	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Chou-fleur (blanc et vert)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Chou de Bruxelles	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Choux pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de Savoie)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Chou chinois, pakchoi, pakchoi en rosette et komatsuna	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Chou frisé (chou palmier)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Chou-rave	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Cresson alénois et autres jeunes pousses*	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Mâche	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Laitues	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Endives/Radicchio/Romain/Pain de sucre	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Epinard	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Cresson de fontaine*	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Culture de racines de witloof	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m

B7

Culture	Localisation	Pour lutter contre	Dose (kg/ha)	Nombre d'applications	Intervalle min entre 2 applications (jours)	Mesures de réduction du risque (par rapport aux eaux de surface avec technique classique)
Bette (blette)*	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Roquette*	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Jeunes pousses de la famille des Brassicaceae, Asteraceae ou Amaranthaceae (récoltées jusqu'au stade 8 vraies feuilles**)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Haricots verts (récoltés frais avec cosse)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Pois récoltés secs (sans cosse)	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Petits pois (sans cosse)	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Pois verts (avec cosse) (mange-tout)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Pois fourragers (récoltés secs)	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Fèves et fèvesoles (récoltées sèches)	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Fèves et fèvesoles (récoltées fraîches, sans cosse)	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Asperge (champ de production, sauf 1ère et 2ème années de culture)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Céleri (à côtes, blanc et vert)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Fenouil	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Poireau (champ de production)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8**	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Poireau (il. de semences)	Sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8**	7	Pas de zone tampon
Rhubarbe	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Aneth*, basilic*, carvi*, ciboulette*, cerfeuil*, céleri à couper*, coriandre*, estragon*, baurier*, livèche*, mélisse*, menthe*, origan/marjolaine*, oseille*, persil*, pouliot*, romarin*, roquette*, sauge officinale*, thym* : consommation des feuilles Salicornie* : consommation des feuilles et/ou tiges	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Angélique* : consommation des feuilles et des racines, persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux*, valériane* : consommation de la racine	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Heurs comestibles*	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Mais doux	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-4	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m

\* Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.  
\*\* Le nombre d'applications est exprimé par culture. Cela doit être considéré comme un nombre maximal d'applications que peut recevoir un plant de poireau, indépendamment de l'endroit où il se situe. Des fers, ill. de semences et champ de production doivent être considérés comme une seule culture.

B8

Culture	Localisation	Pour lutter contre	Dose (kg/ha ou kg/ha/haie)	Nombre d'applications	Intervalle min entre 2 applications (jours)	Mesures de réduction du risque (par rapport aux eaux de surface avec technique classique)
Cornichon, Courgette/Pâtisson, Potiron	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5 - 1 kg/ha	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Potiron	Sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5 - 1 kg/ha	1 à 8	7	Pas de zone tampon
Tomate, Poivron/Piment, Aubergine, Pépinois	Sous protection	Chenilles défoliatrices, Tuta absoluta	0,33 - 0,66 kg/ha/haie	1 à 8 (8 max par culture)	7	Pas de zone tampon
Cornichon, Courgette/Pâtisson, Melon	Sous protection	Chenilles défoliatrices	0,33 - 0,66 kg/ha/haie ou 0,5 - 1 kg/ha	1 à 8	7	Pas de zone tampon
Concombre	Sous protection	Chenilles défoliatrices	0,33 - 0,66 kg/ha/haie	1 à 8	7	Pas de zone tampon

Culture	Localisation	Pour lutter contre	Dose (kg/100L d'eau)	Nb. d'applications	Intervalle min entre 2 applications (jours)	Mesures de réduction du risque (par rapport aux eaux de surface avec technique classique)
Plantes ornementales	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices, hyponomeutes, chrysox, chéimatobie brumeuse/phalène défilante	0,1 - 0,2	1 à 3 (8 max par culture)	7	Zone tampon de 5 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)

Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur 1 (les) espèce(s) suivantes) :  
Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

- CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION**
- SPl : Ne pas pulvériser l'eau avec le produit ou son emballage.
  - SP1 : Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code IRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 11A.
  - SP3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
  - SP4 : Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
  - La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.
  - Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

**MESURES DE PRÉCAUTION AVANT LA RENTRÉE EN CULTURES SOUS PROTECTION**

Ventiler jusqu'au séchage du produit pulvérisé avant de rentrer. D'autres travaux peuvent être effectués par la suite sans l'utilisation de mesures de protection.

**PRÉPARATION DE LA BOUILLIE**

Remplir la cuve à moitié d'eau, ajouter le produit, mélanger et compléter, en mélangeant, la cuve avec la quantité d'eau nécessaire.

**MESURES DE PRÉCAUTION**

- Il est recommandé de rincer correctement le pulvérisateur avec de l'eau après le traitement.
- Conserver le produit sous-dé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

**TRAITEMENT DES EMBALLAGES**

**VIDES ET LES SURPLUS DE TRAITEMENT**

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau manuellement (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placée sur le pulvérisateur. Les eaux de rinçage doivent être versées dans la cuve de pulvérisation.

L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vidé. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

B9

**CONSEILS DE PREMIERS SECOURS**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**EN CAS D'INGESTION :** Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

**EN CAS D'INHALATION :** Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

**Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245**

**GARANTIE**

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant aux résultats insuffisants et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit.

L'acheteur assume seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.



**Biologisch insecticide ter bestrijding van rupsen in de groententeelt, fruitteelt en sierteelt (in open lucht en onder bescherming).**

**Insecticide biologique pour lutter contre les chenilles en cultures légumières, cultures fruitières et plantes ornementales (en plein air et sous protection).**

**Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 54% *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, stam ABTS-351. Granulés à disperser dans l'eau (WG) à base de 54% *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, souche ABTS-351.**

**Erkenningsnummer/Numéro d'agrément: 10113P/B**

**IRAC 11A INSECTICIDE** 5100275-07205

**1 kg e**

**Erkenningshouder/Détenteur d'agrément:** Sumitomo Chemical Agré Europe S.A.S., 108 rue de la Vierge Lactée, 69370 Saint-Denis-au-Mont-01c, France, Tél. +33 4 38 64 52 60

**Valent BioSciences LLC**, 1910 Innovation Way, Suite 100, Libertyville, IL 60069, U.S.A., 1-800-323-9597

**Verdeeld door/Distributeur par:** Nufarm B.V., Postbus 1000, 2900 CA Capelle aan den IJssel, Nederland, Tel. +31 (0)303725, www.nufarm.com/be

**SKL AS2004-25-02 AS400101P**  
**FR00014984-0725**

**Veiligheidsaanbevelingen**

**P260 :** Stof en spuitnevel niet inademen. **P280 :** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen. **P284 :** Adembescherming dragen. **P302+P352 :** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. **P308+P313 :** NA (mogelijke) blootstelling: Het ANTIGIF-CENTRUM of een arts raadplegen.

**Aanvullende veiligheidsinformatie**

**EUH210 :** Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. **EUH401 :** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. **EUH402 :** *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. Micro-organismen kunnen eventueel sensibiliserende reacties uitlokken. **Consuleer de productie**

**P260 :** Ne pas respirer les poussières et les brumes de pulvérisation. **P280 :** Porter des gants de protection et des vêtements de protection. **P284 :** Porter un équipement de protection respiratoire. **P302+P352 :** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. **P308+P313 :** EN CAS D'EXPOSITION prouvée ou suspectée : Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

**Informations additionnelles sur les dangers**

**EUH210 :** Fiche de données de sécurité disponible sur demande. **EUH401 :** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**Content of *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*.** Les micro-organismes peuvent avoir le potentiel de provoquer des réactions de sensibilisation.

**Lees aandachtig het etiket voor gebruik/Lire attentivement l'étiquette avant usage.**

**UFI: 0170-0410-300G-0VFM**

- CYAN
- MAGENTA
- YELLOW
- BLACK
- DIELINE (NO PRINT)

DipeL® DF

EIGENSCHAPPENWERKINGSWIJZE

Het biologische insecticide DipeL® DF bestrijdt bladvreterende rupsen van vlinders en motten (lepidopteren) op diverse gewassen. Het middel is een bacteriepreparaat op basis van sporen en kristallen van Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki stam ABTS-351. Nadat het product opgegeten is door de rupsen, zal het de wanden van het darmkanaal van de rupsen aantrekken. Hierdoor zal een vrieskroep spoedig intreden en enkele dagen later zullen de rupsen doodgaan. De jongere rupsen zijn gevoeliger voor het product dan de oudere. Gebruik de hoogste dosis bij hoge rupsendruk of bij aanwezigheid van oudere rupsen. Voor het berekenen van een goede bestrijding is het noodzakelijk dat alle plantendelen voldoende met de spuitvloeistof worden bespot. Gebruik daarom voldoende water. Na toepassing moet het minstens 6 uur droog blijven om een optimale werking te bekomen.

TOEPASSINGEN EN DOSERINGEN

Toepassingsstadium: larve. Toepassen vanaf het verschijnen van de eerste rupsen of het uitkomen van de eieren; de behandeling indien nodig herhalen. Toepassingstechniek: bespuiting.

VRUCHTEN TELEN

Table with 6 columns: Gewassen, Locatie, Ter bestrijding van, Toepassingsdosis per behandeling (kg/ha haag), Aantal toepassingen, Minimaal interval tussen 2 toepassingen (dagen), Risicobeperkende maatregelen (ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek). Rows include Appelbomen, Perenbomen, Atrikozenbomen, Kersen- en kriebelbomen, Perzik- en nectarinebomen, Pruimenbomen, Druiveelaars (wijnproductie), Druiveelaars (tafel druiven), Aardbeienplanten, Braamstruiken, Frambozenstruiken, Blauwe en rode besessenstruiken, Veenbessenstruiken, Aalbessenstruiken (witte, rode en zwarte), Stekbesessenstruiken (kruisbes) en kruisingen, Kivibesplanten.

GAOENETEELT

Table with 6 columns: Gewassen, Locatie, Ter bestrijding van, Toepassingsdosis per behandeling (kg/ha), Aantal toepassingen, Minimaal interval tussen 2 toepassingen (dagen), Risicobeperkende maatregelen (ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek). Rows include Rode en gele biet (kroten), Wortelen, Pastinaak, Knolbelder, Radijs, Rammenas en retich, Schorsener, Kookraap, Raap (stoppelraap, meiraap), Merikswortel\*, Aardpeer, Knollook, Broccoli, Bieslook (dente-u), Lieni (drooggeogste), Spalst, Blomkool (witte en groene), Spruitkool, Sluikwiel (witte, rode, kabuskool, savooi- en spitskool), Braamstruiken, Frambozenstruiken, Blauwe en rode besessenstruiken, Veenbessenstruiken, Aalbessenstruiken (witte, rode en zwarte), Stekbesessenstruiken (kruisbes) en kruisingen, Kivibesplanten.

Table with 6 columns: Gewassen, Locatie, Ter bestrijding van, Toepassingsdosis per behandeling (kg/ha), Aantal toepassingen, Minimaal interval tussen 2 toepassingen (dagen), Risicobeperkende maatregelen (ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek). Rows include Witloofwortelteelt, Warmoes (spijbiet)\*, Rucola\*, Balseml (geogst tot het stadium 8 bladeren)\*, Stamslabonen (grinsses-en, snijboom), Drooggeogste erwten (zonder peul), Groengeogste erwten (zonder peul), Groengeogste erwten (met peul), Voedererwten (drooggeogst), Vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (drooggeogst), Vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (grinssesgeogst, zonder peul), Asperge (productieveld; asperges op velden die in productie zijn, dus niet het 1ste of 2de jaargewas), Selderij (bleek-, groene en witte), Knolvenkel, Prael (productieveld), Prael (zaai-bed), Rabarber, Bieslook\*, alle "kervel", karwij, "suicelber", koriander\*, lavas, magiglant\*, petereke\*, dragon\*, citroenbalsem\*, munt\*, basilicum\*, marjolein\*, oregano\*, salie\*, "lijm", rozemarijn\*, laurier\*, zuring\*, postelein\*, consoude\*, blaasieren, Zeekraal\*, consoude\*, blaasieren en/of stengels, Grote engeltwortel\*, consoude\*, blaasieren, consoude\*, wortelpeterselle en wortelkervel\*, valerian\*, consoude\*, wortel, Eetbare bierenen\*, Suikermais.

\* Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aanraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen. \* Let op: Het aantal toepassingen wordt uitgedrukt als een aantal per teelt. Dit moet beschouwd worden als het aantal toepassingen die één preipak mag ontvangen, ongeacht de plaats waar dit plantje staat. Dus zaaiend en productieveld worden beschouwd als één teelt.

GROENTEN WAARVAN HET FRUIT WORDT GEGETEN

Table with 6 columns: Gewassen, Locatie, Ter bestrijding van, Toepassingsdosis per behandeling (kg/ha haag), Aantal toepassingen, Minimaal interval tussen 2 toepassingen (dagen), Risicobeperkende maatregelen (ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek). Rows include Augurk, Courgette/palisson, Pompoen, Pompoenen, Tomaten, Paprika/Spaarse peper, Aubergine, Eiersplant en pepino, Augurk, Courgette/palisson, Meloen, Komkommer.

SIERPLANTEN

Table with 6 columns: Gewassen, Locatie, Ter bestrijding van, Toepassingsdosis per behandeling (kg/100L water), Aantal toepassingen, Minimaal interval tussen 2 toepassingen (dagen), Risicobeperkende maatregelen (ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek). Rows include Sierplanten.

Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: De soorten en variëteiten van sieregewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product u niet verpakking geen water verontreinigt.
SP2: Om reststroom te voorkomen moet u het product afwassen met producten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 11A.
SP3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
SP4: Na de behandeling de pelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
De toelatingen worden gegeven op basis van de beste werkwijze waarbij de maximale veiligheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Bij bestrijding van de dosis is het niet toegestaan het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd te verlengen.
Draag steeds beschermingskleding die de zinnen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkleding vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vliesstofdichte schoenen of laarzen bij het hantieren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN BIJ HERBETREDING

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkaanhouders kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING

Het product in de verpakking gevuld spuitkan gieten. Meng en verder al mengende met water aanvullen.

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

- Om de veiligheid van de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.
Het product in een originele gesloten verpakking en voorbij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

BEHANDELEN VAN DE LEGE VERPAKKINGEN EN DE SPUITOVERSCHOLLEN

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingsstelsel met water onder druk dat op het sproei-toestel geaakt is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank worden gegeten. De albus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingekleefd worden op een laatste voorzien in een afsluitend. De spuitvoorzieningen circa 10 maal verduimen en verspreiden op de reeds behandelde pelen/volgens de gebruiksvoorwaarden. Nijvers, waterlopen, beken en grachten niet vervullen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitvoorzieningen na de behandeling te verwijderen, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

AANWIJZINGEN BETREFFENDE DE EERSTE HULP EN VOOR DE GEENESHEER

Na in ademen: Maatregelen eerste hulp: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Na spatelen in de ogen: Maatregelen eerste hulp: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangeaste oog. Bij contactlenzen: indien mogelijk te verwijderen, verwijder eerste de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Na inslikken: Maatregelen eerste hulp: Spoel de mond, Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Na morsen op kleren en huid: Maatregelen eerste hulp: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder onderfussen verontreinigde kleding en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

AANWIJZINGEN VOOR DE GEENESHEER - BEHANDELING
Pneumonitis: Symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal. Daar er tot op heden geen of zeer weinig gevallen gerapporteerd zijn bij de mens, wordt een observatie in het ziekenhuis aanbevolen bij In name. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Het Antigifcentrum: 010/245.245.

WAARBORG

Eke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien bij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

DipeL® DF

PROPRIETES ET MODE D'ACTION

L'insecticide biologique DipeL® DF lutte contre les chenilles défoliatrices sur diverses cultures. Il contient des spores et des cristaux de la bactérie Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki souche ABTS-351. Après ingestion du produit, les parois de l'intestin de la chenille se perforent. Elle s'arrête alors de s'alimenter, ce qui conduit à sa mort quelques jours plus tard. Les chenilles les plus jeunes sont plus sensibles au produit que les plus âgées. Utilisez donc la dose la plus élevée du produit si les chenilles sont plus développées ou en cas d'infestation plus importante. Pour une bonne efficacité du produit, utilisez suffisamment d'eau lors de la pulvérisation afin de bien recouvrir toutes les parties de la plante. Veillez aussi à ce que la plante reste sèche pendant les 6 heures après le traitement.

USAGES ET DOSES D'EMPLOI

Stade d'application : larve. Traiter dès l'élosion des œufs ou l'apparition des premières larves. Répéter le traitement si nécessaire. Méthode d'application : pulvérisation.

CULTURES FRUITIÈRES

Table with 6 columns: Culture, Localisation, Pour lutter contre, Dose (kg/ha haie), Nb. d'applications, Intervalle min. entre 2 applications (jours), Mesures de réduction du risque (rapport aux eaux de surface avec technique classique). Rows include Pommeiers, Poiriers, Abricotiers, Cerisiers/Groeniers, Peches/Nectariniers, Pruniers, Vignes (production de vin), Vignes (raisins de table), Fraises (champ de production, de sélection et de multiplication), Ronces (nières), Framboisiers, Myrtiliers et Airelliers rouges, Airelliers canneberges, Groseillers (blancs, rouges et cassis), Groseillers à maquereau et hibernés, Kiwis (ovis de Sibérie).

10.75"

4.8"

# PRECE

**DiPel® DF**  
BIOLOGICAL INSECTICIDE  
DRY FLOWABLE

**Biologisch insecticide ter bestrijding van rupsen in de groententeelt, fruitteelt en sierteelt (in open lucht en onder bescherming).**  
**Insecticide biologique pour lutter contre les chenilles en cultures légumières, cultures fruitières et plantes ornementales (en plein air et sous protection).**

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 54% *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, stam ABTS-151.  
Granulés à disperser dans l'eau (WG) à base de 54% *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, souche ABTS-151.  
Erkeningsnummer/Numéro d'agrèation: 10113P/B

IRAC 11A INSECTICIDE 5000725-07205 1 kg e

**SUMITOMO CHEMICAL**

Erkenningshouder/Déporteur/agrèation:  
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.  
10A rue de la Voie Lactée  
69370 Saint-Etienne-Mont-d'Or, France  
Tel. +334 78 64 32 60

Valent BioSciences LLC  
1910 Innovation Way, Suite 100  
Libertyville, IL 60048, U.S.A.  
1-800-329-9597

Verdeeld door/Distributeur par:  
Nufarm B.V.  
Rivium Dordrecht 75-7  
2809 LC Oudegraven den IJssel, Nederland  
Tel. +31(0)30 807 25  
www.nufarm.com/be

SAI 452046-25-02 4504076/R  
F1000498A-0725

AgriRecover  
www.agrirecover.eu

**VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK/  
POUR USAGE PROFESSIONNEL**

**Veilighedsaanbevelingen**  
P260: Stof en spulnevel niet inademen, P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen, P284: Adembescherming dragen, P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten, P308+P311: NA (mogelijke) blootstelling: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
**Aanvullende gevareninformatie**  
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar, EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.  
Bevat *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. Micro-organismen kunnen eventueel sensibiliserende reacties uitlokken.  
**Conseils de prudence**  
P260: Ne pas respirer les poussières et les brumes de pulvérisation. P280: Porter des gants de protection et des vêtements de protection, P284: Porter un équipement de protection respiratoire. P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes, P308+P311: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.  
**Informations additionnelles sur les dangers**  
EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande, EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
Contient du *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. Les micro-organismes peuvent avoir le potentiel de provoquer des réactions de sensibilisation.  
Lees aandachtig het etiket voor gebruik/Lire attentivement l'étiquette avant usage.

GTIN: Lotnummer/N° de lot: Productiedatum/Date de production:

CYAN  
MAGENTA  
YELLOW  
BLACK  
DIELINE (NO PRINT)

OPEN HERE