



FUSILADE MAX®

HRAC 1 HERBICIDE

Selectief herbicide in na-opkomst voor de bestrijding van zowel eenjarige als meerjarige grassen in land- en tuinbouw en sierteelt. Herbicide sélectif en post-lèevèe pour le contrôle des graminées annuelles et vivaces en agriculture, en horticulture et en floriculture.

Toelatingsnummer / Numéro d'autorization: 9476P/B

Numéro d'agrément (Lux): L01664-123

Werkzame stof / Substance active: fluzifop-P-butyl

Gehalte / Teneur: 125 g/l

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

Formuleringstype / Type de formulation:

(EC) Emulgeerbaar concentraat / Concentré émulsionnable.

Lotnummer / Numéro de lot: zie verpakking / voir emballage

FUSILADE MAX UFI: SERX-P68Y-PEAK-UD1E

	Gevarenaanduidingen	Mentions de danger
H361d	Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.	Susceptible de nuire au fœtus.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
	Veiligheidsaanbevelingen	Conseils de prudence
P263	Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.	Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.
P280	Beschermende handschoenen, beschermende kleding en geluatsbescherming dragen.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.	Recueillir le produit répandu.
P308+P313	NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
	Andere etiketelementen	Autres mentions
EUH 401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
EUH 208	Bevat fluzifop-P-butyl. Kan een allergische reactie veroorzaken.	Contient fluzifop-P-butyl. Peut produire une réaction allergique.



Waarschuwing / Attention

*: Geregistreerd handelsmerk van / Marque enregistrée de Nufarm

5Le

510001441_092025

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Netherlands
Tel.: +31 10 303 77 25
www.nufarm.com/be



www.agrirecover.eu



0 87 20364 28255 4

Eigenschappen en werkwijze

FUSILADE MAX® is een selectief herbicide toegepast in na-opkomst op eenjarige en meerjarige grassen.

FUSILADE MAX® wordt geabsorbeerd door de bladeren van het onkruid en wordt getransporteerd naar alle delen van de planten, inclusief de wortels.

FUSILADE MAX® is mengbaar met de meeste naopkomstherbiciden erkend in de bietenteelt.

In het algemeen is het aangeraden om tussen een bespuiting met FUSILADE MAX® en een bespuiting ter bestrijding van dicotyle onkruiden een week tussen te laten.

Toepassingsstijp en dosering

Voor een goede bestrijding wordt aanbevolen om FUSILADE MAX® zo vroeg mogelijk toe te passen, wanneer het onkruid actief groeit, onder warme weersomstandigheden en met voldoende bodemvocht. Onder droge omstandigheden kan de bestrijding van onkruid verminderd zijn.

Gebruik max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden.

Max. 2 toepassingen /12 maanden.

Toepassingstechniek: bespuiting.

Locatie van de behandeling: open lucht.

Fruittomen (appel- en perenbomen, kersen- en kriekenbomen, pruimenbomen)

Ter bestrijding van:

– Doorlevende grasachtige onkruiden (Poaceae (perennial)).

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19–49).

Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

– Duist (Alopecurus myosuroides) en hanenpoot (Echinochloa crus-galli).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1 l/ha.

– Kwee gras (Agropyron repens).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).

Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

– Raaigras (Lolium spp.), wilde haver (Avena fatua), windhalm (Apera spica-venti) en graanopslag (volunteers of cereals).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1,5 l/ha.

Aantal toepassingen: 1.

Wachttijd voor de oogst: 28 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Druivelaars (voor wijnproductie en tafeldruiven) (open lucht)

Ter bestrijding van:

– Doorlevende grasachtige onkruiden (Poaceae (perennial)).

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19–49).

Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

– Duist (Alopecurus myosuroides) en hanenpoot (Echinochloa crus-galli).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1 l/ha.

– Kwee gras (Agropyron repens).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).

Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

– Raaigras (Lolium spp.), wilde haver (Avena fatua), windhalm (Apera spica-venti) en graanopslag (volunteers of cereals).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1,5 l/ha.

Aantal toepassingen: 1.

Wachttijd voor de oogst: 28 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Aardbeien (productieveld en selectie-vermeerderingsveld) (open lucht)

Toepassingsstadium productieveld: voor de bloei + na de oogst.

Toepassingsstadium selectie- en vermeerderingsveld: voor de bloei + begin vorming van zijsheten – oude bladeren verdroogd en afgestorven (BBCH 91–97).

Ter bestrijding van:

– Doorlevende grasachtige onkruiden (Poaceae (perennial)).

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19–49).

Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

– Duist (Alopecurus myosuroides) en hanenpoot (Echinochloa crus-galli).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1 l/ha.

– Kwee gras (Agropyron repens).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).

Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

– Raaigras (Lolium spp.), wilde haver (Avena fatua), windhalm (Apera spica-venti) en graanopslag (volunteers of cereals).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1,5 l/ha.

Aantal toepassingen: 1.

Wachttijd voor de oogst voor productieveld: 42 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Fruittuiken: braam- en frambozenstruiken, aalbesstruiken (witte, rode, zwarte), stekelbesstruiken, kruisbes en kruisingen.

Toepassingsstadium: voor de bloei + na de oogst

Ter bestrijding van:

– Doorlevende grasachtige onkruiden (Poaceae (perennial)).

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19–49).

Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

- **Duist (*Alopecurus myosuroides*) en hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*).**
Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1 l/ha.
- **Kweekgras (*Agropyron repens*).**
Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).
- **Raaigras (*Lolium spp.*), wilde haver (*Avena fatua*), windhalm (*Apera spica-venti*) en graanopslag (*volunteers of cereals*).**
Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1,5 l/ha.

Aantal toepassingen: 1.

Wachttijd voor de oogst: 45 dagen voor braam- en frambozenstruiken, 90 dagen voor aalbessen- en stekelbessenstruiken.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Groententeelt

- **Rode en gele biet (kroten), pastinaak, knolselder, radijs, rammenas en retsch, schorseneer, koolraap, raap (stoppelraap en meiraap), mierikswortel, witloofwortelteelt, knoflook, drooggeogste uien, sjalot.**
- **Toepassingsstadium voor de bloei: stamslabonen (prinsessen- en snijboon)(groengeogst met peul), drooggeogste erwten (zonder peul), voedererwten (drooggeogst), viacabonen (paarden-, duiven-, tuin-, ..) (drooggeogst), groengeogste erwten (zonder peul), groengeogste erwten (met peul).**

Ter bestrijding van:

- **Doorlevende grasachtige onkruiden (*Poaceae (perennial)*).**
Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19–49).
Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).
- **Duist (*Alopecurus myosuroides*) en hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*).**
Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1 l/ha.
- **Kweekgras (*Agropyron repens*).**
Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).
- **Raaigras (*Lolium spp.*), wilde haver (*Avena fatua*), windhalm (*Apera spica-venti*) en graanopslag (*volunteers of cereals*).**
Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1,5 l/ha.
- **Aantal toepassingen: 1.**
Wachttijd voor de oogst:
 - 28 dagen: knoflook, drooggeogste uien, sjalot, stamslabonen (prinsessen- en snijboon)(groengeogst met peul), groengeogste erwten (met peul).
 - 35 dagen: groengeogste erwten (zonder peul).
 - 56 dagen: rode en gele biet, pastinaak, knolselder, radijs, rammenas en retsch, schorseneer, koolraap, raap (stoppelraap en meiraap), mierikswortel, witloofwortelteelt.
 - 90 dagen: drooggeogste erwten (zonder peul), voedererwten (drooggeogst), viacabonen (paarden-, duiven-, tuin-, ...) (drooggeogst).

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Groententeelt en kruiden:

- **wortelen, slasoorten, andijvie, radicchio rosso en suikerbrood, ruccola, spinazie, warmoes, asperge, selderij (bleek-, groene- en witte), knolvenkel.**
- **dille, grote engelwortel, kervel, snijselder, lavas/maggiplant (consumptie bladeren), Peterselie, koriander (consumptie van bladeren)**

Ter bestrijding van:

- **Duist (*Alopecurus myosuroides*) en hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*).**
Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1 l/ha.
- **Raaigras (*Lolium spp.*), wilde haver (*Avena fatua*), windhalm (*Apera spica-venti*) en graanopslag (*volunteers of cereals*).**
Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1,5 l/ha.
- **Aantal toepassingen: 1.**
Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing/teelt.
Wachttijd voor de oogst:
 - 35 dagen: spinazie, warmoes (snijbiet), dille (consumptie bladeren), grote engelwortel, kervel, snijselder, lavas / maggiplant (consumptie bladeren), Peterselie (consumptie bladeren), koriander (consumptie van bladeren).
 - 42 dagen: slasoorten, andijvie, radicchio rosso en suikerbrood, ruccola, asperge, selderij (bleek-, groene- en witte), knolvenkel.
 - 56 dagen: wortelen, radijs.
- **Risicobeperkende maatregelen:** Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.
- **Waarschuwing:** Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Soja (drooggeogst, zonder peul)

Toepassingsstadium: drievoudig blad op 2de knoop ontvouwen – 5de zischeut van eerste orde zichtbaar (BBCH 12–25).

Ter bestrijding van:

- **Duist (*Alopecurus myosuroides*) en hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*).**
Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1 l/ha.
- **Raaigras (*Lolium spp.*), wilde haver (*Avena fatua*) en windhalm (*Apera spica-venti*).**
Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1,5 l/ha.
- **Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing/teelt.**
- **Risicobeperkende maatregelen:** Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Suikerbieten, voederbieten, cichorei

Ter bestrijding van:

- **Doorlevende grasachtige onkruiden (*Poaceae (perennial)*).**
Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19–49).
Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

- Duist (*Alopecurus myosuroides*) en hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*).
Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1 l/ha.

- Kweekgras (*Agropyron repens*).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

- Raaigras (*Lolium* spp.), wilde haver (*Avena fatua*), windhalm (*Apera spica-venti*) en graanopslag (*volunteers of cereals*).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1,5 l/ha.

Aantal toepassingen: 1.

Wachtijd voor de oogst: 56 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Zomervlas

Toepassingsstadium: max. 15 cm gewashoogte.

Ter bestrijding van:

- Duist (*Alopecurus myosuroides*) en hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*).
Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1 l/ha.

- Raaigras (*Lolium* spp.), wilde haver (*Avena fatua*), windhalm (*Apera spica-venti*) en graanopslag (*volunteers of cereals*).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1,5 l/ha.

Aantal toepassingen: 1.

Wachtijd voor de oogst: 90 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Winterkoolzaad en raapzaad

Toepassingsstadium: voor de winter.

Ter bestrijding van:

- Duist (*Alopecurus myosuroides*) en hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*).
Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1 l/ha.

- Raaigras (*Lolium* spp.), wilde haver (*Avena fatua*), windhalm (*Apera spica-venti*) en graanopslag (*volunteers of cereals*).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1,5 l/ha.

Aantal toepassingen: 1.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Tagetes (aaltjesbestrijding (vierbladstadium))

Toepassingsstadium: 4 bladeren ontvouwen (BBCH 14).

Ter bestrijding van:

- Doorlevende grasachtige onkruiden (*Poaceae* (*perennial*)).

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19–49).
Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

- Duist (*Alopecurus myosuroides*) en hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*).
Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1 l/ha.

- Kweekgras (*Agropyron repens*).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).

Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

- Raaigras (*Lolium* spp.), wilde haver (*Avena fatua*), windhalm (*Apera spica-venti*) en graanopslag (*volunteers of cereals*).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1,5 l/ha.

Aantal toepassingen: 1.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Sierplanten, sierbomen en -heesters

Ter bestrijding van:

- Doorlevende grasachtige onkruiden (*Poaceae* (*perennial*)).

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19–49).

Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

- Duist (*Alopecurus myosuroides*) en hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1 l/ha.

- Kweekgras (*Agropyron repens*).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).

Dosis: 3 l/ha, eventueel in 2 toepassingen van 1,5 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

- Raaigras (*Lolium* spp.), wilde haver (*Avena fatua*), windhalm (*Apera spica-venti*) en graanopslag (*volunteers of cereals*).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).
Dosis: 1,5 l/ha.

Aantal toepassingen: 1.

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking(en):

max. 375 g fluaizifop-p-butyl/ha/12 maanden.

Waarschuwingen:

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): /

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Waarschuwing: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

UITBREIDING VAN DE TOELATING VOOR KLEINE TOEPASSINGEN (in toepassing van Artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1107/2009).

Voor de volgende toepassingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Omdat er slechts beperkte werkzaamheids- en fytotoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

Kekererwten / kikkererwten (drooggeogst, open lucht)

Toepassingsstadium: ≤ BBCH 59 (eerste kroonbladeren zichtbaar, bloem nog gesloten).

Aantal toepassingen: 1.

Toepassingstechniek: bespuiting.

Wachtijd voor de oogst: 90 dagen.

Opmerkingen:

– max. 375 g fluazifop-p-butyl/ha/12 maanden.

– max. 3 l/ha/teelt.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

– Ter bestrijding van: doorlevende grasachtige onkruiden (Poaceae (perennial)).

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19–49).

Dosis: 3 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

Opmerking: als gefractioneerde dosis: 2 toepassingen van 1,5 l/ha.

– Ter bestrijding van: duist (Alopecurus myosuroides) en hanenpoot (Echinochloa crus-galli).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).

Dosis: 1 l/ha.

– Ter bestrijding van: kweekaras (Agropyron repens).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).

Dosis: 3 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

Opmerking: als gefractioneerde dosis: 2 toepassingen van 1,5 l/ha.

– Ter bestrijding van: raigras (Lolium spp.), wilde haver (Avena fatua), windhalm (Apera spica-venti) en graanopslag.

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).

Dosis: 1,5 l/ha.

Goudsbloem (niet voor consumptie) (open lucht)

Toepassingsstadium: na opkomst.

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing/teelt.

Toepassingstechniek: bespuiting.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking: max. 375 g fluazifop-p-butyl/ha/12 maanden.

Waarschuwing: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

– Ter bestrijding van: duist (Alopecurus myosuroides) en hanenpoot (Echinochloa crus-galli).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).

Dosis: 1 l/ha.

– Ter bestrijding van: raigras (Lolium spp.), wilde haver (Avena fatua), windhalm (Apera spica-venti) en graanopslag.

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).

Dosis: 1,5 l/ha.

Eetbare bloemen (open lucht)

Toepassingsstadium: na opkomst.

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing/teelt.

Toepassingstechniek: bespuiting.

Wachtijd voor de oogst: 35 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking: max. 375 g fluazifop-p-butyl/ha/12 maanden.

Waarschuwing: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

– Ter bestrijding van: duist (Alopecurus myosuroides) en hanenpoot (Echinochloa crus-galli).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).

Dosis: 1 l/ha.

– Ter bestrijding van: raigras (Lolium spp.), wilde haver (Avena fatua), windhalm (Apera spica-venti) en graanopslag.

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).

Dosis: 1,5 l/ha.

Deder (open lucht)

Toepassingsstadium: na opkomst.

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing/teelt.

Toepassingstechniek: bespuiting.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking: max. 375 g fluazifop-p-butyl/ha/12 maanden.

– Ter bestrijding van: duist (Alopecurus myosuroides) en hanenpoot (Echinochloa crus-galli).

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).

Dosis: 1 l/ha.

– Ter bestrijding van: raigras (Lolium spp.), wilde haver (Avena fatua), windhalm (Apera spica-venti) en graanopslag.

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11–14).

Dosis: 1,5 l/ha.

Bijzondere toepassingsvoorwaarden

– SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

– SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 1.

– SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuit/loeistof is opgedroogd.

– SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

– De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

– Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloestofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

– De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behan-

deld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Bereiding van de spuitoplossing

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder al mengende met water aanvullen

Algemene voorschriften

- Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.
- Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

Behandelen van de lege verpakkingen en de spuitoverschotten.

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproei-toestel geplaatst is. Het bekomen spoel-water moet in de sproeitank worden gegoten.

De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamel-punt. De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitstof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Eerste-hulpmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden P301 NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkklemt niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts:

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245

Waarborg

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.



Propriétés et mode d'action

FUSILADE MAX® est un herbicide sélectif utilisé en post-lévéé sur les graminées annuelles et vivaces.

FUSILADE MAX® est absorbé par les feuilles des mauvaises herbes et est transporté à toutes les parties des plantes, y compris les racines. FUSILADE MAX® peut être mélangé avec la plupart des herbicides de post-émergence agréés en culture de betteraves. En général il, est conseillé d'attendre une semaine entre un traitement de FUSILADE MAX® et un traitement contre les mauvaises herbes dicotylées

Usages et doses d'emploi

Pour un bon contrôle des mauvaises herbes, il est recommandé d'appliquer FUSILADE MAX® le plus tôt possible, lorsque les mauvaises herbes sont en pleine croissance, dans des conditions de temps assez chaud et avec une humidité du sol suffisante. Le contrôle des mauvaises herbes peut être réduit dans des conditions sèches.

Utilisez max 375 g fluaizifop-P-butyl/ha/12 mois.

Max. 2 applications/12 mois.

Méthode d'application : pulvérisation

Localisation du traitement : plein air

Arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers et griottiers, pruniers)

Pour lutter contre:

- Graminées vivaces (Poaceae (perennial)).

Stade d'application: adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49).

Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).

- Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides) et panic pied-de-coq (Echinochloa crus-galli).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 1 l/ha.

- Chiendent (Agropyron repens).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).

- Ray-grass (Lolium spp.), folle avoine (Avena fatua), jouet de vent (Apera spica-venti) et repousses de céréales (volunteers of cereals).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 1,5 l/ha.

Nombre d'applications: 1.

Délai avant la récolte: 28 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Vignes (production de vin et raisins de table)

Pour lutter contre:

- Graminées vivaces (Poaceae (perennial)).

Stade d'application: adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49).

Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).

- **Vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*).**
Stade d'application : adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 1 l/ha.
- **Chiendent (*Agropyron repens*).**
Stade d'application : adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).
- **Ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*), jouet de vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales (*volunteers of cereals*).**
Stade d'application : adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 1,5 l/ha.

Nombre d'applications: 1.

Délai avant la récolte: 28 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Fraisiers (champ de production et champ de sélection et de multiplication)

Stade d'application pour les champs de production: avant la floraison et après la récolte.

Stade d'application pour les champs de sélection et de multiplication: avant la floraison et des pousses latérales commencent à se former – les anciennes feuilles sont desséchées et mortes (BBCH 91–97).

Pour lutter contre:

- **Graminées vivaces (*Poaceae (perennial)*).**
Stade d'application : adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19–49).
Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).
- **Vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*).**
Stade d'application : adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 1 l/ha.
- **Chiendent (*Agropyron repens*).**
Stade d'application : adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).
- **Ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*), jouet de vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales (*volunteers of cereals*).**
Stade d'application : adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 1,5 l/ha.

Nombre d'applications: 1.

Délai avant la récolte: 42 jour(s)

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Arbustes fruitiers: ronces (mûres), framboisiers, groseilliers (blancs, rouges, cassis), groseilliers à maquereau et hybrides:

Stade d'application: avant la floraison et après la récolte.

Pour lutter contre:

- **Graminées vivaces (*Poaceae (perennial)*).**
Stade d'application : adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19–49).
Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut

être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).

- **Vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*).**
Stade d'application : adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 1 l/ha.
 - **Chiendent (*Agropyron repens*).**
Stade d'application : adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).
 - **Ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*), jouet de vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales (*volunteers of cereals*).**
Stade d'application : adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 1,5 l/ha.
- Nombre d'applications: 1.
Méthode d'application : pulvérisation
Délai avant la récolte: 45 jours pour les ronces et les framboisiers; 90 jours pour les groseilliers.
Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Culture de légumes:

- **Betterave rouge et jaune, panais, céleri-raves, radis, radis noir et radis rave, chou-navet, rutabaga, navet, scorsonère, raifort, culture des racines de witloof, ail, oignons (récolté sec), échalote**
- avant la floraison: haricot vert (récolté frais, avec cosse), pois récoltés secs (sans cosse), pois fourragers (récoltés secs), fèves et féveroles (récoltés sèches), petit pois (sans cosse), pois verts (avec cosse) (mange-tout).

Pour lutter contre:

- **Graminées vivaces (*Poaceae (perennial)*).**
Stade d'application : adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19–49).
Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).
 - **Vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*).**
Stade d'application : adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 1 l/ha.
 - **Chiendent (*Agropyron repens*).**
Stade d'application : adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).
 - **Ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*), jouet de vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales (*volunteers of cereals*).**
Stade d'application : adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 1,5 l/ha.
- Nombre d'applications: 1.
Nombre maximal d'applications: 2 applications/culture.
- Délai avant la récolte:
- 28 jours: ail, oignons (récolté secs), échalote, haricot vert (récolté frais, avec cosse), pois verts (avec cosse) (mange-tout).
 - 35 jours: petit pois (sans cosse).

- 56 jours: betterave rouge et jaune, panais, céleri-raves, radis, radis noir et radis rave, chou-navet, rutabaga, navet, scorsonère, raifort, culture des racines de witloof.

- 90 jours: pois récoltés secs (sans cosse), pois fourragers (recoltés secs), fèves et féveroles (recoltées sèches).

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Culture de légumes et d'herbes aromatiques:

- Carottes, laitues, endives, radicchio rosso, pain de sucre, épinard, bette (blette), asperge, céleri (à côtes, blanc et vert), fenouil, roquette.

- Aneth, angélique, cerfeuil, céleri à couper, coriandre, livèche, persil, (consommation des feuilles et/ou tiges).

Pour lutter contre:

- Vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 1 l/ha.

- Ray-grass (*Lolium* spp.), folle avoine (*Avena fatua*), jouet de vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales (*volunteers of cereals*).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 1,5 l/ha.

Nombre d'applications: 1.

Nombre maximal d'applications: 1 application/culture.

Délai avant la récolte:

- 35 jours: épinard, bette (blette), aneth, angélique, cerfeuil, céleri à couper, coriandre, livèche, persil, (consommation des feuilles).

Remarque: pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

- 42 jours: laitues, endives, radicchio rosso, pain de sucre, asperge, céleri (à côtes, blanc et vert), fenouil, roquette.

- 56 jours: carottes.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Soja (récolté sec)

Stade d'application: feuille trifoliolée, insérée sur le 2ème noeud, est étalée - cinquième pousse latérale de 1er ordre visible (BBCH 12-25).

Pour lutter contre:

- Vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 1 l/ha.

- Ray-grass (*Lolium* spp.), folle avoine (*Avena fatua*), jouet de vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales (*volunteers of cereals*).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 1,5 l/ha.

Nombre d'applications: 1.

Nombre maximal d'applications: 1 application/culture.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Betteraves sucrières, betteraves fourragères, chicorée (plein air)

Pour lutter contre:

- Graminées vivaces (*Poaceae* (*perennial*)).

Stade d'application: adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49).

Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).

- Vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 1 l/ha.

- Chiendent (*Agropyron repens*).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).

- Ray-grass (*Lolium* spp.), folle avoine (*Avena fatua*), jouet de vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales (*volunteers of cereals*).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 1,5 l/ha.

Nombre d'applications: 1.

Nombre maximal d'applications: 2 applications/culture.

Délai avant la récolte: 56 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Lin de printemps

Stade d'application: max. 45 cm d'hauteur.

Pour lutter contre:

- Vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 1 l/ha.

- Ray-grass (*Lolium* spp.), folle avoine (*Avena fatua*), jouet de vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales (*volunteers of cereals*).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 1,5 l/ha.

Nombre d'applications: 1.

Nombre maximal d'applications: 1 application/culture.

Délai avant la récolte: 90 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Colza d'hiver et navette

Stade d'application: avant l'hiver.

Pour lutter contre:

- Vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 1 l/ha.

- Ray-grass (*Lolium* spp.), folle avoine (*Avena fatua*), jouet de vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales (*volunteers of cereals*).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 1,5 l/ha.

Nombre d'applications: 1.

Nombre maximal d'applications: 1 application/culture.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Tagètes anti-nématodes

Stade d'application: la quatrième feuille s'étale (BBCH 14).

Pour lutter contre:

- **Graminées vivaces (*Poaceae (perennial)*)**.
Stade d'application: adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19–49).
Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).
 - **Vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*)**.
Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 1 l/ha.
 - **Chiendent (*Agropyron repens*)**.
Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).
 - **Ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*), jouet de vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales (*volunteers of cereals*)**.
Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 1,5 l/ha.
- Nombre d'applications: 1.
Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.
Avertissements:
- Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur l'(les) espèce(s) suivant(es): /
 - Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.

Plantes ornementales et arbres et arbustes ornementaux

Pour lutter contre:

- **Graminées vivaces (*Poaceae (perennial)*)**.
Stade d'application: adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19–49).
Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).
 - **Vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*)**.
Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 1 l/ha.
 - **Chiendent (*Agropyron repens*)**.
Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 3 l/ha, éventuellement en 2 applications de 1,5 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).
 - **Ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*), jouet de vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales (*volunteers of cereals*)**.
Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).
Dose: 1,5 l/ha.
- Nombre d'applications: 1.
Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.
Avertissements:
- Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur l'(les) espèce(s) suivant(es): /
 - Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.

EXTENSION DE L'AUTORISATION POUR DES USAGES MINEURS (en application de l'article 51 du Règlement (CE) No 1107/2009)

L'usage du produit pour les applications suivantes tombe sous la responsabilité de l'utilisateur.

En raison du nombre limité de données évaluées concernant l'efficacité et la phytotoxicité, il est conseillé d'effectuer un test avant l'utilisation du produit.

Pois chiche (recoltés sèches plein air)

Stade d'application: ≤ BBCH 59 (les premiers pétales floraux sont visibles, la fleur est encore fermée).

Nombre d'applications: 1.

Méthode d'application: pulvérisation.

Délai avant la récolte: 90 jours.

Remarques:

- max. 375 g fluzifop-p-butyl/ha/12 mois.

- max. 3 l/ha/culture.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

- Pour lutter contre: **graminées vivaces (*Poaceae (perennial)*)**.

Stade d'application: adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19–49).

Dose: 3 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).

Remarque: si doses fractionnées: 2 applications de 1,5 l/ha.

- Pour lutter contre: **vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*)**.

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).

Dose: 1 l/ha.

- Pour lutter contre: **chiendent (*Agropyron repens*)**.

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).

Dose: 3 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).

Remarque: si doses fractionnées: 2 applications de 1,5 l/ha.

- Pour lutter contre: **ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*), jouet de vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales**.

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).

Dose: 1,5 l/ha.

Souci (pas pour la consommation, plein air)

Stade d'application: post-émergence.

Nombre maximal d'applications: 1 application/culture.

Méthode d'application: pulvérisation.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Avertissement: Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque: max. 375 g fluzifop-p-butyl/ha/12 mois.

- Pour lutter contre: **vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*)**.

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).

Dose: 1 l/ha.

- Pour lutter contre: **ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*), jouet de vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales**.

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).

Dose: 1,5 l/ha.

Fleurs comestibles (plein air)

Stade d'application: post-émergence.

Nombre maximal d'applications: 1 application/culture.

Méthode d'application: pulvérisation.

Délai avant la récolte: 35 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Avertissement: Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque: max. 375 g fluzifop-p-butyl/ha/12 mois.

– **Pour lutter contre:** vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).

Dose: 1 l/ha.

– **Pour lutter contre:** ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*), jouet du vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales.

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).

Dose: 1,5 l/ha.

Caméline (plein air)

Stade d'application: post-émergence.

Nombre maximal d'applications: 1 application/culture.

Méthode d'application: pulvérisation.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Remarque: max. 375 g fluzifop-p-butyl/ha/12 mois.

– **Pour lutter contre:** vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*) et panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*).

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).

Dose: 1 l/ha.

– **Pour lutter contre:** ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*), jouet du vent (*Apera spica-venti*) et repousses de céréales.

Stade d'application: adventices peu développées (BBCH 11–14).

Dose: 1,5 l/ha.

Conditions particulières d'application

– SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

– SPa1 : Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 1.

– SPo : Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

– SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

– La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

– Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits hytopharmaceutiques.

– Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

Préparation de la bouillie

Remplir la cuve à moitié d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter, en mélangeant, la cuve avec la quantité d'eau nécessaire.

Mesures de précaution

– Il est recommandé de rincer correctement le pulvérisateur avec de l'eau après le traitement.

– **Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.**

Traitement des emballages vides et des surplus de traitements

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau manuellement (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de rinçage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Conseils de premiers secours

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau.

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarques pour le médecin: /

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

Garantie

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant aux résultats insuffisants et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur assume seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.



FUSILADE MAX®

HRAC 1 HERBICIDE

Selectief herbicide in na-opkomst voor de bestrijding van zowel eenjarige als meerjarige grassen in land- en tuinbouw en sierteelt. Herbicide sélectif en post-lèevèe pour le contrôle des graminées annuelles et vivaces en agriculture, en horticulture et en floriculture.

Toelatingsnummer / Numéro d'autorization: 9476P/B

Numéro d'agrément (Lux): L01664-123

Werkzame stof / Substance active: fluzifop-P-butyl

Gehalte / Teneur: 125 g/l

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

Formuleringsstype / Type de formulation:

(EC) Emulgeerbaar concentraat / Concentré émulsionnable.

Lotnummer / Numéro de lot: zie verpakking / voir emballage

FUSILADE MAX UFI: SERX-P68Y-PEAK-UD1E

	Gevarenaanduidingen	Mentions de danger
H361d	Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.	Susceptible de nuire au fœtus.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Veiligheidsaanbevelingen		Conseils de prudence
P263	Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.	Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.
P280	Beschermende handschoenen, beschermende kleding en geluftsbescherming dragen.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.	Recueillir le produit répandu.
P308+P313	NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Andere etiketelementen		Autres mentions
EUH 401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
EUH 208	Bevat fluzifop-P-butyl. Kan een allergische reactie veroorzaken.	Contient fluzifop-P-butyl. Peut produire une réaction allergique.



*: Geregistreerd handelsmerk van / Marque enregistrée de Nufarm

5Le

510001441_092025

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Netherlands
Tel.: +31 10 303 77 25
www.nufarm.com/be



www.agrirecover.eu



SPECIMEN