

maxcel



GROEIREGULATOR / RÉGULATEUR DE CROISSANCE

Groeiregulator voor appels en peren. Régulateur de croissance pour pommes et poires.

Met water mengbaar concentraat op basis van 6-benzyladenine: 20 g/l (actieve stof)
Concentré soluble à base de 6-benzyladénine: 20 g/l (substance active)
Toelatingsnummer / Numéro d'autorization: 10268P/B

5 L



SUMITOMO CHEMICAL



Grow a better tomorrow

Distributeur :
Nufarm B.V.

Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Nederland
Tel.: 0031-10-8037725
www.nufarm.com/be

**Toelatinghouder en verpakker / Détenteur de
l'autorisation et emballageur :**

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
10A Rue de la Voie Lactée
69570 Saint-Dolier au Mont d'Or - France
Tel: +33 (0)4 78 64 32 57

**Vóór het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen. /
Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.**

Lotnummer / N° de lot: zie verpakking / voir emballage



08720364282653

**UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK /
EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL**

Geedeponneerd handelsmerk / Marque déposée Valent BioSciences LLC, USA

510010042_082024

F130000490A-0925

Groeiregulator voor appels en peren.

Régulateur de croissance pour pommes et poires.

Met water mengbaar concentraat op basis van 6-benzyladenine 20 g/l (1,9% w/w)

Concentré soluble à base de 6-benzyladénine 20 g/l (1,9% w/w)

Toelatingsnummer / Numéro d'autorization: 10268P/B

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Veiligheidsaanbevelingen

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 P280 Beschermende handschoenen en beschermende kledij dragen.

Andere etiketelementen

- EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
 EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Conseils de prudence

- P102 Tenir hors de portée des enfants.
 P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
 P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

Informations additionnelles sur les dangers (phrases EUH)

- EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
 EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

UFI NM10-CORA-6000-RU02



510010041_092025

F130000490C-0925

Nufarm
Grow a better tomorrow

MAXCEL® - EIGENSCHAPPEN EN WERKING

MaxCel® is een vruchtdunningsmiddel bij appels en peren.

TOEPASSINGSTIJDSTIP EN DOSERINGEN

TOEPASSINGSSTADIUM:

MaxCel® toepassen tot de diameter van de vruchten 10 mm is, val van de vruchten na de bloei (BBCH 71).

De behandeling uitvoeren op een droog gewas bij een temperatuur van tenminste 18°C en met vooruitzicht op droog weer na de behandeling. Helder weer en een hoge relatieve luchtvochtigheid bevorderen de werking.

Ter bestrijding van: overvloedige vruchtzetting.

Dosis: 5 l/ha haag.

Aantal toepassingen: 1.

Toepassingstechniek: bespuiting.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek.

Opmerking: MaxCel® bij voorkeur alleen spuiten.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- ⊘ SPI: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- ⊘ SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- ⊘ SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- ⊘ De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn (en) te verkorten.
- ⊘ Draag steeds basisbeschermingskleding die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkleding vereist is), chemisch bestendige hard schoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
- ⊘ Fytoxiciteit is niet uit te sluiten. De variëteiten die al dan niet kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder/vergunningshouder.

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder al mengende met water aanvullen.

Behandelen van de lege verpakkingen en de spuitoverschotten De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproei toestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproei tank gegoten worden.

De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelput.

De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspreiden op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften.

Nijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking.

De verpakking mag in geen enkel geval herbruikt worden voor andere doeleinden.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

⊘ Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.

Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

Aanwijzingen betreffende de eerste hulp

Na Inademen

Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Na spatten in de ogen:

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerste de lenzen, spoel daarna. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Na inslikken:

Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Na morsen op kleren en huid:

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten.

Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

OPMERKINGEN VOOR DE ARTS

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070 245 245) voor verdere behandeling in het hospitaal.

MAXCEL® - PROPRIÉTÉS ET MODE D'ACTION

MaxCel® est un produit pour favoriser l'éclaircissage des fruits sur pommiers et poitiers.

USAGES ET DOSES D'EMPLOI

STADE D'APPLICATION :

Appliquer MaxCel® jusqu'à ce que les fruits ont un diamètre de 10 mm, chute des fruits après floraison (BBCH7).

Effectuer le traitement sur des arbres secs alors que la température est au moins de 16°C. Ne pas traiter par risque de pluie. Un ciel dégagé et une forte humidité relative favorisent l'action du produit.

Pour lutter contre : fructification excessive (*Excessive fruit formation*).

Dose : 5 l/ha haie.

Nombre d'applications : 1.

Méthode d'application : pulvérisation.

Zone tampon minimale de 3 m par rapport aux eaux de surface.

Remarque : Il est conseillé d'appliquer MaxCel® en pulvérisation séparée.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

- SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

- SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

- SPo : Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

- De la phytotoxicité ne peut pas être exclue. Les variétés qui peuvent ou qui ne peuvent pas être traitées sont mentionnées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE

Remplir la cuve à moitié d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter, en mélangeant, la cuve avec la quantité d'eau nécessaire.

TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET LES SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau manuellement (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de rinçage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

MESURES DE PRÉCAUTION

- Il est recommandé de rincer correctement le pulvérisateur avec de l'eau.
- Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

Inhalation

Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Contact avec la peau

Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Projection dans les yeux

Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer.

En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

REMARQUES POUR LE MÉDECIN

Prise en charge : traitement symptomatique.

Contacter le Centre Antipoisons (070 245 245) pour le traitement en milieu hospitalier.

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous nous déclinons par conséquent toute responsabilité quand aux résultats insuffisants et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur assume seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

Groeiregulator voor appels en peren.

Régulateur de croissance pour pommes et poires.

Met water mengbaar concentraat op basis van 6-benzyladenine 20 g/l (1,9% w/w)

Concentré soluble à base de 6-benzyladénine 20 g/l (1,9% w/w)

Toelatingsnummer / Numéro d'autorization: 10268P/B

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Veiligheidsaanbevelingen

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P280 Beschermende handschoenen en beschermende kledij dragen.

Andere etiketelementen

- EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Conseils de prudence

- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

Informations additionnelles sur les dangers (phrases EUH)

- EUH210 Fiché de données de sécurité disponible sur demande.
- EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

UFI NM10-CORA-6000-RU0E



08720364282653



510010041_092025

F130000490C-0925