

TARGA® MEGAMAX

HRAC 1 HERBICIDE



Grassenbestrijder

Voor de bestrijding van grassen in na-opkomst in de teelt in open lucht van koolzaad, aardappelen, erwit, veldbonen, sorschoneer, ui, sjalot, wortelen, wilfoofwortelen, mierikswortel, rode biet, koolraap, raap, knolselder, wortelpeterselie (consumptie van de wortel), pastinaak, knoflook, radijs, rammenas en rietlich, pootaardappelen, aardbeien, bieten, chichorei, zomervlas en kerstparanen.

Graminicide

Pour la destruction des graminées en post-émergence, dans les cultures en plein air de colza, pomme de terre, pois, fève, féverole, sorschoneer, oignons, échalote, carotte, racines de wilfoof, railfort, betterave rouge, chou-navet, rutabaga, navet, céleri-raves, persil à grosses racines (consommation de la racine), panais, ail, radis, radis noir et radis rave, lin de printemps, betteraves, chicorée, fraisiers, cultures de plants de pommes de terre et sapin de Noël.

TARGA® MEGAMAX UFI: 14D1-WU53-100X-8WV

Toelatingsnummer: 10256P/B

Werkzame stof: 50 g/L quazolop-P-ethyl

Formuleringstype: emulgeerbaar concentraat

Lothummer: zie verpakking

Formuleringshulpstoffen: dodecan-1-ol, geëthoxyleerd (CAS: 9002-92-0),

solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch (CAS: 64742-94-5)

Numéro d'autorisation: 10256P/B

N° d'agrément au G.-D. Lux.: L01766-124

Ingédient active: 50 g/L quazolop-P-Éthyle

Type de formulation: Concentré émulsionnable

N° de lot: voir emballage

Cofomulants: dodécane-1-ol, éthoxylé (CAS: 9002-92-0), solvant napha aromatique lourd (pétrole) (CAS: 64742-94-5)

UITSLUTEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.	Provoque une irritation cutanée.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.	Provoque de graves lésions des yeux.
H332	Schadelijk bij inademing	Nocif par inhalation.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411	Giffig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Toxique pour les organismes aquatiques, entraînant des effets néfastes à long terme.
P261	Inademing van damp en spuitnevel vermijden.	Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ geaatsbescherming dragen.	Porter des gants de protection / des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux et du visage.
P391	Gelekte/gemorstte stof opruimen.	Récupérer le produit répandu.
P301+P330+P331	NA INSLUKKEN: mond spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk een ANTI-GIFCENTRUM of een arts raadplegen.	EN CAS D'INGESTION: Rinçer la bouche. NE PAS faire vomir et appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
P304+P340	NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.	EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P403+P233	Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
EUH 401	Volg de gebruiksaanwijzing om schade voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
EUH 066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau.

*: Geregistreerd handelsmerk / Marque enregistrée.

Toelatingshouder / détenteur de l'autorisation:
NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S.
18 Chemin des Cuers
69570 Dardilly
FRANCE / FRANKRIJK
Tel. 00 4 37 64 40 22.



www.agrirecover.eu



5 L

500003432_102025

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Nederland
Tel.: 0031-10-3037725
www.nufarm.com/be



Gevaar
Danger

Nufarm
Grow a better tomorrow

EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE

Targa® Megamax is een selectief naopkomst-herbicide voor de bestrijding van éénjarige en doorlevende grassen. **Targa® Megamax** wordt opgenomen door de bladeren en via de sapstroom getransporteerd naar zowel de bovengrondse als de ondergrondse groeispunten, waar het de verdere groei van de grassen belet. Groeizaam weer tijdens de bespuiting zal de opname en de werking verbeteren.

Toepassingen en doseringen

Aardbeienplanten (productie, selectie- en vermeerderingsveld), rammenas en retlich, knoflook, uien (drooggeogste), witloofwortelteelt, drooggeogste erwten (zonder peul), groengeogste erwten (zonder peul), voedererwten (drooggeogst), vicia-bonen (paarden-, duiven, tuin,...) (drooggeogst), vicia-bonen (paarden-, duiven, tuin,...) (groengeogst, zonder peul), aardappelen, cichorei, zomervlas, winterkoolzaad en raapzaad, zomer-koolzaad en raapzaad, aardappelpootgoedteelt.

- Dosis ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*), hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*) en windhalm (*Apera spica-venti*)

1 - 1,5 l/ha, 1 l/ha (vroeg stadium van de onkruiden) - 1,5 l/ha (meer ontwikkelde onkruiden)

- Dosis ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)

3 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijft)

Opmerking: in fractionering: 2 toepassingen van 1,5 l/ha

- Dosis ter bestrijding van: wilde haver (*Avena fatua*) en graanopslag (*volunteers of cereals*)

Dosis: 1,25 - 1,5 l/ha

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19): knoflook, rammenas en retlich

Aantal toepassingen: 1 in menging met: een paraffine-olie, versterkt met een al dan niet ionische uitvloeier.

Toepassingsstadium: na opkomst

Locatie van de behandeling: open lucht

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Toepassingstechniek: bespuiting

Risicobepalende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

- De aangegeven lagere dosissen mogen niet toegepast worden op zware bodems en/of wanneer er gevaar voor

resistentie dreigt.

Wachttijd voor de oogst:

28 dagen: knoflook, uien (drooggeogste), sjalot, witloofwortelteelt,

35 dagen: rammenas en retlich, groengeogste erwten (zonder peul), vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin,...) (groengeogst, zonder peul).

45 dagen: drooggeogste erwten (zonder peul), groengeogste erwten (met peul), voedererwten (drooggeogst), vicia-bonen (paarden-, duiven, tuin,...) (drooggeogst), aardappelen, aardappelpootgoedteelt.

60 dagen: Aardbeienplanten (productie, selectie- en vermeerderingsveld), cichorei.

90 dagen: Zomervlas, winterkoolzaad en raapzaad, zomer-koolzaad en raapzaad.

Suikerbieten en voederbieten

- Dosis ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*), hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*) en windhalm (*Apera spica-venti*)

1 - 1,5 l/ha, 1 l/ha (vroeg stadium van de onkruiden) - 1,5 l/ha (meer ontwikkelde onkruiden, maar voor de uitstoeiing) (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijft).

Opmerking: in fractionering: 2 toepassingen van 0,25 l/ha, op weinig ontwikkelde onkruiden (maximum 1 - 2 bladeren).

- Dosis ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)

3 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijft)

Opmerking: in fractionering: 2 toepassingen van 1,5 l/ha

- Dosis ter bestrijding van: wilde haver (*Avena fatua*) en graanopslag (*volunteers of cereals*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19)

Dosis: 1,25 - 1,5 l/ha

Opmerking: in fractionering: 2 toepassingen van 0,4 l/ha, op weinig ontwikkelde onkruiden (maximum 1 - 2 bladeren).

Aantal toepassingen: 1 in menging met: een paraffine-olie, versterkt met een al dan niet ionische uitvloeier.

Toepassingsstadium: na opkomst

Locatie van de behandeling: open lucht

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Toepassingstechniek: bespuiting

Risicobepalende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerkingen:

- De aangegeven lagere dosissen mogen niet toegepast worden op zware bodems en/of wanneer er gevaar voor resistentie dreigt.

Wachttijd voor de oogst:

60 dagen: suikerbieten

110 dagen: voederbieten

UITBREIDING VAN DE TOELATING VOOR KLEINE TOEPASSINGEN (in toepassing van Artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1107/2009).

Voor deze uitbreidingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheids- en fytotoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

Rode biet (*kroten*), wortelen, pastinaak, knolselder, radijs, schorseneren, koolrapen, raap (*stoppelraap, meiraap*), mierikswortel, wortelpeterselie en wortelkervel (*consumptie wortels*),

- Dosis ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*), hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*) en windhalm (*Apera spica-venti*)

1 - 1,5 l/ha, 1 l/ha (*vroeg stadium van de onkruiden*) - 1,5 l/ha (*meer ontwikkelde onkruiden*)

- Dosis ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)
3 l/ha (*mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt*)

Opmerking: in fractionering: 2 toepassingen van 1,5 l/ha

- Dosis ter bestrijding van: wilde haver (*Avena fatua*) en graanopslag (*volunteers of cereals*)

Dosis: 1,25 - 1,5 l/ha

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19): rode biet (*kroten*), pastinaak, knolselder, radijs, koolrapen, raap (*stoppelraap, meiraap*), mierikswortel, wortelpeterselie en wortelkervel (*consumptie wortels*),

Aantal toepassingen: 1 in menging met: een paraffine-olie, versterkt met een al dan niet ionische uitvloeier.

Toepassingsstadium: na opkomst

Locatie van de behandeling: open lucht

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Toepassingstechniek: bespuiting

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

- De aangegeven lagere dosissen mogen niet toegepast worden op zware bodems en/of wanneer er gevaar voor resistentie dreigt.

Wachttijd voor de oogst:

28 dagen: Mierikswortel, wortelpeterselie en wortelkervel (*consumptie wortels*),

35 dagen: Radijs, raap (*stoppelraap, meiraap*),

40 dagen: Wortelen, pastinaak

45 dagen: Knolselder

60 dagen: Rode biet (*kroten*), koolrapen

Kerstsparren

- Dosis ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*), hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*) en windhalm (*Apera spica-venti*)

1 - 1,5 l/ha, 1 l/ha (*vroeg stadium van de onkruiden*) - 1,5 l/ha (*meer ontwikkelde onkruiden*)

- Dosis ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)

3 l/ha (*mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt*)

Opmerking: in fractionering: 2 toepassingen van 1,5 l/ha

- Dosis ter bestrijding van: wilde haver (*Avena fatua*) en graanopslag (*volunteers of cereals*)

Dosis: 1,25 - 1,5 l/ha

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19)

Aantal toepassingen: 1 in menging met: een paraffine-olie, versterkt met een al dan niet ionische uitvloeier.

Toepassingsstadium: bij het hernemen van de groei

Locatie van de behandeling: open lucht

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Toepassingstechniek: bespuiting

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): /.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Opmerking:

- De aangegeven lagere dosissen mogen niet toegepast worden op zware bodems en/of wanneer er gevaar voor resistentie dreigt.

Wachttijd voor de oogst: 28 dagen

Bijzondere toepassingsvoorwaarden

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1: Om de ontwikkeling van resistentie te voorkomen, moet het gebruik van dit product worden afgewisseld met andere producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC-code voor de werkingswijze van het werkzame bestanddeel in dit product is 1.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn (en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Bereiding van de spuitoplossing

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder al mengende met water aanvullen.

Aanbevolen hoeveelheid water: 400 L/ha

Behandelen van de lege verpakkingen en de spuitoverschotten

De zorgvuldig geleidigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproei toestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden.

De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking.

De verpakking mag in geen enkel geval herbruikt worden voor andere doeleinden.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Algemene voorschriften

- Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.
- Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

Aanwijzingen betreffende de eerste hulp

- Na morsen op kleren en huid: de verontreinigde kledij uit-trekken; de huid grondig wassen met water.
- Na spatten in de ogen: de oogleden goed opensperren en gedurende 15 minuten overloedig spoelen met zacht stromend water. Spoel niet naar het andere oog toe. Bij blijvende pijn of ongemak, een oogarts raadplegen.
- Na overmatig inademen: het slachtoffer uit de besmette omgeving verwijderen. In geval van aanhoudende ademhalingsmoeilijkheden: zuurstoftherapie toepassen
- Na inname: onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen.
- In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

Bij vermoeden van een vergiftiging onmiddellijk een arts waarschuwen en het Antigifcentrum contacteren: tel 070 245 245.

Aanwijzingen voor de geneesheer

Quizalofop-P-ethyl is weinig giftig voor mens en huisdieren. **Targa® Megamax** is irriterend voor de huid en sterk irriterend voor de ogen.

In geval van vergiftiging, moet een symptomatische behandeling worden toegepast.

Het antigifcentrum raadplegen (Tel. 070/245.245)

Waarborg

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de

koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

SPECIMEN

PROPRIÉTÉS ET MODE D'ACTION

Targa® Megamax est un herbicide sélectif de post-émergence pour combattre des graminées annuelles et vivaces.

Targa® Megamax pénètre dans les feuilles, est véhiculé par la sève vers les tissus jeunes aériens et souterrains des graminées dont il perturbe et empêche le développement. L'absorption et l'activité sont favorisées par un temps favorable à la croissance.

Usages et doses d'emploi

Fraisiers, radis noir et radis rave, ail, oignons (récolté sec), échalote, culture de racines de witloof, pois récoltés secs, petit pois (sans cosse), pois verts (avec cosse) (mange-tout), pois fourragers (récoltés secs), fèves et féveroles (récoltées sèches), fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse), betteraves sucrières,

- Pour lutter contre: vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*), panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*), jouet du vent (*Apera spica-venti*)

Dose: 1 - 1,5 l/ha, 1 l/ha (stade jeune des adventices) - 1,5 l/ha (adventices plus développées).

- Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

Dose: 3 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage)

Remarque: en fractionnement: 2 applications de 1,5 l/ha

- Pour lutter contre: folle avoine (*Avena fatua*), repousses de céréales (*volunteers of cereals*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19) (radis noir et radis rave, ail)

Dose: 1,25 - 1,5 l/ha.

Nombre d'applications: 1 En mélange avec: une huile paraffinique renforcée d'un mouillant ionique ou non ionique

Stade d'application: post-émergence

Localisation du traitement: plein air

Nombre maximal d'applications: 1 application(s)/culture

Méthode d'application: pulvérisation

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Remarque(s):

- Les doses réduites ne peuvent pas être appliquées sur des sols lourds et/ou dans le cas où des résistances sont soupçonnées.

Délai avant récolte:

28 jours: Ail, oignons (récolté sec), échalote, culture de racines de witloof

35 jours: Radis noir et radis rave, petit pois (sans cosse)

45 jours: Pois récoltés secs, pois verts (avec cosse) (mange-tout), pois fourragers (récoltés secs), fèves et féveroles (récoltées sèches), fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse),

60 jours: Fraisiers

Betteraves sucrières et betteraves fourragères

- Pour lutter contre: vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*), panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*), jouet du vent (*Apera spica-venti*)

- Dose: 1 - 1,5 l/ha, 1 l/ha (stade jeune des adventices) - 1,5 l/ha (adventices plus développées, mais avant tallage) (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).

Remarque: en fractionnement: 2 applications de 0,25 l/ha, sur graminées peu développées (maximum 1 à 2 feuilles)

- Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

Dose: 3 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage)

Remarque: en fractionnement: 2 applications de 1,5 l/ha

- Pour lutter contre: folle avoine (*Avena fatua*), repousses de céréales (*volunteers of cereals*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19)

Dose: 1,25 - 1,5 l/ha.

Remarque: en fractionnement: 2 applications de 0,4 l/ha, sur graminées peu développées (maximum 1 à 2 feuilles)

Nombre d'applications: 1 En mélange avec: une huile paraffinique renforcée d'un mouillant ionique ou non ionique

Stade d'application: post-émergence

Localisation du traitement: plein air

Nombre maximal d'applications: 1 application(s)/culture

Méthode d'application: pulvérisation

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Remarque(s):

- Les doses réduites ne peuvent pas être appliquées sur des sols lourds et/ou dans le cas où des résistances sont soupçonnées.

Délai avant récolte:

60 jours: Betteraves sucrières

110 jours: Betteraves fourragères

EXTENSION DE L'AUTORISATION POUR DES USAGES MINEURS (en application de l' article 51 du Règlement (CE) No 1107/2009).

L'usage du produit pour ces extensions tombe sous la responsabilité de l'utilisateur. En raison du nombre limité de données évaluées concernant l'efficacité et la phytotoxicité, il est conseillé d'effectuer un test avant l'utilisation du produit.

Betterave rouge, carottes, panais, céleri-raves, radis, scorsonère, navet, raifort, persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux (*consommation de la racine*)

- Pour lutter contre: vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*), panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*), jouet du vent (*Apera spica-venti*)

- Dose: 1 - 1,5 l/ha, 1 l/ha (*stade jeune des adventices*) - 1,5 l/ha (*adventices plus développées*).

- Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

Dose: 3 l/ha (*la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage*)

Remarque: en fractionnement: 2 applications de 1,5 l/ha

- Pour lutter contre: folle avoine (*Avena fatua*), repousses de céréales (*volunteers of cereals*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19)

Dose: 1,25 - 1,5 l/ha.

Nombre d'applications: 1 En mélange avec: une huile paraffinique renforcée d'un mouillant ionique ou non ionique

Stade d'application: post-émergence

Localisation du traitement: plein air

Nombre maximal d'applications: 1 application(s)/culture

Méthode d'application: pulvérisation

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s):

- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ. (raifort, persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux (*consommation de la racine*))

Remarque(s):

- Les doses réduites ne peuvent pas être appliquées sur des sols lourds et/ou dans le cas où des résistances sont soupçonnées.

28 jours: Raifort, persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux (*consommation de la racine*),

35 jours: Radis, navet

40 jours: Carottes

45 jours: Panais, céleri-raves

60 jours: Betterave rouge

65 jours: Scorsonère

Sapins de Noël

- Pour lutter contre: vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*), panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*), jouet du vent (*Apera spica-venti*)

- Dose: 1 - 1,5 l/ha, 1 l/ha (*stade jeune des adventices*) - 1,5 l/ha (*adventices plus développées*).

- Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

- Dose: 3 l/ha (*la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage*).

- Pour lutter contre: folle avoine (*Avena fatua*), repousses de céréales (*volunteers of cereals*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19)

Dose: 1,25 - 1,5 l/ha.

Nombre d'applications: 1 En mélange avec: une huile paraffinique renforcée d'un mouillant ionique ou non ionique

Stade d'application: à la reprise de la croissance

Localisation du traitement: plein air

Nombre maximal d'applications: 1 application(s)/culture

Méthode d'application: pulvérisation

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s):

- Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur l'(es) espèce (s) suivant(es): /.

- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.

Remarque(s):

- Les doses réduites ne peuvent pas être appliquées sur des sols lourds et/ou dans le cas où des résistances sont soupçonnées

Délaï avant la récolte: 28 jours **Conditions particulières d'application**

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

- SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 1.

- SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées

avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

- SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.
- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

Préparation de la bouillie

Remplir la cuve à moitié d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter, en mélangeant, la cuve avec la quantité d'eau nécessaire.

Quantité d'eau recommandée: 400 L/ha

Traitement des emballages vides et les surplus de traitement. L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau manuellement (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de rinçage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Mesures de précaution

- Il est recommandé de rincer correctement le pulvérisateur avec de l'eau.
- **Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.**

Indications concernant les premiers secours

- En cas d'éclaboussures sur les vêtements ou la peau: enlever les vêtements souillés et laver la peau soigneusement à l'eau.
- En cas d'éclaboussures dans les yeux: bien écarter les paupières et rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes. Ne pas verser l'eau vers l'autre oeil. Si l'irritation continue ou en cas de malaise persistant, consulter un oculiste.
- En cas d'inhalation: éloigner le patient de la zone contaminée. En cas de difficultés respiratoires persistantes pratiquer l'oxygénothérapie.
- En cas d'ingestion: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

S'il y a présomption d'empoisonnement, avertir immédiatement un médecin et appeler le Centre Anti-Poisons (070 245 245).

Indications pour le médecin

Le quizalofop-P-éthyl est faiblement toxique pour l'homme et les animaux domestiques. **Targa® Megamax** est irritant pour la peau et sévèrement irritant pour les yeux.

En cas d'intoxication, le traitement sera symptomatique.

Centre Antipoison: 070/245.245

Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 800/25500

Garantie

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous nous déclinons par conséquent toute responsabilité quand aux résultats insuffisants et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur assume seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

SPECIMEN

SPECIMEN

TARGA® MEGAMAX

HRAC 1 HERBICIDE

Grassenbestrijder

Voor de bestrijding van grassen in na-opkomst in de teelt in open lucht van koolzaad, aardappelen, erwit, veldbonen, schorsemer, ui, sjalot, wortelen, wilfoetwortelen, mierikswortel, rode biet, koolraap, raap, knolselder, wortelpeterselie (consumptie van de wortel), pastinaak, knoflook, radijs, rammenas en rietlich, pootaardappelen, aardbeien, bieten, chichorei, zomervlas en kerstperanen.

Graminicide

Pour la destruction des graminées en post-émergence, dans les cultures en plein air de colza, pomme de terre, pois, fève, féverole, scorsonère, oignons, échalote, carotte, racines de wilfoet, rairoot, betterave rouge, chou-navet, rutabaga, navet, céleri-raves, persil à grosses racines (consommation de la racine), panais, ail, radis, radis noir et radis rave, lin de printemps, betteraves, chicorée, fraisiers, cultures de plants de pommes de terre et sapin de Noël.

TARGA® MEGAMAX UFI: 14D1-WU53-100X-8WV

Toelatingsnummer: 10256P/B

Werkzame stof: 50 g/L quizalofop-P-ethyl

Formuleringstype: emulgeerbaar concentraat

Lothummer: zie verpakking

Formuleringshulpstoffen: dodecan-1-ol, géthoxyléerd (CAS: 9002-92-0),

solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch (CAS: 64742-94-5)

Numéro d'autorization: 10256P/B

N° d'agrément au G.-D. Lux: L01766-124

Ingédient active: 50 g/L quizalofop-P-éthyle

Type de formulation: Concentré émulsionnable

N° de lot: voir emballage

Cofomulants: dodécane-1-ol, éthoxylé (CAS: 9002-92-0), solvant napha

aromatique lourd (pétrole) (CAS: 64742-94-5)

UITSLUTEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.	Provoque une irritation cutanée.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.	Provoque de graves lésions des yeux.
H332	Schadelijk bij inademing	Nocif par inhalation.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411	Giflig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Toxique pour les organismes aquatiques, entraînant des effets néfastes à long terme.
P261	Inademing van damp en spuitnevel vermijden.	Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/ geaatsbescherming dragen.	Porter des gants de protection / des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux et du visage.
P391	Gelekte/gemorstte stof opruimen.	Récupérer le produit répandu.
P301+P330+P331	NA INSLUKKEN: mond spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk een ANTI-GIFCENTRUM of een arts raadplegen.	EN CAS D'INGESTION: Rinçer la bouche. NE PAS faire vomir et appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
P304+P340	NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.	EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P403+P233	Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
EUH 401	Volg de gebruiksaanwijzing om schade voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
EUH 066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau.

*: Geregistreerd handelsmerk / Marque enregistrée.

Toelatingshouder / détenteur de l'autorisation:
NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S.
18 Chemin des Cuers
69570 Dardilly
FRANCE / FRANKRIJK
Tel. 00 4 37.64.40.22.



www.agrirecover.eu



5 L

500003432_102025

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Nederland
Tel.: 0031-10-3037725
www.nufarm.com/be



Gevaar
Danger

Nufarm
Grow a better tomorrow

SPECIMEN