

Admiral®

INTEGRATED PEST MANAGEMENT WITH

Insecticide tegen witte vlieg in de sierteelt en de groenteteelt onder bescherming.

Insecticide contre la mouche blanche en cultures ornementales et en cultures maraîchères sous protection.

**Erkenningshouder/
Déporteur d'agrément**

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S

Parc d'affaires de Crécy,
Rue de la Voie Lactée 10A
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
FRANKRIJK/ FRANCE
Tel. 0033 4 78 64 32 57



www.agrirecover.eu

8526-500-L4-0819-01

F130000766A-0819

®: Geregistreerd handelsmerk van / Marque enregistrée de Sumitomo

Nufarm B.V.
Koningsstraat 97 / 4de verdieping
1000 Brussel / Bruxelles
Tel.: 0031 10-3037725
www.nufarm.com/be

500ml

Nufarm
Grow a better tomorrow

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis Pyriproxyfen 100 g/l (11% ww)
Concentré émulsionnable (EC) à base de Pyriproxyfen 100 g/l (11% ww)
Erkenningsnummer / Numéro d'agrément: 8526P/B
Lotnummer / N° de lot: zie verpakking / voir emballage
Voor Professioneel gebruik/ Pour usage professionnel

	Gevaarsaanduidingen	Mentions de danger
H226 H304	Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.	Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 H318 H373	Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.	Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Risques présumés d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
	Veiligheidsaanbevelingen	Conseils de prudence
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P331	GEEN braken opwekken.	NE PAS faire vomir.
P301+ P310	NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / een arts raadplegen.	EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
P280	Beschermende handschoenen, oogbescherming en geluutsbescherming dragen.	Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux et du visage.
P391	Gelekte/gemorstte stof opruimen	Recueillir le produit répandu.
P302+ P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau.
P305+ P351	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501	Inhoud / verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.	Éliminer le contenu/réceptif dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
	Andere etiketelementen	Autres mentions
EUH 401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
EUH 210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Lees aandachtig het etiket voor gebruik/ Lire attentivement l'étiquette avant usage

**Gevaar
Danger**



Eigenschappen en werkwijze

Admiral is een insectengroei regulator, werkt in op de levenscyclus van ei, larve- en popstadium en maakt volwassen witte vliegen steriel.

Toepassing en dosering

Tomaten, aubergine/eierplant en pepino, komkommer, augurk, courgette/patisson (onder bescherming) ter bestrijding van kaswittevlieg en tabakswittevlieg.

Dosis: 0,15 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 9 dagen.

Maximum 2 toepassingen per jaar

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) ter bestrijding van van kaswittevlieg en tabakswittevlieg.

Dosis: 25 ml/100 l water, 1-2 toepassingen met een intereval van 9 dagen

Maximum 2 toepassingen per jaar

Algemene opmerking

Indien geen biologische of geïntegreerde bestrijding beoogd wordt, is het aanbevolen het middel te mengen met een insecticide tegen adulte witte vliegen om een volledige bestrijding te bekomen.

Bijzondere toepassingsvoorwaarden

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op *Encarsia formosa*, *Phytoseiulus persimilis* en *Orius* spp.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.
- De soorten en variëteiten van sierteelten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Bereiding van de spuitplossing

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder al mengende met water aanvullen.

Algemene voorschriften

- Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.
- Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

Behandelen van de lege verpakkingen en de spuitoverschotten.

De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproei-toestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamel-punt.

De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Aanwijzingen betreffende de eerste hulp en voor de geneesheer

Na inademen

Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Na spatten in de ogen:

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlezen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerste de lenzen, spoel daarna.

Raadpleeg onmiddellijk een oogarts en toon het etiket of de verpakking.

Na inslikken:

Spoel de mond. NIET doen braken. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.

Na morsen op de huid:

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Aanwijzingen voor de geneesheer - behandeling

Prehospitaal: Symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer **Het Antigifcentrum: 070/245.245**

Waarborg

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

Propriétés et mode d'action

Admiral est très actif contre les œufs, les larves et les nymphes des mouches blanches et stérilise les insectes adultes.

Usages et doses d'emploi

Tomate, aubergine et pépinois, concombre, cornichon, courgette/patisson (sous protection) pour lutter contre les mouches blanches des serres et les mouches blanches du tabac.

Dose: 0,15 l/ha de haie, 1-2 applications à intervalle de 9 jours

Maximum 2 applications par an

Délai avant récolte: 3 jours

Plantes ornementales (non destinées à la consommation) (sous protection) pour lutter contre les mouches blanches des serres et les mouches blanches du tabac.

Dose: 25 ml/100 l, 1-2 applications à intervalle de 9 jours.

Maximum 2 applications par an

Mesures de précaution avant la rentrée en cultures sous protection

Ventiler jusqu'au séchage du produit pulvérisé avant de rentrer. D'autres travaux peuvent être effectués par la suite sans l'utilisation de mesures de protection.

Remarque générale

Lorsqu'on ne recourt pas à une lutte biologique ou intégrée, il est recommandé d'appliquer l'ADMIRAL en combinaison avec un insecticide agréé contre les mouches blanches adultes en vue d'une efficacité plus complète

Conditions particulières d'application

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

- Le produit n'a pas d'effet inacceptable sur *Encarsia formosa*, *Phytoseiulus persimilis* et *Orius* spp.

- La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations.

Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les cultures gérées selon les principes de la lutte intégrée. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

Préparation de la bouillie

Remplir la cuve à moitié d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter, en mélangeant, la cuve avec la quantité d'eau nécessaire.

Mesures de précaution

- Il est recommandé de rincer correctement le pulvérisateur avec de l'eau après le traitement.

- Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

Traitement des emballages vides et les surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau manuellement (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de rinçage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Indications concernant les premiers secours

Inhalation

Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage

Ingestion

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette

Contact avec la peau

Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Projection dans les yeux

Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. Porteurs de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter immédiatement un ophtalmologue et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Indications pour le médecin

Prise en charge : traitement symptomatique.

Contactez le Centre Anti-poisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

Centre Antipoison: 070/245.245

Garantie

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant aux résultats insuffisants et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur assume seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

Admiral®

INTEGRATED PEST MANAGEMENT WITH

Insecticide tegen witte vlieg in de sierteelt en de groenteteelt onder bescherming.

Insecticide contre la mouche blanche en cultures ornementales et en cultures maraîchères sous protection.

**Erkenningshouder/
Déporteur d'agrément**

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'affaires de Crécy,
Rue de la Voie Lactée 10A
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
FRANKRIJK/ FRANCE
Tel. 0033 4 78 64 32 57



www.agrirecover.eu
8526-500-L4-0819-01
F130000766A-0819

®: Geregistreerd handelsmerk van / Marque enregistrée de Sumitomo

Nufarm B.V.
Koningsstraat 97 / 4d⁺ verdiep
1000 Brussel / Bruxelles
Tel.: 0031 10-3037725
www.nufarm.com/be

500ml

Nufarm
Grow a better tomorrow

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis Pyriproxyfen 100 g/l (11% ww)
Concentré émulsionnable (EC) à base de Pyriproxyfen 100 g/l (11% ww)
Erkenningsnummer / Numéro d'agrément: 8526P/B
Lotnummer / N° de lot: zie verpakking / voir emballage
Voor Professioneel gebruik/ Pour usage professionnel

	Gevarenaanduidingen	Mentions de danger
H226 H304	Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.	Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 H318 H373	Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.	Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Risques présumés d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
	Veiligheidsaanbevelingen	Conseils de prudence
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P331 P301+ P310 P280	GEEN braken opwekken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / een arts raadplegen. Beschermende handschoenen, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.	NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux et du visage.
P391 P302+ P352 P305+ P351	Gelekte/gemorste stof opruimen BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.	Recueillir le produit répandu. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501	Inhoud / verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.	Éliminer le contenu/réceptier dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
	Andere etiketelementen	Autres mentions
EUH 401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
EUH 210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Lees aandachtig het etiket voor gebruik/ Lire attentivement l'étiquette avant usage

**Gevaar
Danger**

