



TRIMAXX®

Groeiregulator. Voorkomt legering Régulateur de croissance contre la verse



TRIMAXX **UFI: 2YGU-67WT-9JA8-F6EY**

Toelatingsnummer: 10141P/B
Werkzame stof: trinexapac-ethyl 175 g/L
Formuleringstype: EC (Emulgeerbaar concentraat)
Lotnummer: zie verpakking/voir emballage
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Número d'autorización: 10141P/B
Ingrediente active: trinexapac-éthyle 175 g/L
Type de formulation: EC (concentré émulsionnable)
Número de lot: zie verpakking/voir emballage
EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

Waarschuwing / Attention

H315	Veroorzaakt huidirritatie.	Provoque une irritation cutanée.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.	Provoque une sévère irritation des yeux.
H373	Kan schade aan het gastro-intestinale stelsel veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.	Risque présumé d'effets graves pour le système gastro-intestinal à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P261	Inademing van damp en spuitnevel vermijden.	Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.
P280	Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en geluutsbescherming dragen.	Porter des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage, des gants de protection.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
P305+P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P333+P313	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.	Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.	Recueillir le produit répandu.
EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



*: Geregistreerd handelsmerk van / Marque enregistrée de Nufarm

5 L e

510012654_092025

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Nederland
Tel.: 0031-10-3037725
www.nufarm.com/be



www.agrirecover.eu



0 87 20364 28371 1

EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE

Trinexapac-ethyl, de actieve stof van **Trimaxx** wordt door de bladeren en stengel opgenomen. Door de antigibberelline werking wordt de celstrekking geremd en worden de celwanden verdikt, waardoor minder snel legering optreedt. De spuitvloeistof vloeit goed uit over het gewas en geeft hiermee een goede bedekking van het blad. Dit zorgt ervoor dat de actieve stof in korte tijd wordt opgenomen. **Trimaxx** dient niet te worden gebruikt als binnen 2 uur regen wordt verwacht, bij grote temperatuurverschillen, bij vorst of wanneer het gewas te lijden heeft van droogte.

Toepassingstijdstip en dosering

Gebruik voor alle teelten: ter bestrijding van legering (*lodging*).

Wintertarwe, winter- en zomerrogge, zomer- en wintertriticale, zomer- en winterspelt (open lucht)

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak – 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop (BBCH 31–32).
Toepassingstechniek: bespuiting.

Dosering: 0,4–0,5 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.
Opmerking voor wintertarwe: max. 0,5 l/ha/teelt.

Wintertarwe (open lucht)

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak – vlagblad volledig uitgegroeid, ligula zichtbaar (BBCH 31–39).
Toepassingstechniek: bespuiting.

Dosering: 0,25 l/ha, 1–2 toepassingen met een minimum interval tussen twee toepassingen van 7 dagen.
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.
Opmerking: max. 0,5 l/ha/teelt.

Zomertarwe, winterhaver, zomerhaver (open lucht)

Toepassingsstadium: begin strekking; pseudostengel en stelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak – eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak (BBCH 30–31)

Toepassingstechniek: bespuiting.
Dosering: 0,4 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Wintergerst (open lucht)

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak – 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop (BBCH 31–32).

Toepassingstechniek: bespuiting.
Dosering: 0,6–0,8 l/ha, de dosis in functie van de gerstvariëteit wordt op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.

Aantal toepassingen: 1.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Zomergerst (open lucht)

Toepassingsstadium: einde van de uittoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar – 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop (BBCH 29–32).
Toepassingstechniek: bespuiting.

Dosering: 0,4–0,6 l/ha, de dosis in functie van de gerstvariëteit wordt op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder. Aantal toepassingen: 1.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Italiaans raigras en Engels raigras (graszaadteelt) (open lucht)

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak – 3de knoop minstens 2 cm boven 2de knoop (BBCH 31–33).

Toepassingstechniek: bespuiting.
Dosering: 0,4–0,8 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Timotheegras (graszaadteelt) (open lucht)

Het gebruik van Trimaxx in de teelt van timotheegras (graszaadteelt) werd toegelaten op basis van art. 51 van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009.

Voor deze uitbreidingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheids- en fytoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak – 3de knoop minstens 2 cm boven 2de knoop (BBCH 31–33).

Toepassingstechniek: bespuiting.
Dosering: 1,2 l/ha, 1 toepassing eventueel in menging met een adjuvant.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Bijzondere toepassingsvoorwaarden

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SP#3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- Er is kans op necrosevorming bij toepassing bij hoge temperaturen (> 25 °C) en lage luchtvochtigheid.
- De vermelding op het etiket van de gerstvariëteiten in functie van de dosis gebeurt op verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.
- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn (en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Bereiding van de spuitoplossing

Het product in de voor 1/2 gevulde spuitank gieten. Mengen en verder al mengende met water aanvullen

Algemene voorschriften

- Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.
- **Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.**

Behandelen van de lege verpakkingen en de spuitoverschotten

De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank worden gegoten.

De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet vervullen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Eerste-hulpmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts: /

Voor bijkomende inlichtingen,

contacteer het Antigifcentrum 070/245.245

Waarborg

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onbepaalde kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

PROPRIÉTÉS ET MODE D'ACTION

La substance active de **Trimaxx, trinexapac-éthyle** est absorbée par les feuilles et les tiges. Par l'action sur les gibbèlles, l'allongement cellulaire est inhibé et les parois cellulaires sont plus épaissies.

Le produit coule bien sur la culture et donne une bonne couverture de la feuille. Cela garantit que la substance active est absorbée en peu de temps et donc rapidement active dans la plante., Trimaxx ne doit pas être utilisé si la pluie est attendue dans les 2 heures, quand il y a de grandes différences de température, pendant le gel ou lorsque la culture souffre de sécheresse.

Usages et doses d'emploi

À utiliser pour toutes les cultures : pour lutter contre la verse.

Froment d'hiver, seigle d'hiver, seigle de printemps, triticale de printemps et d'hiver, épeautre de printemps et d'hiver

Stade d'application: le premier nœud est au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage – le deuxième nœud est au moins à 2 cm au-dessus du premier nœud (BBCH 31–32).

Méthode d'application: pulvérisation.

Dose: 0,4–0,5 l/ha, 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Remarque pour froment d'hiver: max. 0,5 l/ha/culture.

Froment d'hiver

Stade d'application: le premier nœud est au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage – le limbe de la dernière feuille est entièrement étalé, la ligule est visible (BBCH 31–39).

Méthode d'application: pulvérisation.

Dose: 0,25 l/ha, 1–2 applications à intervalle d'au moins 7 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Remarque: max. 0,5 l/ha/culture.

Froment de printemps, avoine d'hiver, avoine de printemps

Stade d'application: début montaison: pseudo-tiges et talles dressées, début d'élongation du premier entre-nœud, inflorescence au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage – le premier nœud est au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage (BBCH 30–31).

Méthode d'application: pulvérisation.

Dose: 0,4 l/ha, 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Orge d'hiver

Stade d'application: le premier nœud est au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage – le deuxième nœud est au moins à 2 cm au-dessus du premier nœud (BBCH 31–32).

Méthode d'application: pulvérisation.

Dose: 0,6–0,8 l/ha, la dose en fonction de la variété d'orge est mentionnée sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur d'autorisation.

Nombre d'applications: 1.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Orge de printemps

Stade d'application: fin tallage: nombre maximal de talles visibles – le deuxième nœud est au moins à 2 cm au-dessus du premier nœud (BBCH 29–32).

Méthode d'application: pulvérisation.

Dose: 0,4–0,6 l/ha, la dose en fonction de la variété d'orge est mentionnée sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur d'autorisation.

Nombre d'applications: 1.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Ray-grass italien, ray-grass anglais (production de semences)

Stade d'application: le premier nœud est au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage – le troisième nœud est au moins à 2 cm au-dessus du deuxième nœud (BBCH 31–33).

Méthode d'application: pulvérisation.

Dose: 0,4–0,8 l/ha, 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Fléole des prés/timothée (production de semences)

L'utilisation de Trimaxx dans la culture de fléole des prés/timothée a été autorisée sur la base d'une extension sur l'article 51 du règlements (CE) Nr. 1107/2009.

L'usage du produit pour ces extensions tombe sous la responsabilité de l'utilisateur. En raison du nombre limité de données évaluées concernant l'efficacité et la phytotoxicité, il est conseillé d'effectuer un test avant l'utilisation du produit.

Stade d'application: le premier nœud est au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage – le troisième nœud est au moins à 2 cm au-dessus du deuxième nœud (BBCH 31–33).

Méthode d'application: pulvérisation.

Dose: 1,2 l/ha, 1 application éventuellement en mélange avec un adjuvant
Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Conditions particulières d'application

– SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

– SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

– SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

– Il y a un risque de formation de nécrose en cas d'application lors de températures élevées (>25°C) et de faible humidité de l'air.

– Les doses pour les variétés d'orge sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation.

– La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

– Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

Préparation de la bouillie

Remplir la cuve à moitié d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter, en mélangeant, la cuve avec la quantité d'eau nécessaire.

Mesures de précaution

– Il est recommandé de rincer correctement le pulvérisateur avec de l'eau après le traitement.

– **Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.**

Traitement des emballages vides et des surplus de traitements

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau manuellement (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de rinçage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Conseils de premiers secours

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTI-POISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant utilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin

Remarques pour le médecin: /

Pour informations complémentaires, contacter le

Centre Antipoisons 070/245.245

Garantie

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant aux résultats insuffisants et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur assume seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

SPECIMEN

SPECIMEN



TRIMAXX®

Groeiregulator. Voorkomt legering Régulateur de croissance contre la verse

TRIMAXX **UFI: 2YGU-67WT-9JA8-F6EY**

Toelatingsnummer: 10141P/B
Werkzame stof: trinexapac-ethyl 175 g/L
Formuleringstype: EC (Emulgeerbaar concentraat)
Lotnummer: zie verpakking/voir emballage
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Número d'autorization: 10141P/B
Ingrediente active: trinexapac-éthyle 175 g/L
Type de formulation: EC (concentré émulsionnable)
Número de lot: zie verpakking/voir emballage
EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

Waarschuwing / Attention

H315	Veroorzaakt huidirritatie.	Provoque une irritation cutanée.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.	Provoque une sévère irritation des yeux.
H373	Kan schade aan het gastro-intestinale stelsel veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.	Risque présumé d'effets graves pour le système gastro-intestinal à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H411	Gifstig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P261	Inademing van damp en spuitnevel vermijden.	Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.
P280	Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en geluutsbescherming dragen.	Porter des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage, des gants de protection.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
P305+P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P333+P313	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.	Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.	Recueillir le produit répandu.
EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



*: Geregistreerd handelsmerk van / Marque enregistrée de Nufarm

5 L e

510012654_092025

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Nederland
Tel.: 0031-10-3037725
www.nufarm.com/be



www.agrirecover.eu

Nufarm
Grow a better tomorrow



0 87 20364 28371 1

SPECIMEN