



AZBANY®



FRAC 11 FUNGICIDE

Fungicide voor granen, koolzaad, vicia-bonen, asperge, bloemkool en wortel.
Fongicide pour céréales, colza, fèves et féveroles, chou-fleur, asperge et carottes.

AZBANY UFI: C34N-XSXE-UFAW-XHVO

Suspensie concentraat met 250 g/l azoxystrobin
Suspension concentrée contenant 250 g/l azoxystrobine
Erkenningsnummer / Numéro d'agrément: 10640P/B
N° de lot: zie verpakking / voir emballage

Gevarenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Mentions de danger

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P391 Recueillir le produit répandu.

Informations additionnelles sur les dangers

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Waarschuwing / Attention



Voor professioneel gebruik. / Produit pour usage professionnel.

®: Gedeponoord handelsmerk Nufarm / Marque déposée Nufarm

5 L^e

510012160_122025

Toelatingshouder en distributeur /
Détenant de l'autorisation et Distributeur:
Nufarm BV

Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle a/d IJssel
The Netherlands
Tel.: 0031 10-3037725 – www.nufarm.com/be



www.agrirecover.eu



0 87 20364 28315 5

AZBANY®

Eigenschappen en Werking

Gebruiksaanbevelingen

Toepassingstijdstip en doseringen AZBANY®

Wortelen (open lucht)

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*), alternaria (*Alternaria dauci*).

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Dosis: 1,0 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dagen.

Wachtijd voor de oogst: 14 dagen.

Risicobeperkende maatregelen:

– Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Knoflook, uien (droogge oogste), bosuien (lente-ui), sjalot (open lucht)

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Dosis: 0,8 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 21 dag(en)

Wachtijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

– Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Tomaten, aubergine (leierplant)/pepino (onder bescherming)

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Leveillula taurica*)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Dosis: 0,4 l/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Wachtijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

– Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Broccoli, bloemkool (witte en groene), spruitkool (open lucht)

Ter bestrijding van: witte roest (*Albugo candida*), zwartevlekkenziekte (*Mycosphaerella brassicicola*), spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Dosis: 1,0 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Wachtijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

– Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

sluitkool (witte, rode, kabuiskool, savooi- en spitskool), Chinese kool, paksoi,

tatsoi en komatsuna, boerenkool (krulskool, palomboerenkool) (open lucht)

Ter bestrijding van: witte roest (*Albugo candida*), spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Dosis: 1,0 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Wachtijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

– Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (droogge oogst en groenge oogst, zonder peul) (open lucht)

Ter bestrijding van: roest (*Uromyces viciae-fabae*)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Dosis: 0,8 – 1,0 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Wachtijd voor de oogst: 35 dagen.

Risicobeperkende maatregelen:

– Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Asperge (onder bescherming)

Ter bestrijding van: stemphylium-stengelsterfte (*Pleospora alli*), roest (*Puccinia asparagi*)

Toepassingsstadium: na de oogst

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Dosis: 1,0 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

– Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Wintertarwe (ook zaadproductie) (open lucht)

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici* / *Leptosphaeria nodorum*), echte meeldauw (*Erysiphe graminis*), bruine roest (*Puccinia recondita*)
Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoeingsvlak – einde bloei: alle aren uitgebloeid, enkele uitgedroogde helmknoppen nog aanwezig (BBCH 30-69)

Ter bestrijding van: kafesbruin (*Septoria nodorum*) en gele roest (*Puccinia striiformis*)

Toepassingsstadium: 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop – einde aanvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 32-59)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Dosis: 1,0 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Wachtijd voor de oogst: 36 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

– Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Zomertarwe (ook zaadproductie) (open lucht)

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici* / *Leptosphaeria nodorum*), kafesbruin (*Septoria nodorum*), echte meeldauw (*Erysiphe graminis*), bruine roest (*Puccinia recondita*) en gele roest (*Puccinia striiformis*).

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoeien opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoeingsvlak - einde bloei: alle aren uitgebloeid, enkele uitgedroogde helmknoppen nog aanwezig (BBCH 30-69)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Dosis: 1,0 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Wachttijd voor de oogst: 36 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Wintergerst (ook zaadproductie) (open lucht)

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*), dwergroest (*Puccinia hordei*)

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoeien opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoeingsvlak - einde aanvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Ter bestrijding van: netvlekkenziekte / strepenziekte (*Pyrenophora / Helminthosporium / Drechslera*), echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoeingsvlak - vlagblad volledig uitgedrooid, ligula zichtbaar (BBCH 31-39)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Dosis: 1,0 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Wachttijd voor de oogst: 35 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Zomergerst (ook zaadproductie) (open lucht)

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*), netvlekkenziekte / strepenziekte (*Pyrenophora / Helminthosporium / Drechslera*), dwergroest (*Puccinia hordei*)

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoeien opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoeingsvlak - einde aanvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoeingsvlak - vlagblad volledig uitgedrooid, ligula zichtbaar (BBCH 31-39)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Dosis: 1,0 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Wachttijd voor de oogst: 35 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Winterrogge en zomerrogge (ook zaadproductie) (open lucht)

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoeien opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoeingsvlak - einde bloei: alle aren uitgebloeid, enkele uitgedroogde helmknoppen nog aanwezig (BBCH 30-69)

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici / Leptosphaeria*

nodorum), kafjesbruin (*Septoria nodorum*), echte meeldauw (*Erysiphe graminis*), bruine roest (*Puccinia recondita*), gele roest (*Puccinia striiformis*)

Toepassingsstadium: 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop - einde aanvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 32-59)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Dosis: 1,0 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Wachttijd voor de oogst: 36 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Winterhaver en zomerhaver (open lucht)

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*), kroonroest (*Puccinia coronata*)

Toepassingsstadium: 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop - einde aanvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 32-59)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Dosis: 1,0 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Wachttijd voor de oogst: 35 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Wintertriticale en zomertriticale (ook zaadproductie) (open lucht)

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoeien opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoeingsvlak - einde bloei: alle aren uitgebloeid, enkele uitgedroogde helmknoppen nog aanwezig (BBCH 30-69)

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*), kafjesbruin (*Septoria nodorum*), bruine roest (*Puccinia recondita*), gele roest (*Puccinia striiformis*)

Toepassingsstadium: 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop - einde aanvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 32-59)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Dosis: 1,0 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Wachttijd voor de oogst: 36 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Winterspelt en zomerspelt (ook zaadproductie) (open lucht)

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*), kafjesbruin (*Septoria nodorum*), echte meeldauw (*Erysiphe graminis*), bruine roest (*Puccinia recondita*)

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoeien opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoeingsvlak - einde bloei: alle aren uitgebloeid, enkele uitgedroogde helmknoppen nog aanwezig (BBCH 30-69)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Dosis: 1,0 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Wachttijd voor de oogst: 36 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

– Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Aardappelen (ook pootgoedteelt) (open lucht)

Ter bestrijding van: lakschurft (*Rhizoctonia solani*)

Toepassingsstadium: voor of tijdens het planten

Toepassingstechniek: bespuiting

Dosis: 3,0 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Opmerking: rijbehandeling

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

– Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Aardappelen (ook pootgoedteelt) (open lucht)

Ter bestrijding van: alternariarot (*Alternaria solani*)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Dosis: 0,25 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

– Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Winterkoolzaad/winterraapzaad, zomerkoolzaad/zomerraapzaad (open lucht)

Ter bestrijding van: sclerotienrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*), spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Dosis: 1,0 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

– Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Mergkool en voederkool (open lucht)

Ter bestrijding van: witte roest (*Albugo candida*) en spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)

Toepassingstechniek: bespuiting

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Dosis: 1,0 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

– Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

UITBREIDING VAN DE TOELATING VOOR KLEINE TOEPASSINGEN (in toepassing van

Artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1107/2009).

Voor deze uitbreidingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheids- en fytoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

Bloemkool (witte en groene) (onder bescherming)

Ter bestrijding van: witte roest (*Albugo candida*) en spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)

Toepassingstechniek: bespuiting

Dosis: 1,0 l/ha

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Wachttijd voor de oogst: 28 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

– Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking(en):

Tijdens de manipulatie en de oogst van het behandelde gewas chemisch bestendige handschoenen dragen.

Bijzondere toepassingsvoorwaarden

– SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

– SPa1: Om residuïeopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 11.

– SPe2: Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgeving toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.

– SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

– SPb: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

– De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

– Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Bereiding van de spuitoplossing

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder al mengende met water aanvullen.

Behandelen van de lege verpakkingen en de spuitoverschotten

De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat in het sproeiotoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelput.

De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspreuen op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking.

De verpakking mag in geen enkel geval herbruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend.

Algemene voorschriften

- Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.
- Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

Aanwijzingen betreffende de eerste hulp

Eerste hulp maatregelen Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.	
NA INSLIKKEN:	De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
NA INADEMING:	De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:	Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.	

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal

Bij vermoeden van een vergiftiging onmiddellijk een arts waarschuwen en het Antigifcentrum contacteren: tel 070 245 245.

Waarborg

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product.

De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

AZBANY®

Propriétés et mode d'action

Recommandations d'application

Usages et doses d'emploi AZBANY®

Carottes (plein air)

Pour lutter contre: oïdium (*Erysiphe heraclei*), alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*).

Méthode d'application: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 2 application(s)/culture

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle entre deux applications: 14 à 21 jour(s)

Délai avant la récolte: 14 jour(s)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Ail, oignons (récolté sec), oignons de printemps, échalote (plein air)

Pour lutter contre: mildiou de l'oignon (*Peronospora destructor*)

Méthode d'application: pulvérisation

Nombre maximal d'applications: 3 application(s)/culture

Dose: 0,8 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 3

Intervalle minimal entre deux applications: 21 jour(s)

Délai avant la récolte: 14 jour(s)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Tomate, aubergine et pépinois (sous protection)

Pour lutter contre: oïdium (*Leveillula taurica*)

Méthode d'application: pulvérisation

Nombre maximal d'applications: 3 application(s)/culture

Dose: 0,4 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 3

Intervalle minimal entre deux applications: 7 jour(s)

Délai avant la récolte: 3 jour(s)

Mesures de réduction du risque:

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Chou brocoli, chou-fleur (blanc et vert), chou de Bruxelles (plein air)

Pour lutter contre: rouille blanche (*Albugo candida*), maladie des taches noires (*Mycosphaerella brassicicola*), alternariose (*Alternaria brassicae*)

Méthode d'application: pulvérisation

Nombre maximal d'applications: 2 application(s)/culture

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 12 jour(s)

Délai avant la récolte: 14 jour(s)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Choux pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de Savoie), chou chinois, pakchoï, pakchoï en rosette et komatsuna, chou frisé (chou palmier) (plein air)
Pour lutter contre: rouille blanche (*Albugo candida*), alternariose (*Alternaria brassicae*)

Méthode d'application: pulvérisation

Nombre maximal d'applications: 2 application(s)/culture

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 12 jour(s)

Délai avant la récolte: 14 jour(s)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Fèves et féveroles (récoltées sèches), fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse) (plein air)

Pour lutter contre: rouille de la fève (*Uromyces viciae-fabae*).

Méthode d'application: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 1 application/culture.

Dose: 0,8 – 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1

Délai avant la récolte: 35 jour(s)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Asperge (sous protection)

Pour lutter contre: stemphyliose (*Pleospora alli*), rouille de l'asperge (*Puccinia asparagi*).

Stade d'application: après la récolte.

Méthode d'application: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 2 applications/12 mois.

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 14 jour(s)

Mesures de réduction du risque:

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Froment d'hiver (y compris la production de semences) (plein air)

Pour lutter contre: septoriose des feuilles (*Septoria tritici* / *Leptosphaeria nodorum*), oïdium (*Erysiphe graminis*), rouille brune (*Puccinia recondita*).

Stade d'application: début montaison: pseudo-tiges et talles dressées, début d'élongation du premier entrenœud, inflorescence au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage - fin floraison, tous les épillets ont fleuri, quelques anthères desséchées peuvent subsister (BBCH 30-69)

Pour lutter contre: septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*), rouille jaune (*Puccinia striiformis*).

Stade d'application: le deuxième noeud est au moins à 2 cm au-dessus du premier noeud - fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 32-59)

Méthode d'application: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 2 applications/culture.

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 14 jour(s)

Délai avant la récolte: 36 jour(s)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Froment de printemps (y compris la production de semences) (plein air)

Pour lutter contre: septoriose des feuilles (*Septoria tritici* / *Leptosphaeria nodorum*), septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*), oïdium (*Erysiphe graminis*),

rouille brune (*Puccinia recondita*), rouille jaune (*Puccinia striiformis*).

Stade d'application: début montaison: pseudo-tiges et talles dressées, début d'élongation du premier entre-nœud, inflorescence au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage - fin floraison, tous les épillets ont fleuri, quelques anthères desséchées peuvent subsister (BBCH 30-69)

Méthode d'application: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 2 applications/culture.

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 14 jour(s)

Délai avant la récolte: 36 jour(s)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Orges d'hiver (y compris la production de semences) (plein air)

Pour lutter contre: rhynchosporiose (*Rhynchosporium secalis*), rouille naine (*Puccinia hordei*).

Stade d'application: début montaison: pseudo-tiges et talles dressées, début d'élongation du premier entre-nœud, inflorescence au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage - fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 30-59)

Pour lutter contre: helminthosporiose (*Pyrenophora / Helminthosporium / Drechslera*), oïdium (*Erysiphe graminis*).

Stade d'application: le premier nœud est au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage - le limbe de la dernière feuille est entièrement étalé, la ligule est visible (BBCH 31-39)

Méthode d'application: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 2 applications/culture.

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 14 jour(s)

Délai avant la récolte: 35 jour(s)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Orges de printemps (y compris la production de semences) (plein air)

Pour lutter contre: rhynchosporiose (*Rhynchosporium secalis*), helminthosporiose (*Pyrenophora / Helminthosporium / Drechslera*), rouille naine (*Puccinia hordei*).

Stade d'application: début montaison: pseudo-tiges et talles dressées, début d'élongation du premier entre-nœud, inflorescence au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage - fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 30-59)

Pour lutter contre: oïdium (*Erysiphe graminis*)

Stade d'application: le premier nœud est au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage - le limbe de la dernière feuille est entièrement étalé, la ligule est visible (BBCH 31-39)

Méthode d'application: pulvérisation

Nombre maximal d'applications: 2 application(s)/culture

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 14 jour(s)

Délai avant la récolte: 35 jour(s)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Seigle d'hiver (y compris la production de semences) (plein air)

Pour lutter contre: rhynchosporiose (*Rhynchosporium secalis*)

Stade d'application: début montaison: pseudo-tiges et talles dressées, début d'élongation du premier entre-nœud, inflorescence au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage - fin floraison, tous les épillets ont fleuri, quelques anthères desséchées peuvent subsister (BBCH 30-69)

Pour lutter contre: septoriose des feuilles (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*), septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*), oïdium (*Erysiphe graminis*), rouille brune (*Puccinia recondita*), rouille jaune (*Puccinia striiformis*)

Stade d'application: le deuxième nœud est au moins à 2 cm au-dessus du premier nœud - fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 32-59)

Méthode d'application: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 2 application(s)/culture.

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 14 jour(s)

Délai avant la récolte: 36 jour(s)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Seigle de printemps (y compris la production de semences) (plein air)

Pour lutter contre: rhynchosporiose (*Rhynchosporium secalis*)

Stade d'application: début montaison: pseudo-tiges et talles dressées, début d'élongation du premier entre-nœud, inflorescence au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage - fin floraison, tous les épillets ont fleuri, quelques anthères desséchées peuvent subsister (BBCH 30-69)

Pour lutter contre: septoriose des feuilles (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*), septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*), oïdium (*Erysiphe graminis*), rouille brune (*Puccinia recondita*), rouille jaune (*Puccinia striiformis*).

Stade d'application: le deuxième nœud est au moins à 2 cm au-dessus du premier nœud - fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 32-59)

Méthode d'application: pulvérisation

Nombre maximal d'applications: 2 application(s)/culture

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 14 jour(s)

Délai avant la récolte: 36 jour(s)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avoine d'hiver, avoine de printemps (plein air)

Pour lutter contre: oïdium (*Erysiphe graminis*), rouille couronnée des graminées (*Puccinia coronata*)

Stade d'application: le deuxième nœud est au moins à 2 cm au-dessus du premier nœud - fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 32-59)

Méthode d'application: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 2 applications/culture.

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 14 jour(s)

Délai avant la récolte: 35 jour(s)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Triticale d'hiver, triticale de printemps (y compris la production de semences) (plein air)

Pour lutter contre: septoriose des feuilles (*Septoria tritici* / *Leptosphaeria nodorum*), septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*), rouille brune (*Puccinia recondita*), rouille jaune (*Puccinia striiformis*)

Stade d'application: le deuxième noeud est au moins à 2 cm au-dessus du premier noeud – fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 32-59)

Pour lutter contre: oïdium (*Erysiphe graminis*)

Stade d'application: début montaison: pseudo-tiges et talles dressées, début d'élongation du premier entrenœud, inflorescence au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage - fin floraison, tous les épillets ont fleuri, quelques anthères desséchées peuvent subsister (BBCH 30-69)

Méthode d'application: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 2 applications/culture.

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 14 jour(s)

Délai avant la récolte: 36 jour(s)

Mesures de réduction du risque :

– Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Épeautre d'hiver et épeautre de printemps (y compris la production de semences) (plein air)

Pour lutter contre: septoriose des feuilles (*Septoria tritici* / *Leptosphaeria nodorum*), septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*), oïdium (*Erysiphe graminis*), rouille brune (*Puccinia recondita*).

Stade d'application: début montaison: pseudo-tiges et talles dressées, début d'élongation du premier entrenœud, inflorescence au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage - fin floraison, tous les épillets ont fleuri, quelques anthères desséchées peuvent subsister (BBCH 30-69)

Méthode d'application: pulvérisation

Nombre maximal d'applications: 2 application(s)/culture

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 14 jour(s)

Délai avant la récolte: 36 jour(s)

Mesures de réduction du risque :

– Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pommes de terre et culture de plants de pommes de terre (plein air)

Pour lutter contre: rhizoctone de la pomme de terre (*Rhizoctonia solani*)

Stade d'application: avant ou pendant la plantation

Méthode d'application: pulvérisation

Dose: 3 l/ha.

Nombre d'applications: 1

Remarque: traitement dans la ligne

Délai avant la récolte: 7 jour(s)

Mesures de réduction du risque :

– Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Pommes de terre et culture de plants de pommes de terre (plein air)

Pour lutter contre: alternariose des solanacées (*Alternaria solani*)

Méthode d'application: pulvérisation

Nombre maximal d'applications: 3 application(s)/culture

Dose: 0,25 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 3

Intervalle minimal entre deux applications: 7 jour(s)

Délai avant la récolte: 7 jour(s)

Mesures de réduction du risque :

– Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Colza d'hiver/navette d'hiver, colza de printemps/navette de printemps (plein air)

Pour lutter contre: sclérotiniose (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*)) et alternariose (*Alternaria brassicae*)

Méthode d'application: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 2 application(s)/culture.

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 14 jour(s)

Délai avant la récolte: 21 jour(s)

Mesures de réduction du risque :

– Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Chou moëllier et chou fourrager

Pour lutter contre: rouille blanche (*Albugo candida*), alternariose (*Alternaria brassicae*).

Méthode d'application: pulvérisation

Nombre maximal d'applications: 2 application(s)/culture

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 12 jour(s)

Délai avant la récolte: 14 jour(s)

Mesures de réduction du risque :

– Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

EXTENSION DE L'AUTORISATION POUR DES USAGES MINEURS (en application de l'article 51 du Règlement (CE) No 1107/2009).

L'usage du produit pour ces extensions tombe sous la responsabilité de l'utilisateur. En raison du nombre limité de données évaluées concernant l'efficacité et la phytotoxicité, il est conseillé d'effectuer un test avant l'utilisation du produit.

Chou-fleur (blanc et vert) (sous protection)

Pour lutter contre: rouille blanche (*Albugo candida*), alternariose (*Alternaria brassicae*).

Méthode d'application: pulvérisation

Nombre maximal d'applications: 2 application(s)/culture

Dose: 1,0 l/ha.

Nombre d'applications: 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications: 14 jour(s)

Délai avant la récolte: 28 jour(s)

Mesures de réduction du risque :

– Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Remarque(s):

Lors de la manipulation et de la récolte de la culture traitée, porter des gants résistants aux produits chimiques.

Conditions particulières d'application

– SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

– SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code FRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 11.

– SPe2: Pour protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utili-

sé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme «sterk erosiegevoelig». Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre.

- SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
- SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.
- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

Préparation de la bouillie

Remplir la cuve à moitié d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter, en mélangeant, la cuve avec la quantité d'eau nécessaire.

Traitement des emballages vides et les surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau manuellement (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de rinçage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer.

Mesures de précaution

- Il est recommandé de rincer correctement le pulvérisateur avec de l'eau après le traitement.
- Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

Indications concernant les premiers secours

Premiers soins

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION:

Rincer la bouche.
Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION:

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

Enlever les vêtements contaminés.
Laver abondamment à l'eau.
En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Pour des informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

S'il y a présomption d'empoisonnement, avertir immédiatement un médecin et appeler le Centre Anti-Poisons (070 245 245).

Garantie

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous nous déclinons par conséquent toute responsabilité quand aux résultats insuffisants et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur assume seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

SPECIMEN



AZBANY®

FRAC 11 FUNGICIDE

Fungicide voor granen, koolzaad, vicia-bonen, asperge, bloemkool en wortel.
Fongicide pour céréales, colza, fèves et féveroles, chou-fleur, asperge et carottes.

AZBANY UFI: C34N-XSXE-UFAW-XHVO

Suspensie concentraat met 250 g/l azoxystrobin
Suspension concentrée contenant 250 g/l azoxystrobine
Erkenningsnummer / Numéro d'agrément: 10640P/B
N° de lot: zie verpakking / voir emballage

Gevarenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Mentions de danger

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P391 Recueillir le produit répandu.

Informations additionnelles sur les dangers

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Waarschuwing / Attention



Voor professioneel gebruik. / Produit pour usage professionnel.

®: Gedeponoord handelsmerk Nufarm / Marque déposée Nufarm

5 L e

510012160_122025

Toelatingshouder en distributeur /
Détenant de l'autorisation et Distributeur:
Nufarm BV

Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle a/d IJssel
The Netherlands
Tel.: 0031 10-3037725 – www.nufarm.com/be



www.agrirecover.eu



0 87 20364 28315 5

SPECIMEN