

Culture	Localisation	Pour lutter contre	Dose (kg/ha)	Nombre d'applications	Intervalle min entre 2 applications (jours)	Mesures de réduction du risque (par rapport aux eaux de surface avec technique classique)
Betterave rouge et jaune	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Carottes	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Painis	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Céleri-raves	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Radis	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Radis noir, Radis rave	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Scorsonère	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Chou-navet, rutabaga	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Navet	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Railfort*	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Topinambour	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Ail	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Oignons de printemps	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Oignons (récolté sec)	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Echalote	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Chou brocoli	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Chou-fleur (blanc et vert)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Chou de Bruxelles	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Choux pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de Savoie)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Chou chinois, pakchoi, pakchoi en rosette et komatsuna	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Chou frisé (chou palmier)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Chou-rave	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Cresson alénois et autres jeunes pousses*	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Mâche	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Laitues	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Endives/Radicchio/Romain/Pain de sucre	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Epinard	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Cresson de fontaine*	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Culture de racines de witloof	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m

Culture	Localisation	Pour lutter contre	Dose (kg/ha)	Nombre d'applications	Intervalle min entre 2 applications (jours)	Mesures de réduction du risque (par rapport aux eaux de surface avec technique classique)
Bette (bette)*	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Roquette*	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Jeunes pousses de la famille des Brassicaceae, Asteraceae ou Amaranthaceae (récoltées jusqu'au stade 8 vraies feuilles)**	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Haricots verts (récoltés frais avec cosse)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Pois récoltés secs (sans cosse)	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Petits pois (sans cosse)	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Pois verts (avec cosse) (mange-tout)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Pois fourrages (récoltés secs)	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Fèves et fèvesoles (récoltés séchés)	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Fèves et fèvesoles (récoltés fraîches, sans cosse)	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Asperge (champ de production, sauf lire et 2ème années de culture)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Céleri (à côtes, blanc et vert)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Fenouil	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Poireau (champ de production)	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8**	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Poireau (fil de semences)	Sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8**	7	Pas de zone tampon
Rhubarbe	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Aneeth*, basilic*, carvi*, ciboulette*, cerfeuil*, céleri à couper*, coriandre*, estragon*, baurier*, livèche*, mélisse*, menthe*, origan/marjolaine*, oseille*, persil*, pourpier*, romarin*, roquette*, sauge officinale*, thym** ; consommation des feuilles Salicorne* ; consommation des feuilles et/ou tiges	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Angélique* ; consommation des feuilles et des racines, persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux*, valériane* ; consommation de la racine	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m
Heures comestibles*	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Mais doux	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5-1	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m

* Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.
 ** Le nombre d'applications est exprimé par culture. Cela doit être considéré comme un nombre maximal d'applications que peut recevoir un plant de poireau, indépendamment de l'endroit où il se situe. Des fers, fil de semences et champ de production doivent être considérés comme une seule culture.

Culture	Localisation	Pour lutter contre	Dose (kg/ha ou kg/ha/haie)	Nombre d'applications	Intervalle min entre 2 applications (jours)	Mesures de réduction du risque (par rapport aux eaux de surface avec technique classique)
Cornichon, Courgette/Pâtisson, Potiron	Plein air	Chenilles défoliatrices	0,5 - 1 kg/ha	1 à 8	7	Zone tampon min. de 1 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)
Potiron	Sous protection	Chenilles défoliatrices	0,5 - 1 kg/ha	1 à 8	7	Pas de zone tampon
Tomate, Poivron/Piment, Aubergine, Pépinois	Sous protection	Chenilles défoliatrices, Tuta absoluta	0,33 - 0,66 kg/ha/haie	1 à 8 (8 max par culture)	7	Pas de zone tampon
Cornichon, Courgette/Pâtisson, Melon	Sous protection	Chenilles défoliatrices	0,33 - 0,66 kg/ha/haie ou 0,5 - 1 kg/ha	1 à 8	7	Pas de zone tampon
Concombre	Sous protection	Chenilles défoliatrices	0,33 - 0,66 kg/ha/haie	1 à 8	7	Pas de zone tampon

PLANTES ORNEMENTALES

Culture	Localisation	Pour lutter contre	Dose (kg/100L d'eau)	Nb. d'applications	Intervalle min. entre 2 applications (jours)	Mesures de réduction du risque (par rapport aux eaux de surface avec technique classique)
Plantes ornementales	Plein air et sous protection	Chenilles défoliatrices, hyponomeutes, bombyx, chéimatobie brumeuse/phalène défoliante	0,1 - 0,2	1 à 3 (8 max par culture)	7	Zone tampon de 5 m (plein air) / Pas de zone tampon (sous protection)

Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur 11 (des) espèces(s) suivant(es) : / Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

- SP1 : Ne pas pulvériser l'eau avec le produit ou son emballage.
- SP2 : Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code IRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 11A.
- SP3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
- SP4 : Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.
- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

MESURES DE PRÉCAUTION AVANT LA RENTRÉE EN CULTURES SOUS PROTECTION

Ventiler jusqu'au séchage du produit pulvérisé avant de rentrer. D'autres travaux peuvent être effectués par la suite sans l'utilisation de mesures de protection.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE

Remplir la cuve à moitié d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter, en mélangeant, la cuve avec la quantité d'eau nécessaire.

MESURES DE PRÉCAUTION

- Il est recommandé de rincer correctement le pulvérisateur avec de l'eau après le traitement.
- **Conserver le produit sous-dé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.**

TRAITEMENT DES EMBALLAGES

VIDES ET LES SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau manuellement (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placée sur le pulvérisateur. Les eaux de rinçage doivent être versées dans la cuve de pulvérisation.

L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vidé. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant aux résultats insuffisants et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsque il est clairement établi que la cause du dégat est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur assume seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

Biologisch insecticide ter bestrijding van rupsen in de groententeelt, fruitteelt en sierteelt (in open lucht en onder bescherming).

Insecticide biologique pour lutter contre les chenilles en cultures légumières, cultures fruitières et plantes ornementales (en plein air et sous protection).

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 54% *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, stam ABTS-351. Granulés à disperser dans l'eau (WG) à base de 54% *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, souche ABTS-351. Erkenningsnummer/Numéro d'agrément: 10131P/B

1 kg e

IRAC 11A INSECTICIDE 5100275-07205

SUMITOMO CHEMICAL

Erkenningshouder/Détenteur d'agrément: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. 100 rue de la Vierge-Lacée, 69370 Saint-Denis-au-Mont-03, France Tel: +33 4 78 64 32 60

Valent BioSciences LLC 1910 Innovation Way, Suite 100 Libertyville, IL 60089, U.S.A. 1-800-323-9597 www.nufarm.com/be

Verdekte door/Distributeur par: Nufarm B.V. Rivium Oudstrand 75-7 2909 LC Capelle aan den IJssel, Nederland Tel: +31 03030725 www.nufarm.com/be

SKL AS/004-25-02 AS/004/04 7100014984-0725

AgriRecover www.agrirecover.eu

VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK/ POUR USAGE PROFESSIONNEL

Veiligheidsaanbevelingen

P260 : Stof en spuitnevel niet inademen. **P280 :** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen. **P284 :** Adembescherming dragen. **P302+P352 :** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. **P308+P313 :** NA (mogelijke) blootstelling: Het ANTIGIF-CENTRUM of een arts raadplegen.

Aanvullende veiligheidsinformatie

EUH210 : Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. **EUH401 :** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. **EUH410 :** Bevat *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. Micro-organismen kunnen eventueel sensibiliserende reacties uitlokken. **Consiliële de productie**

P260 : Ne pas respirer les poussières et les brumes de pulvérisation. **P280 :** Porter des gants de protection et des vêtements de protection. **P284 :** Porter un équipement de protection respiratoire. **P302+P352 :** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. **P308+P313 :** EN CAS D'EXPOSITION prouvée ou suspectée : Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin. **Informations additionnelles sur les dangers**

EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande. **EUH401 :** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. **Content du *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*.** Les micro-organismes peuvent avoir le potentiel de provoquer des réactions de sensibilisation. **Lees aandachtig het etiket voor gebruik/Lire attentivement l'étiquette avant usage.**

UFI: 0110-V010-300G-QVFM



DipeL® DF

EIGENSCHAPPENWERKINGSWIJZE

Het biologische insecticide DipeL® DF bestrijdt bladvreterende rupsen van vlinders en motten (lepidopteren) op diverse gewassen. Het middel is een bacteriepreparaat op basis van sporen en kristallen van Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki...

TOEPASSINGEN EN DOSERINGEN

Toepassingsstadium: larve. Toepassen vanaf het verschijnen van de eerste rupsen of het uitkomen van de eieren; de behandeling indien nodig herhalen. Toepassingstechniek: bespuiting.

VRIJSTELLEN

Table with 7 columns: Gewassen, Locatie, Ter bestrijding van, Toepassingsdosis per behandeling (kg/ha haag), Aantal toepassingen, Minimaal interval tussen 2 toepassingen (dagen), Risicobeperkende maatregelen (ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek).

GAOENETEELT

Table with 7 columns: Gewassen, Locatie, Ter bestrijding van, Toepassingsdosis per behandeling (kg/ha), Aantal toepassingen, Minimaal interval tussen 2 toepassingen (dagen), Risicobeperkende maatregelen (ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek).

Table with 7 columns: Gewassen, Locatie, Ter bestrijding van, Toepassingsdosis per behandeling (kg/ha), Aantal toepassingen, Minimaal interval tussen 2 toepassingen (dagen), Risicobeperkende maatregelen (ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek).

Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aanraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen. *Let op: Het aantal toepassingen wordt uitgedrukt als een aantal per teelt. Dit moet beschouwd worden als het aantal toepassingen die één prepraat kan omvatten, ongeacht de plaats waar dit plantje staat. Dus zaaiend en productieveld worden beschouwd als één teelt.

GAOENEN WAARVAN HET FRUIT WORDT GEGETEN

Table with 7 columns: Gewassen, Locatie, Ter bestrijding van, Toepassingsdosis per behandeling (kg/ha of kg/ha haag), Aantal toepassingen, Minimaal interval tussen 2 toepassingen (dagen), Risicobeperkende maatregelen (ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek).

SIERPLANTEN

Table with 7 columns: Gewassen, Locatie, Ter bestrijding van, Toepassingsdosis per behandeling (kg/100L water), Aantal toepassingen, Minimaal interval tussen 2 toepassingen (dagen), Risicobeperkende maatregelen (ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek).

Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: / De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- SPO: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPal: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme.
SPEX: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen...

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN BIJ HERBETREDING

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

BEREIDING VAN DE SPUILOPLOSSING

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder al mengende met water aanvullen.

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen. Het product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

BEHANDELLEN VAN DE LEGE VERPAKKINGEN EN DE SPUITOVERSCHOLLEN

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproei-toestel gepaakt is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank worden gegeten. De albus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingedrukt worden op een vaatwastoevoorziening...

AANWIJZINGEN BETREFFENDE DE EERSTE HULP EN VOOR DE GEENESHEER

Na in ademen: Maatregelen eerste hulp: frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Na spatten in de ogen: Maatregelen eerste hulp: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangeaste oog. Bij contactlenzen: indien mogelijk te verwijderen, verwijder eerste de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Na morsen op kleren en huid: Maatregelen eerste hulp: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder onderfussen verontreinigde kleding en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

AANWIJZINGEN VOOR DE GEENESHEER - BEHANDELING
Pneumonitis: Symptomatische behandeling. Contacteer het Antigiftcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal. Daar er tot op heden geen of zeer weinig gevallen gerapporteerd zijn bij de mens, wordt een observatie in het ziekenhuis aangeraden bij in name. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Het Antigiftcentrum: 010/245.245.

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien bij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

DipeL® DF

PROPRIETES ET MODE D'ACTION

L'insecticide biologique DipeL® DF lutte contre les chenilles défoliatrices sur diverses cultures. Il contient des spores et des cristaux de la bactérie Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki souche ABTS-251. Après ingestion du produit, les parois de l'intestin de l'chenille se perforent. Elle s'arrête alors de s'alimenter, ce qui conduit à sa mort quelques jours plus tard. Les chenilles les plus jeunes sont plus sensibles au produit que les plus âgées. Utilisez donc la dose la plus élevée du produit si les chenilles sont plus développées ou en cas d'infestation plus importante. Pour une bonne efficacité du produit, utilisez suffisamment d'eau lors de la pulvérisation afin de bien recouvrir toutes les parties de la plante. Veillez aussi à ce que la plante reste sèche pendant les 6 heures après le traitement.

USAGES ET DOSES D'EMPLOI

Stade d'application : larvaire. Traiter dès l'élosion des œufs ou l'apparition des premières larves. Répéter le traitement si nécessaire. Méthode d'application : pulvérisation.

CULTURES FRUITIÈRES

Table with 7 columns: Culture, Localisation, Pour lutter contre, Dose (kg/ha haie), Nb. d'applications, Intervalle min. entre 2 applications (jours), Mesures de réduction du risque (rapport aux eaux de surface avec technique classique).

10.75"

4.8"

PRECEC



DiPel® DF
BIOLOGICAL INSECTICIDE
DRY FLOWABLE

Biologisch insecticide ter bestrijding van rupsen in de groententeelt, fruitteelt en sierteelt (in open lucht en onder bescherming).
Insecticide biologique pour lutter contre les chenilles en cultures légumières, cultures fruitières et plantes ornementales (en plein air et sous protection).

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 54% *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, stam ABTS-351.
Granulés à disperser dans l'eau (WG) à base de 54% *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, souche ABTS-351.
Erkenningsnummer/Numéro d'agrèation: 10113P/B

IRAC 11A INSECTICIDE 5000725-02025 1 kg e

SUMITOMO CHEMICAL

Erkenningshouder/Détenteur d'agrèation:
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
10A rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Bédier-au-Mont-d'Or, France
Tel. +33 4 78 64 32 60

Valent BioSciences LLC
1910 Innovation Way, Suite 100
Libertyville, IL 60048, U.S.A.
t-800-329-9997

Verdeel door/Distributeur par:
Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2309 LC Capelle aan den IJssel, Nederland
Tel. +31(0)7839725
www.nufarm.com/be

SAI 4512046-25-02 ASO41106/R
F10000498A-02025

AgriRecover
www.agrirecover.eu

0872036428673

**VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK/
POUR USAGE PROFESSIONNEL**

Veiligheidsaanbevelingen
P260: Stof en spuitnevel niet inademen, P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen, P284: Adembescherming dragen, P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten, P308+P311: NA (mogelijke) blootstelling: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Aanvullende gevarenginformatie
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar, EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Bevat *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. Micro-organismen kunnen eventueel sensibiliserende reacties uitlokken.
Conseils de prudence
P260: Ne pas respirer les poussières et les brumes de pulvérisation. P280: Porter des gants de protection et des vêtements de protection, P284: Porter un équipement de protection respiratoire. P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. P308+P311: EN CAS D'exposition prouvée ou suspectée : Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
Informations additionnelles sur les dangers
EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande. EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Contient du *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. Les micro-organismes peuvent avoir le potentiel de provoquer des réactions de sensibilisation.
Lees aandachtig het etiket voor gebruik/Lire attentivement l'étiquette avant usage.

UFI: CV10-V10H-300G-QVFM

OPEN
HERECYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK
DIELINE (NO PRINT)GTIN:
Lotnummer/N° de lot:
Productiedatum/Date de production: