

NeemAzal® T/s

Insecticide voor appel en diverse andere fruitbomen, braam- en frambozenstruiken, bessen, aardappel, sierplanten, boomkwekerij, vruchtgroenten, kruiden, karwij, eetbare bloemen, bosuien, sluit- en spruitkool, spinazie en warmoes, asperge en prei.

Insecticide pour pommiers et autres arbres fruitiers, mûres et framboises, baies différentes, les pommes de terre, plantes ornementales, pépinières d'arbustes et d'arbres, légumes fruitiers, herbes, carvi, fleurs comestibles, oignons de printemps, choux pommés et chou de Bruxelles, épinard et bette, asperge et poireau.



www.agrirecover.eu

Nufarm

Grow a better tomorrow

5L

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Nederland
Tel.: 0031-10-3037725
www.nufarm.com/be

510010023_112024

NeemAzal® T/s

Insecticide voor appel en diverse andere fruitbomen, braam- en frambozenstruiken, bessen, aardappel, sierplanten, boomkwekerij, vruchtgroenten, kruiden, karwij, eetbare bloemen, bosuien, sluit- en spuitkool, spinazie en warmoes, asperge en prei.

Insecticide pour pommiers et autres arbres fruitiers, mûres et framboises, baies différentes, les pommes de terre, plantes ornementales, pépinières d'arbustes et d'arbrades, légumes fruitiers, herbes, carvi, fleurs comestibles, oignons de printemps, choux pommés et chou de Bruxelles, épinard et bette, asperge et poireau.

NEEMAZAL-T/S					
Toelatingsnummer: 10051P/B Werkzame stof: Azadirachtine Gehalte: 10 g/l Formuleringstype: (EC) emulgeerbaar concentraat Lotnummer: zie verpakking UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK		Numéro d'autorization: 10051P/B Ingredient active: Azadirachtine Teneur: 10 g/l Type de formulation: Concentré émulsionnable N° de lot: voir emballage EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL		Zulassungsnummer: 10051P/B Wirkstoff: Azadirachtine Gehalt: 10 g/l Formulierung: Emulsionskonzentrat Chargennummer: Siehe Verpackung NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.	
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.		
P235 P402 P280 P391	Koel bewaren. Op een droge plaats bewaren. Beschermende handschoenen dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen.	Tenir au frais. Stocker dans un endroit sec. Porter des gants de protection. Recueillir le produit répandu.	Kühl halten. An einem trockenen Ort aufbewahren Schutzhandschuhe tragen. Verschüttete Mengen aufnehmen.		
EUH208	Bevat azadirachtine . Kan een allergische reactie veroorzaken.	Contient de l'azadirachtine . Peut produire une réaction allergique.	Enthält Azadirachtine . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.		
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.		
EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.		



Erkenningshouder/Détenteur d'agrément
Trifolio-M GmbH
Dr.-Hans-Wilhem-Weg 1
35633 Lahnau
Duitsland / Allemagne
Tel: +49 (0)6441 20977-0



www.agrirecover.eu

®: Geregistreerd handelsmerk van / Marque enregistrée Trifolio-M GmbH

5L^e

510009060_052026

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Nederland
Tel.: 0031-10-3037725
www.nufarm.com/be



0 87 20364 28269 1

NeemAzal® -T/S

Eigenschappen en werkwijze

NeemAzal®-T/S is een insecticide dat o.a. een werkingsmechanisme heeft dat inwerkt op de vervelling. Hierdoor worden vooral larvale stadia van insecten bestreden.

Toepassingsstijdstip en doseringen Appelbomen (open lucht)

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*).
Toepassingsstadium: roze knopstadium: verlengden kroonbladeren; kelkbladeren lichtjes geopend;
kroonbladeren zichtbaar - einde bloei: alle kroonbladeren gevallen (BBCH 57-69)
Toepassingsstechniek: bespuiting.
Toepassingsstadium: bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 2,25 l/ha haag, 1 toepassing per 12 maanden.
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 30 m ten opzichte van oppervlaktewater met 90% drijfducerende techniek.

Aardappelen (open lucht)

Ter bestrijding van: coloradokever (*Leptinotarsa decemlineata*)
Toepassingsstechniek: bespuiting
Toepassingsstadium: larve
Dosis: 2,5 l/ha.
Maximum aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/ 12 maanden.
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Spruitkool (open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), koolwittevlieg (*Aleurodes prolella*), trips (*Thysanoptera*) bladvreterende rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Pieris* / ...) en mineervliegen (*Agromyzidae*).
Toepassingsstechniek: bespuiting.
Dosis: 3 l/ha.
Aantal toepassing(en): 1-3 toepassingen met een interval van ten minste 7 dagen tussen twee toepassingen.
Max. aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt.
Wachtijd voor de oogst: 3 dagen.
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Voor alle gewassen behalve appelbomen, spruitkool en aardappelen: UITBREIDING VAN DE TOELATING VOOR KLEINE TOEPASSINGEN (in toepassing van Artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1107/2009). Voor deze uitbreidingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheids- en fytoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

Sierplanten (open lucht)

Ter bestrijding van: spintmijten (*Tetranychidae*), bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*), witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*), trips (*Thysanoptera*).
Toepassingsstechniek: bespuiting
Toepassingsstadium: bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 3 l/ha
Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een interval van ten minste 7 dag(en) tussen twee toepassingen.
Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassingen(en)/12 maanden.
Ter bestrijding van haantjes (*Chysomelidae*).
Dosis: 3 l/ha.
Aantal toepassingen: 1 tot 2 met een interval van ten minste 7 dag(en) tussen twee toepassingen.
Risicobeperkende maatregelen in open lucht: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.
Waarschuwing(en):
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): /
De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.
Sierplanten (onder bescherming)
Ter bestrijding van: spintmijten (*Tetranychidae*), bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*), witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*) en trips (*Thysanoptera*).
Toepassingsstechniek: bespuiting
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassingen(en)/12 maanden.
Toepassingsstadium: bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 3 l/ha
Aantal toepassingen: 1 toepassing.
Ter bestrijding van haantjes (*Chysomelidae*):
Dosis: 3 l/ha.
Aantal toepassingen 1 tot 2 met een interval

van ten minste 7 dag(en) tussen twee toepassingen.
Risicobeperkende maatregelen: Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.
Waarschuwing(en):
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): /
De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.
Opmerking(en):
Tijdens de toepassing, vloeistofdichte chemisch bestendige overall dragen.
Tijdens de oogst van het behandelde gewas chemisch bestendige handschoenen dragen.

Sierbomen en -heesters, sierplanten (niet houtachtig) (onder bescherming)

Ter bestrijding van: spintmijten (*Tetranychidae*), bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*), witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*), trips (*Thysanoptera*), bladvreterende rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Pieris* / ...) en mineervliegen (*Agromyzidae*)
Toepassingsstechniek: bespuiting
Dosis: 0,375 l/100 l
Aantal toepassingen: 6 blok(ken) toe te passen in blokken van opeenvolgende toepassingen 1-3 toepassingen per blok met een interval van 7 dag(en) tussen twee toepassingen binnen een blok Met een interval van ten minste 42 dag(en) tussen twee blokken.
Maximaal aantal toepassingen: 18 toepassingen(en)/12 maanden.
Risicobeperkende maatregelen: Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.
Waarschuwing(en):
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): /
De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.
Opmerking(en):
Tijdens de toepassing, vloeistofdichte chemisch bestendige overall dragen.
Tijdens de oogst van het behandelde gewas chemisch bestendige handschoenen dragen.
Abrikoos, kersen-, krieken-, perzik-, nectarine- en pruimenbomen (open lucht)
Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*) en wintervlinders (*Geometridae*).

Toepassingstechniek: bespuiting.

Dosis: 2,25 l/ ha haag.

Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een interval van ten minste 7 dagen tussen twee toepassingen.

Maximum aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/ 12 maanden

Wachtijd voor de oogst: 7 dagen.

Risicobepalende maatregelen:

Bufferzone van 30 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Aardbeiplanten (productieveld en selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingstadium: \geq BBCH 57 (verschijnen eerste bloemknoppen (nog gesloten))

Toepassingstechniek: bespuiting

Dosis: 3 l/ha

Wachtijd voor de oogst (bij gewastype productieveld): 3 dagen

Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een interval van ten minste 7 dagen tussen twee toepassingen.

Risicobepalende maatregelen in open lucht: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Aardbeiplanten (productieveld en selectie- en vermeerderingsveld) (onder bescherming)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Wachtijd voor de oogst (bij gewastype productieveld): 3 dagen.

Toepassingstadium: \geq BBCH 57 (verschijnen eerste bloemknoppen (nog gesloten))

Toepassingstechniek: bespuiting

Dosis: 3 l/ha

Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een interval van ten minste 7 dagen tussen twee toepassingen.

Risicobepalende maatregelen: Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater. Tijdens de toepassing, vloeistofdichte chemisch bestendige overall dragen.

Braam- en frambozenstruiken (onder bescherming)

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*) en wintervlinders (*Geometridae*).

Toepassingstadium:

- Frambozenstruiken: knoppen knikkend en gedeeltelijk roodachtig verkleurd (\geq BBCH 57).

- Braamstruiken: eerste bloemknoppen gescheiden op verlengde tros (\geq BBCH 57).

Toepassingstechniek: bespuiting.

Dosis: 1,5 l/ha haag.

Aantal toepassingen: 1-2 toepassingen met een interval van ten minste 7 dagen tussen twee toepassingen.

Maximum aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/ 12 maanden

Wachtijd voor de oogst: 3 dagen.

Risicobepalende maatregelen: Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Tijdens de toepassing, vloeistofdichte chemisch bestendige overall dragen.

Braam- en frambozenstruiken (open lucht)

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*) en wintervlinders (*Geometridae*).

Toepassingstadium:

- Frambozenstruiken: knoppen knikkend en gedeeltelijk roodachtig verkleurd (\geq BBCH 57).

- Braamstruiken: eerste bloemknoppen gescheiden op verlengde tros (\geq BBCH 57).

Toepassingstechniek: bespuiting.

Dosis: 1,5 l/ha haag.

Aantal toepassingen: 1-2 toepassingen met een interval van ten minste 7 dagen tussen twee toepassingen.

Maximum aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/ 12 maanden

Wachtijd voor de oogst: 7 dagen.

Risicobepalende maatregelen: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Blauwe en rode bosbessen, veen- en aalbesen (witte, rode en zwarte), stekelbes (kruisbes) en kruisingen (onder bescherming)

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*) en wintervlinders (*Geometridae*).

Toepassingstadium: eerste bloemknoppen gescheiden op verlengde tros (\geq BBCH 57).

Toepassingstechniek: bespuiting.

Dosis: 1,5 l/ha haag.

Aantal toepassingen: 1-2 toepassingen met een interval van ten minste 7 dagen tussen twee toepassingen.

Maximum aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/ 12 maanden

Wachtijd voor de oogst: 7 dagen.

Risicobepalende maatregelen: Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Tijdens de toepassing, vloeistofdichte chemisch bestendige overall dragen.

Blauwe en rode bosbessen, veen- en aalbesen (witte, rode en zwarte), stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht)

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*) en wintervlinders (*Geometridae*).

Toepassingstadium: eerste bloemknoppen gescheiden op verlengde tros (\geq BBCH 57).

Toepassingstechniek: bespuiting.

Dosis: 1,5 l/ha haag.

Aantal toepassingen: 1-2 toepassingen met een interval van ten minste 7 dagen tussen twee toepassingen.

Maximum aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/ 12 maanden

Wachtijd voor de oogst: 7 dagen.

Risicobepalende maatregelen: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Bosuien (lente-ui) (open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*), trips (*Thysanoptera*), bladretende rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Pieris*...), preimot (*Acrolepia assectella*) en mineervliegen (*Agromyzidae*).

Toepassingstechniek: bespuiting.

Dosis: 3 l/ha.

Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een minimum interval van 7 dagen tussen twee toepassingen.

Maximum aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt.

Wachtijd voor de oogst: 28 dagen.

Risicobepalende maatregelen: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Tomaten, paprika/spaanse peper, aubergine/ eierplant, pepino, komkommer, augurk en courgette/patison (onder bescherming)

Ter bestrijding van spinthuisjes (*Tetranychidae*), bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*), trips (*Thysanoptera*), bladretende rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Pieris*...) en mineervliegen (*Agromyzidae*).

Toepassingstechniek: bespuiting.

Dosis per behandelings: 0,8-1,2 l/ha haag.

Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een minimum interval van 7 dagen tussen twee toepassingen.

Maximum aantal toepassingen: 3 toepassingen/teelt.
Wachttijd voor de oogst: 3 dagen.
Risicobeperkende maatregelen: Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), koolwittevlieg (*Aleurodes prolella*), trips (*Thysanoptera*) bladvtretende rupsen (*Mamestra/Spodoptera/Autographa/Orthosia/Thaumetopoeidae/Pieris/...*), mineervliegen (*Agromyzidae*).
Toepassingstechniek: bespuiting.
Toepassingstadium: begin vorming van de kool, 2 jongste bladeren nog niet ontvouwen (≥ BBCH 41)
Dosis: 3 l/ha.
Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een minimum interval van 7 dagen tussen twee toepassingen.
Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt.
Wachttijd voor de oogst: 3 dagen.
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.
Opmerking: De bladeren kunnen niet aan dieren worden gevoerd.

Spinazie en warmoes (snijbiet) (open lucht):

Ter bestrijding van spintmijten (*Tetranychidae*), bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum/Bemisia tabaci*), trips (*Thysanoptera*), bladvtretende rupsen (*Mamestra/Spodoptera/Autographa/Orthosia/Thaumetopoeidae/Pieris/...*) en mineervliegen (*Agromyzidae*).
Toepassingstadium: 10 % van variëteitspecifieke bladmassa bereikt (≥ BBCH 41).
Toepassingstechniek: bespuiting.
Dosis: 3 l/ha.
Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een minimum interval van 7 dagen tussen twee toepassingen.
Maximum aantal toepassingen: 3 toepassingen/teelt.
Wachttijd voor de oogst: 7 dagen.
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.
Waarschuwing in warmoes (snijbiet):
Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Groengeoogste erwten (met en zonder peul), vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-, ...) (groengeoogst, zonder peul) (open lucht)

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*) en bladvtretende rupsen (*Mamestra/Spodoptera/Autographa/Orthosia/Thaumetopoeidae/Pieris/...*)
Toepassingstechniek: bespuiting.
Dosis: 2,5 l/ha.
Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een minimum interval van 7 dagen tussen twee toepassingen.
Maximum aantal toepassingen: 3 toepassingen/teelt.
Wachttijd voor de oogst: 14 dagen.
Risicobeperkende maatregelen: in open lucht: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Asperge (open lucht):

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae, Lachnidae, Callaphididae*), bladvtretende rupsen (*Mamestra/Spodoptera/Autographa/Orthosia/Thaumetopoeidae/Pieris/...*), aspergevlieg (*Platyparea poeciloptera*), haantjes (*Chrysomelidae*) en aspergekevers (*Crioceris*).
Toepassingstechniek: bespuiting.
Toepassingstadium: na de oogst.
Dosis: 3 l/ha.
Aantal toepassingen: 1 tot 2 toepassingen met een minimum interval van 7 dagen tussen twee toepassingen.
Maximum aantal toepassingen: 2 toepassingen/teelt.
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Prei (productieveld en zaaiBED) (open lucht):

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae, Lachnidae, Callaphididae*), witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum/Bemisia tabaci*), trips (*Thysanoptera*), bladvtretende rupsen (*Mamestra/Spodoptera/Autographa/Orthosia/Thaumetopoeidae/Pieris/...*), preimot (*Acrolepia assectella*), mineervliegen (*Agromyzidae*).
Toepassingstechniek: bespuiting.
Dosis: 3 l/ha.
Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een interval van ten minste 7 dag(en) tussen twee toepassingen.
Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassingen/teelt.
Wachttijd voor de oogst (bij gewastype: productieveld): 28 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Karwij (consumptie vruchten en bladeren, bessen en/of zaden) (open lucht en onder bescherming):

Ter bestrijding van spintmijten (*Tetranychidae*), bladluizen (*Aphididae, Lachnidae, Callaphididae*), witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum/Bemisia tabaci*), trips (*Thysanoptera*), bladvtretende rupsen (*Mamestra/Spodoptera/Autographa/Orthosia/Thaumetopoeidae/Pieris/...*) en mineervliegen (*Agromyzidae*).
Toepassingstechniek: bespuiting.
Dosis: 3,0 l/ha.
Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een minimum interval van 7 dagen tussen twee toepassingen.
Maximum aantal toepassingen: 3 toepassingen/teelt.
Wachttijd voor de oogst: 14 dagen.
Risicobeperkende maatregelen: in open lucht: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.
Risicobeperkende maatregelen onder bescherming: Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.
Waarschuwing: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Dille, grote engelwortel, kervel, koriander, lavas / maggiant, roomse kervel, dragon, hysof, citroenmelisse, basilicum, tijm, laurier, marjolein / oregano (consumptie bladeren) (open lucht en onder bescherming):

Ter bestrijding van spintmijten (*Tetranychidae*), bladluizen (*Aphididae, Lachnidae, Callaphididae*), witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum/Bemisia tabaci*), trips (*Thysanoptera*), bladvtretende rupsen (*Mamestra/Spodoptera/Autographa/Orthosia/Thaumetopoeidae/Pieris/...*) en mineervliegen (*Agromyzidae*).
Toepassingstechniek: bespuiting.
Dosis: 3,0 l/ha.
Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een minimum interval van 7 dagen tussen twee toepassingen.
Maximum aantal toepassingen: 3 toepassingen/teelt.
Wachttijd voor de oogst: 14 dagen.
Risicobeperkende maatregelen: in open lucht: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Risicobeperkende maatregelen onder bescherming: Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater. Waarschuwing: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Eetbare bloemen (consumptie bloemen) (open lucht en onder bescherming):

Ter bestrijding van spintmijten (*Tetranychidae*), bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum*/*Bemisia tabaci*), trips (*Thysanoptera*), bladvreterende rupsen (*Mamestra/Spodoptera*/*Autographa*/*Orthosia*/*Thaumetopoeidae*/*Pieris*/...) en mineervliegen (*Agromyzidae*).

Toepassingstechniek: bespuiting.

Dosis: 3,0 l/ha.

Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een minimum interval van 7 dagen tussen twee toepassingen.

Maximum aantal toepassingen: 3 toepassingen/teelt.

Wachtijd voor de oogst: 14 dagen.

Risicobeperkende maatregelen in open lucht:

Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Risicobeperkende maatregelen onder bescherming: Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater. Waarschuwing: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Peterselie, munt, marjolein/oregano, salie, bonenkruid, rozemarijn (consumptie bladeren) (open lucht):

Ter bestrijding van spintmijten (*Tetranychidae*), bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum*/*Bemisia tabaci*), trips (*Thysanoptera*), bladvreterende rupsen (*Mamestra/Spodoptera*/*Autographa*/*Orthosia*/*Thaumetopoeidae*/*Pieris*/...) en mineervliegen (*Agromyzidae*).

Toepassingstechniek: bespuiting.

Dosis: 3,0 l/ha.

Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een minimum interval van 7 dagen tussen twee toepassingen.

Maximum aantal toepassingen: 3 toepassingen/teelt.

Wachtijd voor de oogst: 14 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing: Om gewasbeschadiging te

voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Postelein (consumptie bladeren) (open lucht):

Ter bestrijding van spintmijten (*Tetranychidae*), bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum*/*Bemisia tabaci*), trips (*Thysanoptera*), bladvreterende rupsen (*Mamestra/Spodoptera*/*Autographa*/*Orthosia*/*Thaumetopoeidae*/*Pieris*/...) en mineervliegen (*Agromyzidae*).

Toepassingsstadium: 10 % van variëteitspecifieke bladmassa bereikt (≥ BBCH 41).

Toepassingstechniek: bespuiting.

Dosis: 3,0 l/ha.

Aantal toepassingen: 1-3 toepassingen met een minimum interval van 7 dagen tussen twee toepassingen.

Maximum aantal toepassingen: 3 toepassingen/teelt.

Wachtijd voor de oogst: 7 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Bijzondere toepassingsvoorwaarden

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

- SPe2 : Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.

- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is

het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloestofdicht schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

- Aanbevelingen in verband met de bewaring en houdbaarheid van het product worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder/vergunningshouder.

- Het bewaren van het product bij temperaturen lager dan 10 °C kan leiden tot de vorming van neerslag. Deze neerslag verdwijnt wanneer het product kort wordt verwarmd (25-30 °C), zonder verlies aan werkzaamheid.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewasbehandeling of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Bereiding van de spuitoplossing

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder met water aanvullen. Bij voorkeur minimaal 500 L/ha water gebruiken.

Behandelen van de lege verpakkingen en de spuitoverschotten

De zorgvuldig geleegde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeiotoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelingspunt.

De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Algemene voorschriften

- Tijdens het spuiten is het aan te raden om de spuitvloeistof (het middel plus water) te roeren.

- **Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.**

Eerste-hulpmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTI-GIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTI-GIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts: / Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245

Waarborg

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien bij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

NeemAzal® -T/S

Propriétés et mode d'action

NeemAzal®-T/S est un insecticide qui agit entre autre sur les différentes mues des insectes. Par conséquence les stades larvaires des insectes sont bien contrôlés.

Usages et doses d'emploi

Pommiers (plein air):

Pour lutter contre: pucerons (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*).

Stade d'application: stade bouton rose: les pétales s'allongent, les sépales s'ouvrent légèrement et les pétales sont visibles - fin de la floraison: tous les pétales sont tombés (BBCH 57-69).

Méthode d'application: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 1 application/12 mois.

Stade d'application: aux premiers signes

d'infestation.

Dose: 2,25 l/ha haie.

Nombre d'applications: 1.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 30 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 90%.

Pommes de terre (plein air):

Pour lutter contre: doryphore de la pomme de terre (*Leptinotarsa decemlineata*).

Stade d'application: larvaire.

Méthode d'application: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 1 application/12 mois.

Dose: 2,5 l/ha.

Nombre d'applications: 1.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Chou de Bruxelles (plein air):

Pour lutter contre: les pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), mouche blanche du chou (*Aleurodes proletella*), thrips (*Thysanoptera*), chenilles défoliatrices

(*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* /

Onthosa / *Thaumetopoeidae* / *Pieris* / ...) et

mouches mineuses (*Agromyzidae*).

Méthode: pulvérisation.

Dose par traitement: 3 l/ha.

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jours entre deux applications.

Nombre maximum d'applications: 3 application(s)/culture.

Délai avant la récolte: 3 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour toutes les cultures sauf les pommiers, les choux de Bruxelles et les pommes de terre:

EXTENSION DE L'AUTORISATION POUR DES UTILISATIONS MINEURES (en application de l'article 51 du Règlement (CE) No 1107/2009). L'usage du produit pour ces extensions tombe sous la responsabilité de l'utilisateur. En raison du nombre limité de données évaluées concernant l'efficacité et la phytotoxicité, il est conseillé d'effectuer un test avant l'utilisation du produit.

Plantes ornementales (plein air)

Pour lutter contre: acariens tétranyches

(*Tetranychidae*), pucerons (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*), mouches blanches

/ aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia*), et thrips (*Thysanoptera*).

Méthode d'application: pulvérisation

Nombre maximal d'applications: 3 application(s)/12 mois.

Stade d'application: aux premiers signes d'infestation.

Dose par traitement: 3 l/ha

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Pour lutter contre: Chrysomèles

(*Chrysomelidae*)

Dose: 3 l/ha.

Nombre d'applications: 1-2 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Avertissement: Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur l'(les) espèce(s) suivant(les): /

Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec

ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Plantes ornementales (sous protection)

Pour lutter contre: acariens tétranyches

(*Tetranychidae*), pucerons (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*), mouches blanches

/ aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia*) et thrips (*Thysanoptera*).

Méthode d'application: pulvérisation

Nombre maximal d'applications: 2 application(s)/12 mois.

Stade d'application: aux premiers signes d'infestation.

Dose par traitement: 3 l/ha

Nombre d'applications: 1 application.

Pour lutter contre: Chrysomèles (*Chrysomelidae*).

Dose: 3 l/ha

Nombre d'applications: 1-2 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Mesures de réduction du risque:

Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement: Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur l'(les) espèce(s) suivant(es): /

Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.

Remarques:

Pendant l'application, porter une combinaison de protection chimique étanche aux liquides. Lors de la récolte de la culture traitée, porter des gants résistants aux produits chimiques.

Arbres et arbustes ornementaux et plantes ornementales non ligneuses (sous protection)

Pour lutter contre: acariens tétranyques (*Tetranychidae*), pucerons (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*) mouches blanches / aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia* / *tabaci*), thrips (*Thysanoptera*), chenilles défoliatrices (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Pieris* / ...) et mouches mineuses (*Agromyzidae*).

Méthode d'application: pulvérisation

Nombre maximal d'applications: 18 application(s)/12 mois

Dose par traitement: 0,375 l/100 l

Nombre d'applications: 6 bloc(s) à appliquer en blocs d'applications successives 1-3 applications par bloc avec un intervalle de 7 jour(s) entre deux applications dans un bloc Avec un intervalle d'au moins 42 jour(s) entre deux blocs.

Avertissement

Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.

Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur l'(les) espèce(s) suivant(es): /

Mesures de réduction du risque:

Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Remarques

Pendant l'application, porter une combinaison de protection chimique étanche aux liquides.

Lors de la récolte de la culture traitée, porter des gants résistants aux produits chimiques.

Cerisiers, griottiers, pruniers, abricotiers, pêchers et nectariniers (plein air):

Pour lutter contre: pucerons (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*) et chématobie brumeuse / phalène défeuillante (*Geometridae*).

Méthode: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 3 applications/12 mois.

Dose par traitement: 2,25 l/ha haie.

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Délai avant la récolte: 7 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 30 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Fraisiers (champ de production et champ de sélection et de multiplication) (plein air):

Pour lutter contre: pucerons (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Stade d'application: ≥ BBCH 57 (apparition des premiers boutons floraux (encore fermés))

Méthode d'application: pulvérisation.

Dose par traitement: 3 l/ha.

Délai avant la récolte (en champ de production): 3 jour(s)

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Mesures de réduction des risques:

Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Fraisiers (champ de production et champ de sélection et de multiplication) (sous protection):

Pour lutter contre: pucerons (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Stade d'application: ≥ BBCH 57 (apparition des premiers boutons floraux (encore fermés))

Méthode d'application: pulvérisation.

Dose par traitement: 3 l/ha.

Délai avant la récolte (en champ de production): 3 jour(s)

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Mesures de réduction des risques: Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Remarques:

Pendant l'application, porter une combinaison de protection chimique étanche aux liquides.

Ronces (mûres) et framboisiers (plein air):

Pour lutter contre: pucerons (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*) et chématobie brumeuse / phalène défeuillante (*Geometridae*).

Méthode: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 2 applications/12 mois.

Délai avant la récolte: 7 jour(s)

Stade d'application:

- Pour framboises: les boutons s'infléchissent et sont partiellement rougeâtres (≥ BBCH 57).

- Pour ronces (mûres): les premiers boutons floraux sont séparés par l'élongation de la grappe (≥ BBCH 57).

Dose par traitement: 1,5 l/ha haie.

Nombre d'applications: 1-2 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Mesures de réduction des risques: Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Ronces (mûres) et framboisiers (sous protection):

Pour lutter contre: pucerons (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*) et chématobie brumeuse / phalène défeuillante (*Geometridae*).

Méthode: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 2 applications/12 mois.

Délai avant la récolte: 3 jour(s)

Stade d'application:

- Pour framboises: les boutons s'infléchissent et sont partiellement rougeâtres (≥ BBCH 57).

- Pour ronces (mûres): les premiers boutons floraux sont séparés par l'élongation de la grappe (≥ BBCH 57).

Dose par traitement: 1,5 l/ha haie.

Nombre d'applications: 1-2 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Mesures de réduction des risques: Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Remarques:

Pendant l'application, porter une combinaison de protection chimique étanche aux liquides.

Myrtilliers et airelliers rouges, groseilliers (blancs, rouges, cassis), groseilliers à maquereau et hybrides et airelliers canneberges (plein air):

Pour lutter contre: pucerons (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*) et chéimatomie brumeuse / phalène défeuillante (*Geometridae*).

Méthode: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 2 applications/12 mois.

Délai avant la récolte: 7 jour(s)

Stade d'application: les premiers boutons floraux sont séparés par l'élongation de la grappe (≥ BBCH 57).

Dose par traitement: 1,5 l/ha haie.

Nombre d'applications: 1-2 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Mesures de réduction des risques: Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Myrtilliers et airelliers rouges, groseilliers (blancs, rouges, cassis), groseilliers à maquereau et hybrides et airelliers canneberges (sous protection):

Pour lutter contre: pucerons (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*) et chéimatomie brumeuse / phalène défeuillante (*Geometridae*).

Méthode: pulvérisation.

Nombre maximal d'applications: 2 applications/12 mois.

Délai avant la récolte: 7 jour(s)

Stade d'application: les premiers boutons floraux sont séparés par l'élongation de la grappe (≥ BBCH 57).

Dose par traitement: 1,5 l/ha haie.

Nombre d'applications: 1-2 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Mesures de réduction des risques: Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Remarques:

Pendant l'application, porter une combinaison de protection chimique étanche aux liquides.

Tomate, aubergine et pépinos, poivron/ piment, concombre, courgette/pâtisson et cornichon (sous protection):

Pour lutter contre: acariens tétranyques (*Tetranychidae*), pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), mouches blanches / aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*), thrips (*Thysanoptera*), chenilles défoliatrices (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Pieris* / ...) et mouches mineuses (*Agromyzidae*).

Méthode: pulvérisation.

Nombre maximum d'applications: 3 applications/culture.

Dose par traitement: 0,8-1,2 l/ha haie.

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Délai avant récolte: 3 jours.

Mesures de réduction du risque: Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Choux pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de savoie) (plein air):

Pour lutter contre: pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), mouche blanche du chou (*Aleurodes proletella*), thrips (*Thysanoptera*), chenilles défoliatrices (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Pieris* / ...) et mouches mineuses (*Agromyzidae*).

Méthode: pulvérisation.

Stade d'application: début de la formation des têtes, les 2 feuilles les plus jeunes ne se déroulent pas (≥BBCH 41).

Nombre maximum d'applications: 3 applications/culture.

Dose par traitement: 3 l/ha.

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Délai avant récolte: 3 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Remarque(s): Les feuilles ne peuvent être données comme nourriture aux animaux.

Epinard et bette (blette) (plein air):

Pour lutter contre: acariens tétranyques (*Tetranychidae*), les pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), mouches blanches / aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*), thrips (*Thysanoptera*), chenilles défoliatrices (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Pieris* / ...) et mouches mineuses (*Agromyzidae*).

Méthode: pulvérisation.

Stade d'application: 10% de la masse foliaire typique pour la variété est développée (≥ BBCH 41).

Nombre maximum d'applications: 3 applications/culture.

Dose par traitement: 3 l/ha.

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Délai avant récolte: 7 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement en bette (blette): Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Oignons de printemps (plein air):

Pour lutter contre: pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), mouches blanches / aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*), thrips (*Thysanoptera*), chenilles défoliatrices (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Pieris* / ...), teigne du poireau (*Acrolepia assectella*) et mouches mineuses (*Agromyzidae*).

Méthode: pulvérisation.

Nombre maximum d'applications: 3 applications/culture.

Dose par traitement: 3 l/ha.

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Délai avant la récolte: 28 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Poireau (lit de semences et champ de production) (plein air):

Pour lutter contre: pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), mouches blanches / aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*), thrips (*Thysanoptera*), chenilles défoliatrices (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Pieris* / ...), teigne du poireau (*Acrolepia assectella*), et mouches mineuses (*Agromyzidae*).

Méthode: pulvérisation.

Nombre maximum d'applications: 3 applications/culture.

Délai avant la récolte (en champ de production): 28 jour(s)

Dose par traitement: 3 l/ha.

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Petit pois (sans cosse), pois verts (avec cosse) (mange-tout) et fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse), (plein air)

Pour lutter contre: pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), chenilles défoliatrices (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Pieris* / ...).

Méthode: pulvérisation.

Nombre maximum d'applications: 3 applications/ culture.

Délai avant la récolte: 14 jour(s)

Dose par traitement: 2,5 l/ha.

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Asperge (plein air):

Pour lutter contre: pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), mouche de l'asperge (*Platyparea poeclioplera*), chrysomèles (*Chrysomelidae*), criocères de l'asperge (*Crioceris*), chenilles défoliatrices (*Mamestra / Spodoptera / Autographa / Orthosia / Thaumetopoeidae / Pieris / ...*).

Méthode: pulvérisation.

Stade d'application: après la récolte.

Nombre maximum d'applications: 2 applications/culture.

Dose par traitement: 3 l/ha.

Nombre d'applications: 1-2 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pourpier (consommation des feuilles) (plein air):

Pour lutter contre: acariens tétranyques (*Tetranychidae*), pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), mouches blanches / aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum / Bemisia tabaci*), thrips (*Thysanoptera*), chenilles défoliatrices (*Mamestra / Spodoptera / Autographa / Orthosia / Thaumetopoeidae / Pieris / ...*) et mouches mineuses (*Agromyzidae*).

Méthode: pulvérisation.

Stade d'application: 10% de la masse foliaire typique pour la variété est développée (≥ BBCH 41).

Nombre maximum d'applications: 3 applications/culture.

Dose par traitement: 3 l/ha.

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Délai avant récolte: 7 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement: Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Persil, menthe, origan/marjolaine, sauge officinale, sarriette des jardins, romarin (consommation des feuilles) (plein air):

Pour lutter contre: acariens tétranyques (*Tetranychidae*), pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), mouches blanches / aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum / Bemisia tabaci*), thrips (*Thysanoptera*), chenilles défoliatrices (*Mamestra / Spodoptera / Autographa / Orthosia / Thaumetopoeidae / Pieris / ...*) et mouches mineuses (*Agromyzidae*).

Méthode: pulvérisation.

Nombre maximum d'applications: 3 applications/culture.

Dose par traitement: 3 l/ha.

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Délai avant récolte: 14 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement: Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Carvi (consommation des fruits, baies et/ou graines) (plein air et sous protection):

Pour lutter contre: acariens tétranyques (*Tetranychidae*), pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), mouches blanches / aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum / Bemisia tabaci*), thrips (*Thysanoptera*), chenilles défoliatrices (*Mamestra / Spodoptera / Autographa / Orthosia / Thaumetopoeidae / Pieris / ...*) et mouches mineuses (*Agromyzidae*).

Méthode: pulvérisation.

Nombre maximum d'applications: 3 applications/culture.

Dose par traitement: 3 l/ha.

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Délai avant récolte: 14 jours.

Mesures de réduction du risque (plein air):

Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement: Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Mesures de réduction du risque (sous protection): Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Aneth, angélique, cerfeuil, carvi, coriandre, livèche, cerfeuil musqué, estragon, hysope, mélisse, basilic, thym, laurier (consommation des feuilles) (plein air et sous protection):

Pour lutter contre: acariens tétranyques (*Tetranychidae*), pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), mouches blanches / aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum / Bemisia tabaci*), thrips (*Thysanoptera*), chenilles défoliatrices (*Mamestra / Spodoptera / Autographa / Orthosia / Thaumetopoeidae / Pieris / ...*) et mouches mineuses (*Agromyzidae*).

Méthode: pulvérisation.

Nombre maximum d'applications: 3 applications/culture.

Dose par traitement: 3 l/ha.

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Délai avant récolte: 14 jours.

Mesures de réduction du risque (plein air): Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Mesures de réduction du risque (sous protection): Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement: Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Fleurs comestibles (plein air et sous protection):

Pour lutter contre: acariens tétranyques (*Tetranychidae*), pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*), mouches blanches / aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum / Bemisia tabaci*), thrips (*Thysanoptera*), chenilles défoliatrices (*Mamestra / Spodoptera / Autographa / Orthosia / Thaumetopoeidae / Pieris / ...*) et mouches mineuses (*Agromyzidae*).

Méthode: pulvérisation.

Nombre maximum d'applications: 3 applications/culture.

Dose par traitement: 3 l/ha.

Nombre d'applications: 1-3 applications avec un intervalle d'au moins 7 jour(s) entre deux applications.

Délai avant récolte: 14 jours.

Mesures de réduction du risque (plein air): Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Mesures de réduction du risque (sous protection): Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement: Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé

de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Conditions particulières d'application

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SPe2: Pour protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme «sterk erosiegevoelig». Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en oeuvre.
- SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
- SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.
- Porter toujours un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.
- Les recommandations relatives au stockage et à la conservation de ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.
- Le stockage à une température inférieure à 10°C, peut conduire à la formation d'un précipité. Ce précipité disparaît lorsque le produit est chauffé brièvement (à 25-30°C), sans aucune perte de l'efficacité du produit.

Mesures de précaution avant la rentrée en cultures sous protection

Ventiler jusqu'au séchage du produit pulvérisé avant de rentrer. D'autres travaux peuvent être effectués par la suite sans l'utilisation de mesures de protection

Préparation de la bouillie

Remplir la cuve à moitié d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve. Utilisez de préférence un minimum de 500 L d'eau par hectare.

Traitement des emballages vides et les surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau manuellement (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de rinçage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Mesures de précaution

- Il est souhaitable d'agiter le liquide de pulvérisation (le produit et eau) pendant la pulvérisation.
- **Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.**

Conseils de premiers secours

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarques pour le médecin: /

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

Garantie

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant aux résultats insuffisants et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur assume seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

NeemAzal® T/s

Insecticide voor appel en diverse andere fruitbomen, braam- en frambozenstruiken, bessen, aardappel, sierplanten, boomkwekerij, vruchtgroenten, kruiden, karwij, eetbare bloemen, bosuien, sluit- en spuitkool, spinazie en warmoes, asperge en prei.

Insecticide pour pommiers et autres arbres fruitiers, mûres et framboises, baies différentes, les pommes de terre, plantes ornementales, pépinières d'arbustes et d'arbres, légumes fruitiers, herbes, carvi, fleurs comestibles, oignons de printemps, choux pommés et chou de Bruxelles, épinard et bette, asperge et poireau.

NEEMAZAL-T/S Toelatingsnummer: 10051P/B Werkzame stof: Azadirachtine Gehalte: 10 g/l Formuleringstype: (EC) emulgeerbaar concentraat Lotnummer: zie verpakking UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK		Numéro d'autorization: 10051P/B Ingredient active: Azadirachtine Teneur: 10 g/l Type de formulation: Concentré émulsionnable N° de lot: voir emballage EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL		Zulassungsnummer: 10051P/B Wirkstoff: Azadirachtine Gehalt: 10 g/l Formulierung: Emulsionskonzentrat Chargennummer: Siehe Verpackung NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.	
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.		
P235 P402 P280 P391	Koel bewaren. Op een droge plaats bewaren. Beschermende handschoenen dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen.	Tenir au frais. Stocker dans un endroit sec. Porter des gants de protection. Recueillir le produit répandu.	Kühl halten. An einem trockenen Ort aufbewahren Schutzhandschuhe tragen. Verschüttete Mengen aufnehmen.		
EUH208	Bevat azadirachtine . Kan een allergische reactie veroorzaken.	Contient de l'azadirachtine . Peut produire une réaction allergique.	Enthält Azadirachtine . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.		
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.		
EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.		

Erkenningshouder/Détenteur d'agrément
Trifolio-M GmbH
Dr.-Hans-Wilhem-Weg 1
35633 Lahnau
Duitsland / Allemagne
Tel: +49 (0)6441 20977-0



*: Geregistreerd handelsmerk van / Marque enregistrée Trifolio-M GmbH

5L^e

510009060_052026

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Nederland
Tel.: 0031-10-3037725
www.nufarm.com/be



0 87 20364 28269 1



SPECIMEN