

CLINIC XPERT

ERBICID TOTAL



Conține: 360 g/l glifosat
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 243PC/20.10.2016

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

Clinic Xpert se prezintă sub formă concentrat solubil (SL), omogen, mobil, de culoare portocalie - maronie, fără miros, ce conține 360 g/l glifosat acid din sare de izopropilamină.

MOD DE ACȚIUNE

Clinic Xpert este un erbicid total, neselectiv, cu acțiune sistemică ce controlează toate speciile de buruieni anuale și perene apărute înainte de însămânțare, plantare sau recoltare. Absorbit prin frunze și transmis cu rapiditate (în câteva ore) în toate organele plantei, inclusiv în rădăcini, stoloni și rizomi, **Clinic Xpert** distruge în totalitate părțile aeriene și subterane ale buruienilor vizate.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

CULTURA	BURUIENI COMBĂTUTE	DOZA	MOMENTUL APLICĂRII
Grâu, orz, grâu durum, ovaz	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	4 l/ha	Se aplică cu 7 zile înainte de recoltare
Grâu, orz, ovăz, rapiță, muștar, sfecla de zahăr, inul pentru sămânță. Ceapa pentru bulbi, mazare de camp, praz.		1.5 l/ha	Se aplică înainte de răsărirea culturii
Inul pentru sămânță, rapița		4 l/ha	Se aplică cu 14 zile înainte de recoltare
Muștar		4 l/ha	Se aplică cu 8 zile înainte de recoltare
Sparanghel		5 l/ha	Se aplică înainte de rasarire
Miriște (toate culturile comestibile și necomestibile)		4 l/ha/an	Se aplică cu 5 zile înainte de însămânțarea sau plantarea culturii următoare
Miriște (toate culturile comestibile și necomestibile)		1.5 l/ha/an	Se aplică cu 2 zile înainte de însămânțarea sau plantarea culturii următoare
Pășune		6 l/ha/an	Se aplică cu 5 zile înainte de recoltat sau discuit
Culturi comestibile și necomestibile		5 l/ha	Se aplică înainte de plantare sau însămânțare
Măr, Păr		5 l/ha	Se aplică după recoltare și până înainte de stadiul de buton verde
Cireș, Prun	5 l/ha	Se aplică după recoltare și până înainte de stadiul de buton alb	
Păduri și pepiniere		10 l/ha	

CLINIC XPERT

ERBICID TOTAL



MOMENTUL APLICĂRII

Erbicidul **Clinic Xpert**, fiind un erbicid neselectiv, se aplică în vegetatie, când buruienile anuale sunt răsărite în proporție de peste 70% și sunt în stadiul de dezvoltare (frunza de cel puțin 5 cm în cazul buruienilor monocotiledonate și 2 frunze adevărate expandate în cazul buruienilor dicotiledonate). Buruienile dicotiledonate perene sunt mult mai sensibile la aplicarea tratamentului cu **Clinic Xpert** dacă acestea sunt în faza de creștere activă.

După aplicarea tratamentului trebuie să treacă o perioadă de minimum 6 ore (preferabil 24 de ore) fără precipitații sau irigații.

Primele simptome (îngălbenire și înroșire) apar după 5-7 zile, iar după 14-17 zile frunzele și lăstarii se necrozează. Efectul maxim (uscarea totală a plantei) se înregistrează după 20-25 de zile de tratament.

În sol, erbicidul se biodegradează într-un timp foarte scurt, ceea ce determină lipsa efectului remanent pentru culturile postmergătoare.

Stabilirea dozei optime la hectar se face în funcție de spectrul și dominanța buruienilor, talia buruienilor, condițiile climatice existente înainte și după tratament.

La temperaturi și umiditate relativă a aerului mai ridicate, efectul de combatere este mai rapid, spre deosebire de condițiile de secetă și umiditate scăzute, când efectul asupra buruienilor este mai redus.

În situații în care buruienile sunt stresate termic sau hidric sau acestea sunt în stadiu mai avansat de dezvoltare, **erbicidul se aplică asociat cu un adjuvant**.

Se va evita driftul la aplicarea tratamentului pentru protejarea culturilor învecinate.

Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate anuale, acestea trebuie să aibă cca. 5 cm sau 2 frunze adevărate bine dezvoltate.

Aplicarea pe miriști.

După recoltare, se eliberează terenul de resturi vegetale, iar când buruienile au ajuns la înălțimea de 15 – 25 cm se va aplica tratamentul cu **Clinic Xpert**.

IMPORTANT!

- **Clinic Xpert** nu se va aplica pe timp de vânt, deoarece soluția poate ajunge pe culturile învecinate sau pe plantele de cultură, distrugându-le.
- Nu amestecați, aplicați sau păstrați produsul în containere galvanizate sau din oțel.
- Nu lăsați soluția în rezervor pentru o perioadă lungă de timp și asigurați-vă că rezervorul este prevăzut cu agitator.
- După aplicarea tratamentului trebuie să treacă o perioadă de minim 6 ore (preferabil 24 de ore) fără precipitații sau irigații.
- Eficiența produsului scade în situația aplicării pe buruieni intrate într-un proces de uscare fiziologică sau în condiții de secetă, temperaturi ridicate, terenuri inundate.

DISTRIBUITOR

Nufarm România SRL

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow