


# APOLLO 50 SC

## INSECTICID

Certificat de omologare nr. 1137/28.03.1988  
Formulare: SC (Suspensie concentrată)  
Clasificare: N (Periculos pentru mediu)



### AGENȚI DE DĂUNARE COMBĂTUȚI

- *Panonychus ulmi* (Acarianul roșu al pomilor)
- *Tetranychus urticae* (Păianjenul roșu comun)

### MOD DE ACȚIUNE ȘI RECOMANDĂRI DE APLICARE

**APOLLO 50 SC** este un acaricid de contact acționând în principal ca ovicid, cu efect și asupra formelor mobile în stadiul tânăr (larve) și cu îndelungată activitate reziduală. Atunci când este folosit singur, **APOLLO 50 SC** nu are nici un fel de activitate de combatere contra păianjenilor adulți.

Substanța activă clofentezin intervine în creșterea și diferențierea celulară în cursul fazelor finale ale dezvoltării embrionare și fazelor inițiale ale dezvoltării larvare a acarienilor. De aceea nu are activitate asupra adulților, însă datorită efectului său rezidual, în cazul aplicării pe adulți, efectul maxim de combatere se poate constata după 2 săptămâni de la tratament asupra generației următoare de acarieni.

Ca orice acaricid ovicid, se recomandă să nu se aplice mai mult de un tratament cu **APOLLO 50 SC** pe sezon, în scopul evitării apariției rezistenței.

### Pomi fructiferi

**Spectru de combatere:** Acarianul roșu al pomilor (*Panonychus ulmi*) (ouă hibernante)

**Doza omologată:** 0,04% (0,6 l/ha)

Se fac tratamente preventive contra ouălor de iarnă (*Panonychus ulmi*) înainte de eclozarea acestora. La măr, tratamentul cu **APOLLO 50 SC** se poate face începând din fenofaza de dezbugurire până la buton roz (înainte de înflorire).

La prun, tratamentul se face din faza de buton alb până la înflorirea deplină, în timp ce la piersic tratamentul se face de la căderea petalelor până la legarea fructelor.

Dacă tratamentul se face mai târziu, **APOLLO 50 SC** se va aplica împreună cu un acaricid-adul-ticid, astfel încât să se combată și formele mobile. Se folosesc volume normale de soluție și se urmărește stropirea completă a pomului (din toate părțile).

# APOLLO 50 SC

## INSECTICID

### MOD DE ACȚIUNE ȘI RECOMANDĂRI DE APLICARE (continuare)

#### Vinete, tomate, castraveți solarii

**Spectru de combatere:** Păianjenul roșu comun (*Tetranychus urticae*)

**Doza omologată:** 0,04%

Se aplică stropiri cu volum normal de soluție, la apariția primelor forme mobile de acarieni, cu mijoace terestre de pulverizare.

#### Vița de vie

**Spectru de combatere:** Păianjenul roșu comun (*Tetranychus urticae*), Acarianul roșu al pomilor (*Panonychus ulmi*) (ouă)

**Doza omologată:** 0,4 l/ha

Se fac tratamente preventive înaintea înfloritului, când de obicei apar primii adulți de *Panonychus ulmi*, asigurând o normă de 0,4 l/ha (de regulă în 1000 litri de soluție). Echipamentul de tratare trebuie să asigure o pulverizare corespunzătoare inclusiv a părților mai puțin expuse ale butucilor de vie (mai ales partea inferioară).

### DISTRIBUITOR

Nufarm România SRL  
Str. Poet Andrei Mureșanu, Nr. 11-13,  
Et 2, Ap. 3, Sector 1, București  
Tel: 0724NUFARM ; 021-2246320