


# KOHINOR 200 SL

## INSECTICID

Certificat de omologare nr. 2615/02.03.2006  
Formulare: SL (Concentrat solubil)  
Clasificare: N (Periculos pentru mediu)



### AGENȚI DE DĂUNARE COMBĂTUȚI

- *Cerosipha gossypii* (Păduchele verde)
- *Trialeurodes vaporariorum* (Musculița albă de seră)
- *Leptinotarsa decemlineata* (Gândacul din Colorado)
- Afide
- *Phyllonorycter spp.* (Minierul marmorat)
- *Athalia rosae* (Viespea rapiței)
- *Ceuthorrhynchus napi* (Gărgărița tulpinilor de rapiță)
- *Brevicoryne brassicae* (Păduchele cenușiu al verzei)
- *Myzus persicae* (Păduchele verde)
- *Thrips tabaci* (Trips)
- *Tuta absoluta* (Molia minieră a frunzelor)

### MOD DE ACȚIUNE ȘI RECOMANDĂRI DE APLICARE

**KOHINOR 200 SL** este un insecticid din grupa neonicotinoizilor cu acțiune de lungă durată în plante. Produsul se absoarbe în țesuturile plantei în circa o oră de la tratament și se translocă ascendent spre vârfurile de creștere, acționând prin contact și mai ales prin ingestie asupra dăunătorilor cu aparat bucal de supt sau de ros (afide, coleoptere, tripsi etc.). Substanța activă imidacloprid provoacă în organismul insectelor țintă perturbarea ireversibilă a funcțiilor vitale prin întreruperea activității sistemului nervos. Modul de acțiune foarte complex și diferit de al altor grupe de substanțe conferă produsului **KOHINOR 200 SL** un spectru larg de acțiune și o eficacitate remarcabilă mai ales asupra dăunătorilor rezistenți la insecticidele convenționale (organofosforice, piretroizi, etc.) și care astfel sunt greu de combătut.

Tratamentele se aplică în vegetație, la avertizare, imediat ce dăunătorul a atins valorile pragului economic de dăunare; în lipsa unui sistem/program de avertizare tratamentul se aplică la apariția primilor dăunători în cultură.

#### Ardei gras din câmp

**Spectru de combatere:** Păduchele verde (*Myzus persicae*)  
**Doza omologată:** 0,5 l/ha

#### Cartof

**Spectru de combatere:** Gândacul din Colorado (*Leptinotarsa decemlineata*), Afide  
**Doza omologată:** 0,25-0,30 l/ha (în funcție de gradul de infestare)

Folosiiți produsele pentru protecția plantelor în condiții de siguranță.  
Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

# KOHINOR 200 SL

## INSECTICID

### MOD DE ACȚIUNE ȘI RECOMANDĂRI DE APLICARE (continuare)

#### Castraveți solar

**Spectru de combatere:** Păduchele verde (*Cerosipha gossypii*)  
**Doza omologată:** 0,04% (0,4 l/ha)

**Măr** (aplicat după înflorire)

**Spectru de combatere:** Minierul marmorat (*Phyllonorycter spp.*)  
**Doza omologată:** 0,01% (0,15 l/ha în 1500 l apă)

**Rapiță** (aplicat după înflorire)

**Spectru de combatere:** Viespea rapiței (*Athalia rosae*), Gărgărița tulpinilor de rapiță (*Ceuthorrhynchus napi*)  
**Doza omologată:** 0,275 l/ha

#### Tomate în sere și solarii

**Spectru de combatere:** Molia minieră a frunzelor (*Tuta absoluta*)  
**Doza omologată:** 1,0 l/ha

#### Tomate și castraveți solarii

**Spectru de combatere:** Trips (*Thrips tabaci*)  
**Doza omologată:** 0,75 l/ha

#### Tomate solar

**Spectru de combatere:** Musculița albă de seră (*Trialeurodes vaporariorum*)  
**Doza omologată:** 0,075% (0,75 l/ha)

#### Varză

**Spectru de combatere:** Păduchele cenușiu al verzei (*Brevicoryne brassicae*)  
**Doza omologată:** 0,3 l/ha

#### Vinete din câmp

**Spectru de combatere:** Gândacul din Colorado (*Leptinotarsa decemlineata*)  
**Doza omologată:** 0,75 l/ha

#### DISTRIBUITOR

Nufarm România SRL  
Str. Poet Andrei Mureșanu, Nr. 11-13,  
Et 2, Ap. 3, Sector 1, București  
Tel: 0724NUFARM ; 021-2246320

 **Nufarm**  
Grow a better tomorrow