

ACCURATE

ERBICID SULFONILUREIC



Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 130PC/22.07.2015

CULTURA:

**CEREALE
PĂIOASE**

200

CONȚINE:

G/KG WG
METSULFURON-METIL

TIMP DE PAUZĂ:

90 de zile până la recoltare pentru cereale și 120 de zile înainte de transformarea în pasune a terenului necultivat.

MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



FORMULARE:

GRANULE DISPERSABILE
ÎN APĂ (WG)



TERMEN DE VALABILITATE



TEMPERATURA DE APLICARE



MOD DE ACȚIUNE

Accurate este un erbicid selectiv care se asimilează în principal prin frunze dar și la nivel radicular.

Eficacitatea acestui erbicid aparținând clasei sulfonilureice, constă în inhibarea enzimei acetolactat sintetază (ALS), care duce la încetarea rapidă a diviziunii celulare și implicit a procesului de creștere a buruienilor. Buruienile sunt puternic clorozate, apoi necrozate și distruse în interval de 2-4 săptămâni de la aplicare.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:



CULTURĂ	ORGANISM ȚINTĂ	DOZĂ PRODUS/HA	NR. APLICĂRI	STADIUL DE DEZVOLTARE AL CULTURII
GRÂU, DE TOAMNĂ, ORZ, SECARĂ, TRITICALE	Buruieni dicotiledonate anuale	Se aplică tratament astfel: • 20 g/ha toamnă în fenofază de 3-9 frunze	1	BBCH 13-19
		• 30 g/ha primăvară de la alungirea paiului până la apariția frunzei standard		BBCH 30-39
TERENURI NECULTIVATE	Buruieni dicotiledonate anuale	• 20 g/ha tratament postemergent în primăvară	1	



TEHNICA DE APLICARE



ACCURATE este un erbicid selectiv pentru cerealele păioase ce poate fi aplicat atât toamnă cât și primăvară pentru combaterea buruienilor cu frunză lată din cultura de cereale păioase. Eficacitatea maximă a produsului **ACCURATE** și faza optimă de aplicare este plasată între faza de înfrățire și formarea primului internod în ceea ce privește cultura tratată când buruienile sunt în faza de 2-4 frunze (faza de rozetă).

Din motive de siguranță pentru cultura următoare, aplicarea se poate face până la stadiul BBCH 39 care corespunde cu apariția frunzei standard la planta de cultură.

Pentru combaterea eficientă a turîței (*Galium aparine*) se recomandă utilizarea în amestec cu produse pe bază de fluroxipir (Tandus). Unde avem o densitate mai mare de buruieni recomandăm aplicarea în amestec cu un adjuvant (Roller).

BURUIENI COMBĂTUTE

A	<i>Apera Spica-Ventii</i> (Iarba vântului) <i>Aphanes arvensis</i> (Cretișoara)	M	<i>Myosotis arvensis</i> (Nu-mă-uita) <i>Mentha arvensis</i> (Menta sălbatică)
B	<i>Brassica napa</i> (Samulastră de rapiță convențională)	P	<i>Papaver rhoeas</i> (Mac) <i>Polygonum lapathifolium</i> (Iarba roșie) <i>Polygonum persicariae</i> (Ardeiul broaștei)
C	<i>Capsella bursa pastoris</i> (Traista ciobanului) <i>Centaurea cyanus</i> (Albăstrița) <i>Chrysanthemum segetum</i> (Vetricea) <i>Cirsium arvense</i> (Palamida)	R	<i>Raphanus raphanistrum</i> (Ridiche sălbatică) <i>Rumex spp</i> (Macris)
D	<i>Daucus carota</i> (Morcov sălbatic)	S	<i>Sinapis arvensis</i> (Muștar sălbatic) <i>Senecio vulgaris</i> (Spălăcioasa) <i>Spergula arvensis</i> (Hrana vacii) <i>Stellaria media</i> (Rocoina)
G	<i>Galeopsis spp.</i> (Lingurica)	T	<i>Thlaspi arvense</i> (Pungulița)
L	<i>Lamium spp.</i> (Urzica moartă) <i>Lapsana communis</i> (Zgrabuntica)	V	<i>Vicia spp.</i> (Mazariche) <i>Viola tricolor</i> (Trei frați pătați)
M	<i>Matricaria spp.</i> (Mușetelul sălbatic)		

ROTAȚIA CULTURILOR

După tratamentul cu **ACCURATE**, nu exista restricții cu privire la culturile ce pot fi semănate în următorul an calendaristic. După recoltarea culturii tratate cu **ACCURATE**, se pot înființa următoarele culturi: cereale, rapiță, fasole de câmp, gazon.

AVANTAJE

- Foarte selectiv pentru cerealele păioase;
- Poate fi aplicat și la temperaturi mai scăzute, de peste 5°C;
- Doză de aplicare foarte redusă;
- Spectru larg de combatere al buruienilor din cultura de cereale;
- Translocarea rapidă în plantă ce determină oprirea dezvoltării buruienilor la timp scurt după aplicare;
- Eficiența tratamentului foarte bună.