

ACCURATE EXTRA

A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ RACING EXTRA

ERBICID SULFONILUREIC



Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 099PC/21.01.2015

CULTURA:

**CEREALE
PĂIOASE**

**680
70**

CONȚINE:

G/KG TIFENSULFURON-METIL

G/KG METSULFURON-METIL

TIMP DE PAUZĂ:



**120
ZILE**

MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



FORMULARE:

GRANULE DISPERSABILE

ÎN APĂ (WG)



TERMEN DE VALABILITATE



TEMPERATURA DE APLICARE



**PESTE
5°C**

MOD DE ACȚIUNE

Cele două substanțe active (tifensulfuron-metil și metsulfuron-metil) acționează sistemic, selectiv, fiind asimilate în principal prin frunze. Eficacitatea acestora constă prin inhibarea enzimei acetolactat sintetaza (ALS), implicată în sinteza lanțurilor de amino-acizi. Inhibarea ALS duce la încetarea diviziunii celulare și implicit a procesului de creștere a buruienilor. Buruienile sunt puternic clorozate, apoi necrozate și distruse în interval de 2-4 săptămâni de la aplicare.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:

CULTURĂ	ORGANISM ȚINTĂ	DOZĂ PRODUS/HA	NR. APLICĂRI	STADIUL DE DEZVOLTARE AL CULTURII
GRÂU, TRITICALE, SECARĂ DE TOAMNĂ	Buruieni anuale cu frunză lată	• 50 g/ha - tratament postemergent în toamnă sau • 75 g/ha - tratament postemergent în primăvară	1	până la BBCH 39
ORZ DE TOAMNĂ	Buruieni anuale cu frunză lată	• 50 g/ha - tratament postemergent în toamnă sau • 60 g/ha - tratament postemergent în primăvară	1	până la BBCH 39
ORZ DE PRIMĂVARĂ	Buruieni anuale cu frunză lată	• 60 g/ha - tratament postemergent	1	până la BBCH 39





ACCURATE® EXTRA

Simptomele apar la circa 7 - 10 zile de la aplicarea tratamentului, iar combaterea completă se observă după circa 21 zile, fiind strâns legată de condițiile de creștere și competiția culturii. Produsul **ACCURATE EXTRA®** poate fi aplicat foliar cu orice echipament terestru, folosindu-se pentru prepararea soluției o cantitate de 150-200 litri de apă la hectar.

ACCURATE EXTRA® poate fi aplicat chiar și la temperaturi scăzute (4 - 5°C) fără a fi afectată eficacitatea. Pentru cereale păioase de toamnă se poate aplica cu rezultate remarcabile imediat după răsărire, mai ales când există infestare cu samulastră de rapiță sau floarea soarelui provenită de la cultura premergătoare. Unde avem o densitate mai mare de buruieni recomandăm aplicarea în amestec cu un adjuvant (Roller).

BURUIENI COMBĂTUTE

A	<i>Abutilon theophrasti</i> (Pristolnic)	M	<i>Matricaria spp.</i> (Mușetel salbatic)
	<i>Amaranthus spp.</i> (Știr)		<i>Mentha arvensis</i> (Mentă sălbatică)
	<i>Ambrosia elatior</i> (Ambrozia)		<i>Myosotis arvensis</i> (Nu-mă-uita)
	<i>Apera spica-venti</i> (Iarba vântului)		
	<i>Aphanes arvensis</i> (Crețisoară)		
B	<i>Atriplex patula</i> (Lobodă salbatică)	P	<i>Papaver rhoeas</i> (Mac)
	<i>Brassica napa</i> (Samulastră de rapiță convențională)		<i>Polygonum spp.</i> (Iarba roșie)
C	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Traista ciobanului)		<i>Polygonum persicaria</i> (Ardeiul broaștei)
	<i>Centaurea cianus</i> (Albăstriță)		<i>Portulaca oleracea</i> (Grășita)
	<i>Chenopodium spp.</i> (Lobodă)	R	<i>Raphanus raphanistrum</i> (Ridiche sălbatică)
	<i>Chrysanthemum segetum</i> (Vetricea)		<i>Rumex spp.</i> (Măcriș)
	<i>Cirsium arvense</i> (Pălămidă)	S	<i>Sinapis arvensis</i> (Muștar sălbatic)
D	<i>Daucus carota</i> (Morcov sălbatic)		<i>Senecio vulgaris</i> (Spălăcioasa)
G	<i>Galeopsis spp.</i> (Lingurica)		<i>Spergula arvensis</i> (Hrana vacii)
H	<i>Helianthus annuus</i> (Samulastra de floarea soarelui convențională)	T	<i>Stellaria media</i> (Rocoina)
	<i>Lamium spp.</i> (Urzica moartă)		<i>Thlaspi arvense</i> (Pungulița)
L	<i>Lapsana communis</i> (Zgrăbuntica)	V	<i>Vicia spp.</i> (Măzăriche)
			<i>Viola spp.</i> (Trei frați pătași)
		X	<i>Xanthium spp.</i> (Cornaci)

ROTAȚIA CULTURILOR

Nu există restricții privind rotația culturilor.

După recoltarea culturii tratate cu **ACCURATE EXTRA** se pot înființa următoarele culturi: cereale, rapiță, fasole de câmp, după o pauză de 120 de zile de la tratament.

În primăvara următoare poate fi înființată orice cultură.