

BUTOXONE M40

ERBICID



Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 1587 / 27.04.1995

CULTURA:
MAZĂRE

400

CONȚINE:
G/L MCPB-NA

TIMP DE PAUZĂ:



MOD DE ACȚIUNE:
SISTEMIC



FORMULARE:
CONCENTRAT SOLUBIL
(SL)



TERMEN DE VALABILITATE



MOD DE ACȚIUNE

Butoxone M40 este un erbicid sistemic ce se absoarbe prin frunze și, parțial, prin rădăcini. Produsul pătrunde cu rapiditate în plantă, concentrându-se în meristeme (zone de creștere intensă a plantelor prin diviziune rapidă și alungirea celulelor).

Mecanismul de combatere al buruienilor se bazează pe dereglarea dezvoltării celulare și afectarea procesului de respirație.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:



CULTURĂ	DOZA	BURUIENI COMBĂTUTE
MAZĂRE	2 - 4.5 L/ha Se aplică postemergent, când cultura are 3 noduri, de la faza de 3 frunze complet desfăcute până înainte de faza de buton floral.	Buruieni dicotiledonate anuale (buruieni în faza de 2 – 4 frunze) și dicotiledonate perene (buruieni în faza de <10 cm) (mazărea 10 – 12 cm înălțime)



BUTOXONE M40®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Butoxone M40 trebuie aplicat atunci când cultura de mazăre este în creștere activă, plantele având 10-12 cm înălțime.

Rezultatele cele mai bune se obțin dacă în momentul aplicării tratamentului buruienile sunt răsărite în număr mare și sunt în fenofaza de 2 - 4 frunze.

Se recomandă aplicarea dozei de 2 - 2,5 litri pentru tratamentele efectuate în perioada optimă de aplicare.

- Erbicidarea se va face până la apariția butonilor floralii.
- Aplicarea mai târzie poate să ducă la reducerea producției.
- Dacă seceta afectează cultura, pot apărea fenomene de distorsionare a plantelor de cultură sau distrugerea unor părți ale acestora.

Se aplică o singură erbicidare cu Butoxone M40 pe cultură per sezon.

BURUIENI COMBĂTUTE

BURUIENI FOARTE SENSIBILE:

- Muștarul negru (*Brassica nigra*);
- Măcrișul (*Rumex spp.*);
- Pălămida (*Cirsium arvense*);
- Spanacul sălbatic (*Chenopodium album*);
- Pungulița (*Thlaspi arvense*);
- Pătlagina (*Plantago spp.*);
- Traista ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*);
- Urzica mică (*Urtica urens*).

IMPORTANT!

- Nu prelucrați solul timp de 10 zile de la aplicarea tratamentului;
- Se va evita erbicidarea pe vreme rece sau secetoasă;
- Nu se va aplica produsul în condiții de vânt puternic pentru a evita driftul;
- Nu se va erbicida mazărea pentru sămânță.

