

CYFLODIUM 5 EW

FUNGICID



NOU NOU NOU NOU NOU NOU NOU NOU

Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 2270/27.05.2004

CULTURA:

**GRÂU, MĂR
VIȚĂ DE VIE,**

50

CONȚINE:

G/L CIFLUFENAMID

TIMP DE PAUZĂ:



MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



FORMULARE:

CONCENTRAT
EMULSIONABIL



TERMEN DE VALABILITATE



MOD DE ACȚIUNE

CYFLODIUM 5 EW este un fungicid cu acțiune sistemică locală ce previne și combate făinarea la măr, grâu și viță-de-vie.

La grâu, se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la începutul înfloritului (BBCH 30-60). La primele semne ale infecției cu făinare.

La viță-de-vie de la stadiul de butoni floralii separate până la compactarea ciorchinului cu tratamente preventive.

La măr cele mai bune tratamente sunt cele preventive și se aplică de la stadiul prefloreal până la 14 zile înainte recoltare.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:



CULTURĂ	AGENTUL PATOGEN	DOZA (L/HA)	TIMP DE PAUZĂ (ZILE)
MĂR	Făinare (<i>Phodospaera leucotricha</i>)	0.45 L/ha	14
GRÂU	Făinare (<i>Erysiphe graminis</i>)	0.2 L/ha	48-78
VIȚĂ-DE-VIE	Făinare (<i>Uncinula necator</i>)	0.3 L/ha	21

CYFLODIUM 5 EW

TEHNICA DE APLICARE

Se vor utiliza echipamente specifice culturilor de câmp sau spații protejate. Volumul de soluție este cel specific fiecărei culturi.

COMPATIBILITATE

Poate fi amestecat în rezervor cu alte produse de protecția plantelor sau fertilizanți foliari, dar este recomandat să se facă un test fizico-chimic pentru amestecul ce va fi utilizat.

AVANTAJE

- Cea mai bună acțiune preventivă și curativă împotriva combaterii făinariilor,
- După aplicare produsul are acțiune sistemică, translaminară în aparatul foliar al plantei astfel prin modul unic de acțiune se degajă vapori care se distribuie pe aparatul foliar unde substanța activă nu a ajuns în aplicare ducând astfel la o eficacitate prelungită a produsului pe plantă.

