

EPHON TOP

REGULATOR DE CREȘTERE



Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 529PC/12.07.2019

CULTURA:
CEREALE

660

CONȚINE:
G/L ETEFON

TIMP DE PAUZĂ:



MOD DE ACȚIUNE:
SISTEMIC



TERMEN DE VALABILITATE



FORMULARE:
CONCENTRAT SOLUBIL
(SL)

MOD DE ACȚIUNE

Produsul Ephon Top este un regulator de creștere versatil, capabil să producă o gamă largă de modificări fiziologice la cerealele păioase. Acționează asupra taliei plantelor ca inhibitor de creștere, reducând lungimea paiului și oferind o rezistență mai mare la cădere, ușurând astfel recoltarea.

Beneficiile cele mai mari vor fi observate în cazul culturilor ce au beneficiat de tratamente adecvate (îngrășăminte, fungicide, etc.) Cel mai bun efect este observat în momentul de creștere intensă, când apare riscul frângerii. Se recomandă utilizarea produsului **Ephon Top** cu precădere în cazul culturilor ce au beneficiat de un nivel de fertilizare ridicat, întrucât la acestea riscul de cădere al culturii este mai mare. În cazul culturilor mai puțin viguroase și care nu au beneficiat de o fertilizare adecvată, aplicarea produsului poate duce la o coacere prematură.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:



CULTURĂ	FENOFAZA DE APLICARE	DOZĂ (L/HA)
GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DURUM DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ	Aplicare împotriva căderii plantelor - se aplică de la primul internod până la primele ariste vizibile (BBCH 31-49)	0.75 L/Ha
GRÂU DE PRIMĂVARĂ, GRÂU DURUM DE PRIMĂVARĂ	Aplicare împotriva căderii plantelor - se aplică de la primul internod până la primele ariste vizibile (BBCH 31-49)	0.75 L/Ha



EPHON® TOP

CULTURĂ	FENOFAZA DE APLICARE	DOZĂ (L/TONĂ)
SECARĂ DE TOAMNĂ	Aplicare împotriva căderii plantelor - se aplică de la primul internod până la primele ariste vizibile (BBCH 31-49)	1.1 L/Ha
ORZ DE PRIMĂVARĂ	Aplicare împotriva căderii plantelor - se aplică de la primul internod până la primele ariste vizibile (BBCH 31-49)	0.5 L/Ha
ALAC (SPECIE DE GRÂU REZISTENT)	Aplicare împotriva caderii plantelor - se aplică de la primul internod până înaintea apariției frunzei standard (BBCH 31-45)	0.6 L/Ha

TEHNICA DE APLICARE

Numai culturile care au fost semănate devreme, care au un potențial ridicat și prezintă un risc ridicat de cădere vor fi tratate cu **Ephon Top**.

Culturile care sunt stresate, de exemplu din cauza condițiilor din sol, nu vor fi tratate cu **Ephon Top**. Factorii de stres influențează negativ dezvoltarea culturii și pot duce de asemenea la apariția frațiilor secundari și boabe mici. Utilizarea produsului Ephon Top în condiții de stres poate amplifica aceste efecte, în special la orzul de primăvară.

Unele soiuri de cereale păioase pot fi susceptibile la secetă.

A nu se aplica **Ephon Top** când solul este foarte uscat.

A nu se administra nici un erbicid sau îngrășământ lichid, decât după 10 zile de la efectuarea tratamentului cu Ephon Top.

Nu efectuați tratamente asupra culturilor care sunt puternic afectate din cauza bolilor, atacurilor de dăunători, deficit de nutrienți sau sunt stresate în urma aplicării unui erbicid.

Nu utilizați produsul pe vreme rece sau când pot surveni înghețuri peste noapte.

Nu pulverizați produsul când plantele sunt umede sau când ploaia este iminentă.

A se evita suprapunerile în timpul trecerilor pentru efectuarea tratamentului.

A se evita driftul pe culturile învecinate.

Produsul nu este destinat utilizării pe culturi de cereale destinate producerii de semințe.

PREPARAREA SOLUȚIEI DE PULVERIZARE

Se umple rezervorul mașinii de tratat pe jumătate cu apă și se pornește agitatorul. Se adaugă cantitatea necesară de **Ephon Top** și apoi diferența de apă agitându-se încontinuu.

Soluția pregătită se va aplica pe cultură în aceeași zi.