

FUSILADE MAX

A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ MATADOR MAX

ERBICID GRAMINICID SELECTIV



Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 558PC / 20.11.2019

CULTURA:

MULTIPLE

125

CONȚINE:

G/L FLUAZIFOP-P-BUTIL

TIMP DE PAUZĂ:



**28 – 90
ZILE**

MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



FORMULARE:

CONCENTRAT EMULSIONABIL
(EC)



TERMEN DE VALABILITATE



MOD DE ACȚIUNE

Fusilade Max controlează buruienile monocotiledonate anuale și perene, inclusiv *Sorghum halepense* (**Costreiu**) din rizomi, răsărite în momentul aplicării.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:

CULTURĂ	BURUIENI COMBĂTUTE	DOZĂ L/HA	PERIOADA DE APLICARE	TIMP DE PAUZĂ(ZILE)
FLOAREA - SOARELUI	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/ha	Postemergent până înainte de formarea celei de-a 6-a perechi de frunze	90
RAPIȚĂ	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/ha	Postemergent până înainte de înflorit (BBCH 50)	90
HAMEI	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/ha	Postemergent	30
SFECLĂ DE ZAHĂR, SFECLĂ FURAJERĂ	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/ha	Postemergent	56
ȘOFRAN, MAC	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/ha	Postemergent până înainte de înflorit (BBCH 50)	90
IN	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 1.5 L/ha	Postemergent până înainte de înflorit	90





CULTURĂ	BURUIENI COMBĂTUTE	DOZĂ L/HA	PERIOADA DE APLICARE	TIMP DE PAUZĂ(ZILE)
FASOLE (PĂSTĂI), FASOLE (BOABE)	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/Ha	Postemergent până înainte de înflorit (BBCH 50)	35
MAZĂRE (PĂSTĂI), MAZĂRE (BOABE)	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 1.5 L/Ha	Postemergent până înainte de înflorit (BBCH 50)	35
MORCOV, SFECLĂ ROȘIE, HREAN, NALBĂ, BARBA-CAPREI, RIDICHI, RIDICHI NEGRE, GHIMBIR	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/Ha	Postemergent	49
ANGHINARE	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.5 - 2.0 L/Ha	Postemergent	42
ȚELINĂ, ȚELINĂ DE FRUNZE	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.4 - 1.5 L/Ha	Postemergent	42
PĂSTĂRNAC	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/Ha	Postemergent	42
CEAPĂ (SEMĂNATĂ DIRECT ÎN CÂMP)	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/Ha	Postemergent	42
VARZĂ ALBĂ, VARZĂ ROȘIE, VARZĂ CREAȚĂ	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.4 - 1.5 L/Ha	Postemergent până la cea de-a 8-a frunză	42
CEAPĂ, CEAPĂ EȘALOTĂ, USTUROI, PRAZ	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/Ha	Postemergent	42
SALATĂ, SPANAC	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.4 - 1.5 L/Ha	Postemergent	42
CICOARE, CICOARE DE GRĂDINĂ	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.4 - 1.5 L/Ha	Postemergent	56
CRESON, CRESON DE PĂMÂNT, MUȘTAR ROȘU, PĂTRUNJEL, PLANTE AROMATICE (SALVIE, ROZMARIN, MĂRAR, CIMBRU, BUSUIOC, MENTĂ, DAFIN, TARHON, LEUȘTEAN, CĂRIANDRU)	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.4 - 1.5 L/Ha	Postemergent	42
ARPAGIC	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.4 - 1.5 L/Ha	Postemergent	42
ANDIVE	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.4 - 1.5 L/Ha	Postemergent	42
CHIMEN	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.4 - 1.5 L/Ha	Postemergent la 20 cm înălțime	42

CULTURĂ	BURUIENI COMBĂTUTE	DOZĂ L/HA	PERIOADA DE APLICARE	TIMP DE PAUZĂ(ZILE)
SPARANGHEL	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.4 - 1.5 L/Ha	Postemergent	42
SPARANGHEL (PLANTE CE RĂMÂN ÎN CÂMP DUPĂ RECOLTAREA PĂRȚILOR COMESTIBILE)	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/Ha	Postemergent aplicare doar până la BBCH 51	180
CARTOF	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.5 - 2.0 L/Ha	Postemergent	90
RUBARBĂ	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.4 - 1.5 L/Ha	Postemergent	49
BOB	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/Ha	Postemergent până înainte de înflorit (BBCH 50)	90
LUPIN	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/Ha	Postemergent până înainte de înflorit (BBCH 50)	90
HRIȘCĂ	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/Ha	Postemergent	49
CĂPȘUN	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 3.0 L/Ha	Postemergent până înainte de înflorit (BBCH 50)	42
PLANTAȚII VITICOLE (STRUGURI DE MASĂ ȘI STRUGURI DE VIN)	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 1.0 L/Ha	Postemergent până înainte de înflorit	28
MIGDAL, ALUN, CASTAN, NUC	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 1.0 L/Ha	Postemergent	21
MĂR, PĂR, GUTUI, PRUN, CAIS, VIȘIN, CIREȘ, PIERȘIC, NECTARIN	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 1.0 L/Ha	Postemergent	28
ARBUȘTI FRUCTIFERI (MUR, ZMEUR)	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 1.0 L/Ha	Postemergent	45
ARBUȘTI FRUCTIFERI (AFIN, COACĂZ NEGRU, COACĂZ ROȘU, MERIȘOR, SÔC, AGRIȘ, DUD, MĂCEȘ)	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 1.0 L/Ha	Postemergent	90
PLANTE MEDICINALE ȘI AROMATICE	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/Ha	Postemergent	49
TERENURI DESPĂDURITE	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 3.0 L/Ha	Postemergent	21
PĂDURI	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	3.0 L/Ha	Postemergent	21

CULTURĂ	BURUIENI COMBĂTUTE	DOZĂ L/HA	PERIOADA DE APLICARE	TIMP DE PAUZĂ(ZILE)
PEPINIERE SILVICE (SERE ȘI SOLARII)	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/Ha	Postemergent	90
PEPINIERE POMICOLE, C1 ȘI C2	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/Ha	Postemergent	90
TERENURI NECULTIVATE	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/Ha	Postemergent	21
FLORI/PLANTE ORNAMENTALE (TRANDAFIR, CRIZANTEMĂ, TUBERCULI DE GERBERĂ, VIOLETĂ, PETUNIE, GAROAFĂ, STRELIZIA, CRIN), PEPINIERE DE PLANTE (CÂMP, SERE ȘI SOLARII)	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0.75 - 2.0 L/Ha	Postemergent	56

TEHNICA DE APLICARE



Produsul Fusilade Max se aplică prin stropiri în timpul vegetației, postemergent atunci când buruienile sunt răsărite și în stadiul de creștere activă. Momentul optim de aplicare este de 1-2 frunze până la înfrățire pentru buruienile anuale și peste 4 frunze până la înălțimea de 20-25 cm pentru buruienile perene. Doza se ajustează în funcție de gradul de infestare și înălțimea buruienilor, conform tabelului cu utilizări omologate. La ceapă se aplică după formarea de 2-3 frunze adevărate sau după efectuarea testului cu cristal violet, pentru a verifica existența stratului de pruina/ceară pe suprafața plantelor. Dacă înainte de tratament plouă, se așteaptă 48-72 ore până la efectuarea tratamentului, pentru formarea pruinei pe plante.

AVANTAJE

- Conține Tehnologia avansată ISOLink ce include surfactanți și penetranți în formulare, atribuind produsului **Fusilade Max** proprietatea de a se dizolva mai repede în apă, preluarea mai bună și mai rapidă a substanței active în plante, ceea ce duce la un control foarte bun și rapid asupra buruienilor graminee.
- Controlează bine buruienile greu de combătut – **Fusilade Max** este foarte eficient asupra buruienilor *Agropyron repens* (**Pir târâtor**), *Avena fatua* (**Ovăz sălbatic**), *Digitaria sanguinalis* (**Meișor**), *Echinochloa crus-galli* (**Iarbă bărbosă**), *Setaria glauca* (**Mohor**), *Setaria viridis* (**Mohor verde**), *Sorghum halepense* (**Costrei**).
- Unealtă bună în managementul combaterii rezistenței – poate fi aplicat la un număr mare de culturi care intră în rotație și astfel permite utilizarea unui program variat.

ROTAȚIA CULTURILOR

Nu există restricții în ceea ce privește rotația culturilor.