

JOUST

A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ ARES
FUNGICID



NOU NOU NOU NOU NOU NOU NOU NOU NOU

Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 906PC/07.03.2024

CULTURA:

MULTIPLE

250

CONȚINE:

G/L
PROTIOCONAZOL

TIMP DE PAUZĂ:



35 - 56
ZILE

MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



FORMULARE:

CONCENTRAT
EMULSIONABIL



TERMEN DE VALABILITATE



MOD DE ACȚIUNE

Joust este un fungicid sistemic pe bază de protioconazol, o substanță activă, sistemică, din grupa triazolilor, caracterizată printr-o acțiune preventivă, curativă și eradicativă foarte bună asupra unei game largi de agenți patogeni.

Este absorbit rapid prin țesuturile plantei și se transloca sistemic prin plantă, acționând asupra ciupercilor prin blocarea sintezei sterolilor, astfel fiind distrusă membrana celulară.

Pentru a evita instalarea rezistenței patogenilor, nu se vor aplica mai mult de două tratamente cu Joust la aceeași cultură într-un sezon.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:



CULTURĂ	BOLI	DOZA (L/HA)	PERIOADA DE APLICARE	NR. MAXIM DE TRATAMENTE (INTERVAL ZILE ÎNTRE TRATAMENTE)	TIMP DE PAUZĂ (ZILE)
ORZ DE TOAMNĂ, ORZ DE PRIMAVERĂ	Pătarea frunzelor (<i>Ramularia collo-cygni</i>) Făinarea cerealelor (<i>Blumeria graminis</i>) Arsura frunzelor de orz (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Pătarea reticulară a frunzelor de orz (<i>Pyrenophora teres</i>)	0.6 L/Ha	BBCH 30-61 (de la începutul împăierii până la începutul înfloriturii)	2 (14-21)	35
IN (doar pentru producția de fibre)	<i>Erysiphe</i> spp. <i>Oidium lin</i>	0.6 - 0.7 L/Ha	BBCH 33-51 (se aplică de la alungirea primului lăstar până la aparitia primei inflorescențe)	1	-



CULTURĂ	BOLI	DOZA (L/HA)	PERIOADA DE APLICARE	NR. MAXIM DE TRATAMENTE (INTERVAL ZILE ÎNTRE TRATAMENTE)	TIMP DE PAUZĂ (ZILE)
GRÂU DE TOAMNĂ, ALAC, ALTE VARIETĂȚI DE GRÂU	Septorioza (<i>Zymoseptoria tritici</i>) Rugina brună (<i>Puccinia recondita</i>) Rugina galbenă (<i>Puccinia striiformis</i>) Făinarea (<i>Blumeria graminis</i>) Pirenoforiza (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>) Fuzarioza (<i>Fusarium spp</i>)	0.6 - 0.8 L/Ha	BBCH 30-69 (de la începutul împăierii până la sfârșitul înfloriturii)	2 (14-21)	35
GRÂU DURUM	Septorioza (<i>Zymoseptoria tritici</i>) Rugina brună (<i>Puccinia recondita</i>) Făinarea (<i>Blumeria graminis</i>) Fuzarioza (<i>Fusarium spp</i>)	0.6 - 0.8 L/Ha	BBCH 30-69 (de la începutul împăierii până la sfârșitul înfloriturii)	2 (14-21)	35
TRITICALE	Septorioza (<i>Zymoseptoria tritici</i>) Rugina brună (<i>Puccinia recondita</i>) Făinarea (<i>Blumeria graminis</i>) Arsura frunzelor de orz (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Fuzarioza (<i>Fusarium spp</i>)	0.6 - 0.8 L/Ha	BBCH 30-69 (de la începutul împăierii până la sfârșitul înfloriturii)	2 (14-21)	35
SECARĂ DE TOAMNĂ, SECARĂ DE PRIMĂVARĂ	Septorioza (<i>Zymoseptoria tritici</i>) Arsura frunzelor (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Rugina brună (<i>Puccinia recondita</i>) Făinarea cerealelor (<i>Blumeria graminis</i>)	0.6 - 0.8 L/Ha	BBCH 30-69 (de la începutul împăierii până la sfârșitul înfloriturii)	2 (14-21)	35
RAPIȚĂ DE TOAMNĂ	Putregaiul negru al rapiței (<i>Leptosphaeria maculans</i>) Putregaiul alb al rapiței (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Făinarea rapiței (<i>Erysiphe cruciferarum</i>) Alternarioza (<i>Alternaria brassicae</i>) Pătarea frunzelor (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)	0.6 - 0.7 L/Ha	BBCH 14-18 (toamna între 4 și 8 frunze) BBCH 20-69 (primăvara)	2 (după aplicarea tratamentului de toamnă se va păstra un interval de 90 de zile până la aplicarea celui de-al doilea tratament. Pentru tratamentele aplicate în primăvara intervalul dintre tratamente o sa fie de 14-28 zile)	56
MUȘTAR, CAMELINA, ALTE CRUCIFERE PRODUCĂTOARE DE SĂMÂNȚĂ (ex Brassica carinata)	Putregaiul negru al rapiței (<i>Leptosphaeria maculans</i>) Putregaiul alb al rapiței (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Făinarea rapiței (<i>Erysiphe cruciferarum</i>) Alternarioza (<i>Alternaria brassicae</i>) Pătarea frunzelor (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)	0.6 - 0.7 L/Ha	BBCH 14-18 (toamna între 4 și 8 frunze) BBCH 20-69 (primăvara)	1	56

AVANTAJE

O formulare avansată AmideACTIVE

Formulare unică ce creează o emulsie omogenă în amestec și oferă o eficiență a protriiconazolului.

Etichetă cuprinzătoare la cereale păioase și rapiță

JOUST a fost testat cu succes și a fost omologat împotriva tuturor agenților patogeni cheie din culturile de cereale păioase (grâu, grâu dur, orz, secară, triticeale), cât și pentru cultura de rapiță pentru a avea cea mai completă etichetă.

Doză flexibilă

JOUST este omologat cu doze cuprinse între **0.6-0.8 l/ha**, ceea ce îl face partener de neînlocuit pentru mixurile cu fungicide din alte clase chimice.



JOUST®

Formulare unică AmideACTIVE

Eficient pentru controlul bolilor din culturile
grâu, rapiță, orz și secară



 nufarm