

KYLEO

ERBICID TOTAL



NOU NOU NOU NOU NOU NOU NOU NOU

Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 862PC / 25.04.2023

CULTURA:

**LIVEZI DE MĂR
ȘI MIRIȘTI**

**160
240**

CONȚINE:

G/L ACID 2,4 – D

G/L GLIFOSAT ACID

TIMP DE PAUZĂ:



MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



FORMULARE:

SUSPENSIE CONCENTRATĂ
(SC)



TERMEN DE VALABILITATE



MOD DE ACȚIUNE

Kyleo este un erbicid sistemic care se absoarbe la nivelul întregului aparat foliar, deplasându-se spre și în interiorul sistemului radicular. Efecte vizibile se constată după 2-4 zile de la momentul administrării (în cazul majorității buruienilor anuale), respectiv 7 zile sau mai mult pentru cea mai mare parte a buruienilor perene.

Condițiile meteorologice nefavorabile (temperaturi scăzute sau ploi), ce pot surveni la scurtă vreme de la realizarea tratamentului, pot încetini activitatea produsului, întârziind dezvoltarea simptomelor vizuale. Acestea din urmă sunt reprezentate de ofilire treptată și îngălbenirea plantelor, efecte urmate de necrozarea foliului și deteriorarea rădăcinilor și rizomilor.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:



CULTURĂ	DOZA	AGENTUL DE DĂUNARE
MIRIȘTI	3 - 4 L/ha Se aplică de la mijlocul lunii august până la sfârșitul toamnei.	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene
LIVEZI DE MĂR	4 - 5 L/ha Se aplică în perioada de creștere activă a buruienilor, primăvară-toamnă.	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene



AVANTAJE

- Sinergie unică a substanțelor active glifosat și acid 2,4 D;
- Viteză sporită de acțiune asupra buruienilor;
- Eficiență ridicată datorată acțiunii celor două substanțe active.

TEHNICA DE APLICARE

Pentru obținerea celor mai bune rezultate, se recomandă :

- aplicarea tratamentelor pe vreme liniștită, fără vânt când temperatura aerului este cuprinsă între 8°C și 25°C .
- nu se va aplica tratamentul în zilele ploioase sau dacă urmează să plouă în următoarele 3 ore de la aplicarea tratamentului.

Perioada minimă recomandată de la aplicarea erbicidului Kyleo până la înființarea culturilor este de 7 zile la cereale, 3 zile la porumb, 30 de zile la lucernă, hrișcă, mazăre, 60 de zile la cartofi, sfeclă, floarea soarelui.

NU se recomandă utilizarea erbicidului pe terenurile unde urmează să fie înființate culturi de rapiță, muștar, legume.

ATENȚIE!

Nu se recomandă aplicarea produsului prin irigare.

Nu se aplică tratamente cu produsul Kyleo în spații închise - sere și solarii.

PREGĂTIREA SOLUȚIEI

Cantitatea de soluție recomandată a se aplica pe suprafața de un ha este de 100 - 300 litri. Umpleți rezervorul pe jumătate cu apă, adăugați cantitatea necesară de Kyleo și agitați. Se umple rezervorul cu apă, continuându-se agitarea.

Soluția trebuie aplicată în ziua în care este pregătită, nu se păstrează pentru ziua următoare.

După aplicarea tratamentului se vor spăla foarte bine echipamentele utilizate.

