

SARACEN DELTA

ERBICID



Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 716PC/09.09.2021

CULTURĂ:

**CEREALE PĂIOASE
ȘI PĂȘUNI**

50
500

CONȚINE:

G/L FLORASULAM

G/L DIFLUFENICAN

TIMP DE PAUZĂ:



MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



FORMULARE:

SUSPENSIE CONCENTRATĂ
(SC)



TERMEN DE VALABILITATE



TEMPERATURA DE APLICARE



PESTE
5°C

MOD DE ACȚIUNE

Saracen Delta are în componență două substanțe active, ambele cu acțiune sistemică.

Florasulam, substanță activă din clasa sulfonilureicelor, acționează prin inhibarea sintezei enzimei acetolactatsintaza (ALS). Inhibarea enzimei ALS, stopează creșterea buruienilor încă din primele ore de la aplicare, deși efectele sunt vizibile după câteva zile. Simptomele apar pentru prima dată în regiunea meristematică de sus a plantelor prin clorozarea și necrozarea acestuia.

Componenta diflufenican are, de asemenea, acțiune sistemică, acționând prin inhibarea procesului de sinteză a carotenoidelor, iar speciile de buruieni sensibile sunt puternic clorozate, apoi necrozate și distruse.

Se recomandă pentru utilizarea ca erbicid postemergent, pentru controlul buruienilor dicotiledonate anuale din culturile de grâu, orz, secară, triticeale și pășuni.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:

CULTURĂ	ORGANISMUL DĂUNĂTOR	DOZA DE UTILIZARE (L/HA)	PERIOADA DE APLICARE
GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ, SECARĂ DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ	Buruieni dicotiledonate anuale	0.075 l/ha tratament postemergent în toamnă	BBCH 12-22 de la formarea celei de a doua frunze până la apariția celui de-al doilea frate





CULTURĂ	ORGANISMUL DĂUNĂTOR	DOZA DE UTILIZARE (L/HA)	PERIOADA DE APLICARE
GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ, SECARĂ DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ	Buruieni dicotiledonate anuale	0.1 l/ha tratament postemergent în primăvară	BBCH 21-32 de la apariția primului frate până la formarea celui de-al doilea internod
GRÂU DE PRIMĂVARĂ, ORZ DE PRIMĂVARĂ	Buruieni dicotiledonate anuale	0.1 l/ha	BBCH 21-32 de la apariția primului frate până la formarea celui de-al doilea internod
PĂȘUNI	Buruieni dicotiledonate anuale	0.1 l/ha	BBCH 29-32 de la sfârșitul înfrățitului până la formarea celui de-al doilea internod

BURUIENI COMBĂTUTE

Buruieni sensibile

A	<i>Anthemis arvensis</i> (Romaniță de câmp)	S	<i>Sinapis arvensis</i> (Muștar sălbatic)
B	<i>Brassica napa</i> (Samulastră de rapiță convențională (2-4 frunze) și Clearfield)	T	<i>Thlaspi arvense</i> (Punguliță)
C	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Traista ciobanului)	V	<i>Veronica hederifolia</i> (Doritoare)
G	<i>Galium aparine</i> (Turiță)		<i>Veronica persica</i> (Ventrilica)
	<i>Galeopsis tetrahit</i> (Lingurică)		<i>Viola arvensis</i> (Tre frați pătași)
H	<i>Helianthus annuus</i> (Samulastră de floarea soarelui sulfonilureică și Clearfield)	Buruieni mediu sensibile	
M	<i>Matricaria spp.</i>	C	<i>Chenopodium album</i> (Spanac sălbatic)
	<i>Myosotis arvensis</i> (Nu-măuita)		<i>Centaurea cyanus</i> (Albăstreă)
P	<i>Papaver rhoeas</i> (Mac)	L	<i>Lamium purpureum</i> (Urzică moartă)
	<i>Polygonum convolvulus</i> (Hrișcă urcătoare)		

TEHNICA DE APLICARE



Aplicarea tratamentelor cu **Saracen Delta** se va efectua doar în condiții de calm atmosferic sau de adiere ușoară a vântului. Accesul persoanelor în culturile tratate se va permite doar după

uscarea completă a acestora. Nu pulverizați în condițiile în care culturile sunt sub stres provocat de secetă, acțiunea dăunătorilor, îngheț nocturn, deficit de nutrienți etc.

Se recomandă aplicarea tratamentelor atunci când buruienile sunt în perioada de creștere activă - 2-4 frunze. Pentru o eficacitate mai bună adăugăm adjuvantul Grounded.

ROTAȚIA CULTURILOR

În cazul compromiterii culturii de cereale păioase tratate cu **Saracen Delta**, se pot reînsămânța numai următoarele culturi: grâu de primăvară, orz de primăvară sau ovăz cu efectuarea lucrărilor de arat (20 cm). După aplicarea erbicidului **Saracen Delta**, în același an calendaristic se pot cultiva doar cereale păioase, rapiță, bob și legume crucifere din răsaduri.

În anul următor tratamentului se pot cultiva următoarele: cerealele păioase, rapiță, bob, fasole, speică de zahăr, cartof, porumb și legume crucifere din răsaduri.